КонсультантПлюс

Приказ Минтруда России от 27.08.2019 N 585н "О классификациях и критериях, используемых при осуществлении медико-социальной экспертизы граждан федеральными государственными учреждениями медико-социальной экспертизы" (Зарегистрировано в Минюсте России 18.11.2019 N 56528)

Документ предоставлен **КонсультантПлюс**

www.consultant.ru

Дата сохранения: 28.09.2020

Зарегистрировано в Минюсте России 18 ноября 2019 г. N 56528

МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПРИКАЗ
от 27 августа 2019 г. N 585н

О КЛАССИФИКАЦИЯХ И КРИТЕРИЯХ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ МЕДИКО-СОЦИАЛЬНОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ ГРАЖДАН ФЕДЕРАЛЬНЫМИ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ МЕДИКО-СОЦИАЛЬНОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ

В соответствии с подпунктом 5.2.105 Положения о Министерстве труда и социальной защиты Российской Федерации, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 19 июня 2012 г. N 610 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, N 26, ст. 3528; 2013, N 22, ст. 2809; N 36, ст. 4578; N 37, ст. 4703; N 45, ст. 5822; N 46, ст. 5952; 2014, N 21, ст. 2710; N 26, ст. 3577; N 29, ст. 4160; N 32, ст. 4499; N 36, ст. 4868; 2015, N 2, ст. 491; N 6, ст. 963; N 16, ст. 2384; 2016, N 2, ст. 325; N 4, ст. 534; N 23, ст. 3322; N 28, ст. 4741; N 29, ст. 4812; N 43, ст. 6038; N 47, ст. 6659; 2017, N 1, ст. 187; N 7, ст. 1093; N 17, ст. 2581; N 22, ст. 3149; N 28, ст. 4167; 2018, N 10, ст. 1494; N 24, ст. 3530; N 36, ст. 5634; N 46, ст. 7052; N 49, ст. 7600; N 53, ст. 8678; 2019, N 1, ст. 31; N 5, ст. 408; N 21, ст. 2563), приказываю:

1. Утвердить классификации и критерии, используемые при осуществлении медико-социальной экспертизы граждан федеральными государственными учреждениями медико-социальной экспертизы согласно приложению.

2. Признать утратившими силу:

приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 17 декабря 2015 г. N 1024н "О классификациях и критериях, используемых при осуществлении медико-социальной экспертизы граждан федеральными государственными учреждениями медико-социальной экспертизы" (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 20 января 2016 г., регистрационный N 40650);

приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 5 июля 2016 г. N 346н "О внесении изменений в классификации и критерии, используемые при осуществлении медико-социальной экспертизы граждан федеральными государственными учреждениями медико-социальной экспертизы, утвержденные приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 17 декабря 2015 г. N 1024н" (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 28 июля 2016 г., регистрационный N 43018).

3. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2020 года.

Министр
М.А.ТОПИЛИН

Приложение
к приказу Министерства труда
и социальной защиты
Российской Федерации
от 27 августа 2019 г. N 585н

КЛАССИФИКАЦИИ И КРИТЕРИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ МЕДИКО-СОЦИАЛЬНОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ ГРАЖДАН ФЕДЕРАЛЬНЫМИ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ МЕДИКО-СОЦИАЛЬНОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ

I. Общие положения

1. Классификации, используемые при осуществлении медико-социальной экспертизы граждан федеральными государственными учреждениями медико-социальной экспертизы, определяют основные виды стойких расстройств функций организма человека, обусловленных заболеваниями, последствиями травм или дефектами, и степени их выраженности, а также основные категории жизнедеятельности человека и степени выраженности ограничений этих категорий.

2. Критерии, используемые при осуществлении медико-социальной экспертизы граждан федеральными государственными учреждениями медико-социальной экспертизы, определяют основания установления групп инвалидности (категории "ребенок-инвалид").

II. Классификации основных видов стойких расстройств функций организма человека, обусловленных заболеваниями, последствиями травм или дефектами, и степени их выраженности

3. К основным видам стойких расстройств функций организма человека, обусловленных заболеваниями, последствиями травм или дефектами, относятся:

а) нарушения психических функций (сознания, ориентации, интеллекта, личностных особенностей, волевых и побудительных функций, внимания, памяти, психомоторных функций, эмоций, восприятия, мышления, познавательных функций высокого уровня, умственных функций речи, последовательных сложных движений);

б) нарушения языковых и речевых функций (устной (ринолалия, дизартрия, заикание, алалия, афазия); письменной (дисграфия, дислексия), вербальной и невербальной речи; нарушение голосообразования);

в) нарушения сенсорных функций (зрения; слуха; обоняния; осязания; тактильной, болевой, температурной, вибрационной и других видов чувствительности; вестибулярной функции; боль);

г) нарушения нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций (движения головы, туловища, конечностей, в том числе костей, суставов, мышц; статики, координации движений);

д) нарушения функций сердечно-сосудистой системы, дыхательной системы, пищеварительной, эндокринной систем и метаболизма, системы крови и иммунной системы, мочевыделительной функции, функции кожи и связанных с ней систем;

е) нарушения, обусловленные физическим внешним уродством (деформации лица, головы, туловища, конечностей, приводящие к внешнему уродству; аномальные отверстия пищеварительного, мочевыделительного, дыхательного трактов; нарушение размеров тела).

4. Степень выраженности стойких нарушений функций организма человека, обусловленных заболеваниями, последствиями травм или дефектами, оценивается в процентах и устанавливается в диапазоне от 10 до 100, с шагом в 10 процентов.

5. Выделяются 4 степени выраженности стойких нарушений функций организма человека, обусловленных заболеваниями, последствиями травм или дефектами:

I степень - стойкие незначительные нарушения функций организма человека, обусловленные заболеваниями, последствиями травм или дефектами, в диапазоне от 10 до 30 процентов;

II степень - стойкие умеренные нарушения функций организма человека, обусловленные заболеваниями, последствиями травм или дефектами, в диапазоне от 40 до 60 процентов;

III степень - стойкие выраженные нарушения функций организма человека, обусловленные заболеваниями, последствиями травм или дефектами, в диапазоне от 70 до 80 процентов;

IV степень - стойкие значительно выраженные нарушения функций организма человека, обусловленные заболеваниями, последствиями травм или дефектами, в диапазоне от 90 до 100 процентов.

Степень выраженности стойких нарушений функций организма человека, обусловленных заболеваниями, последствиями травм или дефектами, устанавливается в соответствии с количественными системами оценки, предусмотренными приложениями N 1 и 2 к настоящим классификациям и критериям.

Если приложениями N 1 и 2 к настоящим классификациям и критериям не предусмотрена количественная оценка степени выраженности стойких нарушений той или иной функции организма человека, обусловленных заболеваниями, последствиями травм или дефектами, имеющимися у освидетельствуемого лица, то степень выраженности стойких нарушений функций организма человека в процентном выражении устанавливается федеральным государственным учреждением медико-социальной экспертизы в соответствии с абзацами третьим - шестым настоящего пункта исходя из клинико-функциональной характеристики заболеваний, последствий травм или дефектов, обусловивших вышеуказанные нарушения, характера и тяжести осложнений, стадии, течения и прогноза патологического процесса.

При наличии нескольких стойких нарушений функций организма человека, обусловленных

заболеваниями, последствиями травм или дефектами, отдельно оценивается и устанавливается степень выраженности каждого из таких нарушений в процентах. Сначала устанавливается максимально выраженное в процентах нарушение той или иной функции организма человека, после чего определяется наличие (отсутствие) влияния всех других имеющихся стойких нарушений функций организма человека на максимально выраженное нарушение функции организма человека. При наличии указанного влияния суммарная оценка степени нарушения функции организма человека в процентном выражении может быть выше максимально выраженного нарушения функций организма, но не более чем на 10 процентов.

III. Классификации основных категорий жизнедеятельности человека и степени выраженности ограничений этих категорий

6. К основным категориям жизнедеятельности человека относятся:

а) способность к самообслуживанию;

б) способность к самостоятельному передвижению;

в) способность к ориентации;

г) способность к общению;

д) способность контролировать свое поведение;

е) способность к обучению;

ж) способность к трудовой деятельности.

7. Выделяются 3 степени выраженности ограничений каждой из основных категорий жизнедеятельности человека, предусмотренной пунктом 6 настоящих классификаций и критериев:

а) способность к самообслуживанию - способность человека самостоятельно осуществлять основные физиологические потребности, выполнять повседневную бытовую деятельность, в том числе использовать навыки личной гигиены:

1 степень - способность к самообслуживанию при более длительном затрачивании времени, дробности его выполнения, сокращении объема с использованием при необходимости вспомогательных технических средств;

2 степень - способность к самообслуживанию с регулярной частичной помощью других лиц с использованием при необходимости вспомогательных технических средств;

3 степень - неспособность к самообслуживанию, нуждаемость в постоянной посторонней помощи и уходе, полная зависимость от других лиц;

б) способность к самостоятельному передвижению - способность самостоятельно перемещаться в пространстве, сохранять равновесие тела при передвижении, в покое и при перемене положения тела, пользоваться общественным транспортом:

1 степень - способность к самостоятельному передвижению при более длительном затрачивании времени, дробности выполнения и сокращении расстояния с использованием при необходимости вспомогательных технических средств;

2 степень - способность к самостоятельному передвижению с регулярной частичной помощью других лиц с использованием при необходимости вспомогательных технических средств;

3 степень - неспособность к самостоятельному передвижению и нуждаемость в постоянной помощи других лиц;

в) способность к ориентации - способность к адекватному восприятию личности и окружающей обстановки, оценке ситуации, к определению времени и места нахождения:

1 степень - способность к ориентации только в привычной ситуации самостоятельно и (или) с помощью вспомогательных технических средств;

2 степень - способность к ориентации с регулярной частичной помощью других лиц с использованием при необходимости вспомогательных технических средств;

3 степень - неспособность к ориентации (дезориентация) и нуждаемость в постоянной помощи и (или) надзоре других лиц;

г) способность к общению - способность к установлению контактов между людьми путем восприятия, переработки, хранения, воспроизведения и передачи информации:

1 степень - способность к общению со снижением темпа и объема получения и передачи информации, использование при необходимости вспомогательных технических средств, при изолированном поражении органа слуха - способность к общению с использованием невербальных способов общения и услуг по сурдопереводу;

2 степень - способность к общению при регулярной частичной помощи других лиц с использованием при необходимости вспомогательных технических средств;

3 степень - неспособность к общению и нуждаемость в постоянной помощи других лиц;

д) способность контролировать свое поведение - способность к осознанию себя и адекватному поведению с учетом социально-правовых и морально-этических норм:

1 степень - периодически возникающее ограничение способности контролировать свое поведение в сложных жизненных ситуациях и (или) постоянное затруднение выполнения ролевых функций, затрагивающих отдельные сферы жизни, с возможностью частичной самокоррекции;

2 степень - постоянное снижение критики к своему поведению и окружающей обстановке с возможностью частичной коррекции только при регулярной помощи других лиц;

3 степень - неспособность контролировать свое поведение, невозможность его коррекции, нуждаемость в постоянной помощи (надзоре) других лиц;

е) способность к обучению - способность к целенаправленному процессу организации деятельности по овладению знаниями, умениями, навыками и компетенцией, приобретению опыта деятельности (в том числе профессионального, социального, культурного, бытового характера), развитию способностей, приобретению опыта применения знаний в повседневной жизни и формированию мотивации получения образования в течение всей жизни:

1 степень - способность к обучению и получению образования в рамках федеральных государственных образовательных стандартов в организациях, осуществляющих образовательную деятельность, с созданием специальных условий (при необходимости) для получения образования обучающимися с ограниченными возможностями здоровья, в том числе обучение с применением (при необходимости) специальных технических средств обучения, определяемая с учетом заключения психолого-медико-педагогической комиссии;

2 степень - способность к обучению и получению образования в рамках федеральных государственных образовательных стандартов в организациях, осуществляющих образовательную деятельность, с созданием специальных условий для получения образования только по адаптированным образовательным программам при необходимости обучение на дому и/или с использованием дистанционных образовательных технологий с применением (при необходимости) специальных технических средств обучения, определяемая с учетом заключения психолого-медико-педагогической комиссии;

3 степень - способность к обучению только элементарным навыкам и умениям (профессиональным, социальным, культурным, бытовым), в том числе правилам выполнения только элементарных целенаправленных действий в привычной бытовой сфере, или ограниченные возможности способности к такому обучению в связи с имеющимися значительно выраженными нарушениями функций организма, определяемые с учетом заключения психолого-медико-педагогической комиссии;

ж) способность к трудовой деятельности - способность осуществлять трудовую деятельность в соответствии с требованиями к содержанию, объему, качеству и условиям выполнения работы:

1 степень - способность к выполнению трудовой деятельности в обычных условиях труда при снижении квалификации, тяжести, напряженности и (или) уменьшении объема работы, неспособность продолжать работу по основной профессии (должности, специальности) при сохранении возможности в обычных условиях труда выполнять трудовую деятельность более низкой квалификации;

2 степень - способность к выполнению трудовой деятельности в специально созданных условиях с использованием вспомогательных технических средств;

3 степень - способность к выполнению элементарной трудовой деятельности со значительной помощью других лиц или невозможность (противопоказанность) ее осуществления в связи с имеющимися значительно выраженными нарушениями функций организма.

8. Степень выраженности ограничения основных категорий жизнедеятельности человека определяется исходя из оценки их отклонения от нормы, соответствующей определенному периоду (возрасту) биологического развития человека.

IV. Критерий для установления инвалидности

9. Критерием для установления инвалидности лицу в возрасте 18 лет и старше является нарушение здоровья со II и более выраженной степенью выраженности стойких нарушений функций организма человека (в диапазоне от 40 до 100 процентов), обусловленное заболеваниями, последствиями травм или дефектами, приводящее к ограничению 2 или 3 степени выраженности одной из основных категорий жизнедеятельности человека или 1 степени выраженности ограничений двух и более категорий жизнедеятельности человека в их различных сочетаниях, определяющих необходимость его социальной защиты.

Критерием для установления инвалидности лицу в возрасте до 18 лет является нарушение здоровья со II и более выраженной степенью выраженности стойких нарушений функций организма человека (в диапазоне от 40 до 100 процентов), обусловленное заболеваниями, последствиями травм или дефектами, приводящее к ограничению любой категории жизнедеятельности человека и любой из трех степеней выраженности ограничений каждой из основных категорий жизнедеятельности, определяющих необходимость социальной защиты ребенка.

V. Критерии для установления групп инвалидности

10. Критерии для установления групп инвалидности применяются после установления гражданину инвалидности в соответствии с критерием для установления инвалидности, предусмотренным пунктом 9 настоящих классификаций и критериев.

11. Критерием для установления первой группы инвалидности является нарушение здоровья человека с IV степенью выраженности стойких нарушений функций организма человека (в диапазоне от 90 до 100 процентов), обусловленное заболеваниями, последствиями травм или дефектами.

12. Критерием для установления второй группы инвалидности является нарушение здоровья человека с III степенью выраженности стойких нарушений функций организма (в диапазоне от 70 до 80 процентов), обусловленное заболеваниями, последствиями травм или дефектами.

13. Критерием для установления третьей группы инвалидности является нарушение здоровья человека со II степенью выраженности стойких нарушений функций организма (в диапазоне от 40 до 60 процентов), обусловленное заболеваниями, последствиями травм или дефектами.

14. Категория "ребенок-инвалид" устанавливается при наличии у ребенка II, III либо IV степени выраженности стойких нарушений функций организма (в диапазоне от 40 до 100 процентов), обусловленных заболеваниями, последствиями травм и дефектами.

Приложение N 1
к классификациям и критериям,
используемым при осуществлении

медико-социальной экспертизы
федеральными государственными
учреждениями медико-социальной
экспертизы, утвержденным приказом
Министерства труда и социальной
защиты Российской Федерации
от 27 августа 2019 г. N 585н

КОЛИЧЕСТВЕННАЯ СИСТЕМА ОЦЕНКИ СТЕПЕНИ ВЫРАЖЕННОСТИ СТОЙКИХ НАРУШЕНИЙ ФУНКЦИЙ ОРГАНИЗМА ГРАЖДАН В ВОЗРАСТЕ 18 ЛЕТ И СТАРШЕ, ОБУСЛОВЛЕННЫХ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ, ПОСЛЕДСТВИЯМИ ТРАВМ ИЛИ ДЕФЕКТАМИ (В ПРОЦЕНТАХ, ПРИМЕНИТЕЛЬНО К КЛИНИКО-ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ ХАРАКТЕРИСТИКЕ СТОЙКИХ НАРУШЕНИЙ ФУНКЦИЙ ОРГАНИЗМА ЧЕЛОВЕКА)

Сокращения слов, используемых в настоящем приложении:

АКТГ - адренокортикотропный гормон;

АХЭП - антихолинэстеразные препараты;

ВК - врачебная комиссия;

ДН - дыхательная недостаточность;

ЖКТ - желудочно-кишечный тракт;

ИМТ - индекс массы тела;

ЛПИ - лодыжечно-плечевой индекс;

МБТ - микобактерии туберкулеза;

МДС - миелодиспластические синдромы;

МКФ - Международная классификация функционирования, ограничений жизнедеятельности и здоровья;

МСЭ - медико-социальная экспертиза;

НФС - нарушение функции суставов;

ПИТРС - препараты, изменяющие течение рассеянного склероза;

ПНД - психоневрологический диспансер;

ПТФБ - посттромбофлебитическая болезнь;

СКФ - скорость клубочковой фильтрации;

СТГ - соматотропный гормон;

ТМО - твердая мозговая оболочка;

ФК - функциональный класс;

ФКУ - фенилкетонурия;

ХБП - хроническая болезнь почек;

ХАН - хроническая артериальная недостаточность;

ХЛВН - хроническая легочно-венозная недостаточность;

ХЛН - хроническая легочная недостаточность;

ХДН - хроническая дыхательная недостаточность;

ХСН - хроническая сердечная недостаточность;

ЦНС - центральная нервная система.

N п/п	Классы болезней (по МКБ-10)	Блоки болезней (по МКБ-10)	Наименования болезней, травм или дефектов и их последствия	Рубрика МКБ-10 (код)	Виды стойких расстройств функций организма человека. Рубрика МКФ	Клинико-функциональная характеристика стойких нарушений функций организма человека, обусловленных заболеваниями, последствиями травм или дефектами
1	Некоторые инфекционные и паразитарные болезни (класс I)			A00 - B99		
Примечание к пункту 1. Количественная оценка степени нарушений функции организма граждан в возрасте 18 лет и старше (дыхательной, дру систем организма) при туберкулезе различной локализации зависит от клинической формы заболевания, рентгенологической стадии, периода и ф наличия (отсутствия) выделения микобактерии туберкулеза (МБТ+ или МБТ- соответственно), течения заболевания (осложненного и неосложненно и вида осложнений (в том числе от проводимой химиотерапии), а также от эффективности проводимого лечения и формирования резистентности к н множественной или широкой лекарственной устойчивости).						
1.1			Туберкулез органов дыхания, подтвержденный бактериологически и гистологически Туберкулез органов дыхания, не подтвержденный бактериологически или гистологически	A15 A16		

1.1.1					Нарушения функций дыхательной системы, сердечно-сосудистой системы; МКФ: B 440 - 449, B 410 - 429	Незначительные нарушения функции дыхательной системы при эффективном окончании основного курса лечения, в периоде потери активности (рубцевание, обызвествление) без признаков бактериовыделения (МБТ-), без остаточных. Отсутствие ДН или наличие ДН 1 степени
1.1.2					Нарушения функций дыхательной системы, сердечно-сосудистой системы; МКФ: B 440 - 449, B 410 - 429	Умеренные нарушения функции дыхательной системы при отсутствии положительной клинико-рентгенологической динамики на фоне химиотерапии; при сохранении бактериовыделения (МБТ+) в периоде потери активности; и/или при наличии остаточных изменений после излеченного туберкулеза органов дыхания (локальный пневмофиброз, фиброзно-очаговые изменения) с ДН II степени, преходящей или постоянной легочной гипертензией (ХСН 0 или ХСН 1 стадии).

						Наличие МБТ+ 6 и более месяцев
1.1.3					Нарушения функций дыхательной системы, сердечно-сосудистой системы; МКФ: B 440 - 449, B 410 - 429	Выраженные нарушения функции дыхательной системы при неэффективности химиотерапии; при сохранении бактериовыделения (МБТ+) в периоде потери активности; и/или при наличии остаточных изменений после излеченного туберкулеза (пневмосклероз, цирроз, бронхоэктазы). Наличие ДН II, III степени и ХСН IIA стадии
1.1.4					Нарушение функций дыхательной, сердечно-сосудистой системы пищеварительной системы; МКФ: B 410 - 429, B 440 - 450, B 530 - 539	Значительно выраженные нарушения функций организма вследствие наличия тяжелых полиорганных осложнений (амилоидоз, декомпенсированное хроническое легочное сердце, полисерозиты, кахексия и так далее). Наличие ДН III степени и ХСН IIБ или III стадии
1.2			Туберкулез нервной	A17		

			системы Туберкулез других органов Милиарный (диссеминированный, генерализованный) туберкулез легких	 A18 A19		
1.2.1					Нарушения психических, языковых и речевых, сенсорных, нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций, нарушения функций сердечно-сосудистой системы, дыхательной системы, пищеварительной, эндокринной систем и метаболизма, мочевыделительной функции, функции кожи и связанных с ней систем; МКФ: B 110 - 139, B 140 - 189, B 198, B 199, B 310 - 340, B 398, B 399, B 210 - 299, B 710 - 789, B 798, B 799, B 410 - 429, B 440 - 449, B 510 - 539, B 540 -	Незначительные нарушения функций организма вследствие проявлений туберкулеза различной локализации в периоде потери активности (рубцевание, обызвествление; МБТ-); при эффективном окончании основного курса лечения. Отсутствие дыхательной недостаточности или наличие ДН 1 степени

					559, B 610 - 639, B 810 - 849	
1.2.2					Нарушения психических, сенсорных, нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций, нарушения функций сердечно-сосудистой системы, дыхательной, пищеварительной, эндокринной систем и метаболизма, мочевыделительной функции, функции кожи и связанных с ней систем; МКФ: B 110 - 139, B 140 - 189, B 198, B 199, B 210 - 299, B 710 - 789, B 798, B 799, B 410 - 429, B 440 - 449, B 510 - 539, B 540 - 559, B 610 - 639, B 810 - 849	Умеренные нарушения функций организма вследствие проявлений туберкулеза различной локализации (МБТ+ или МБТ-) и /или осложнений. Наличие ДН II степени, преходящая или постоянная легочная гипертензия (ХСН 0 или ХСН 1 стадии)
1.2.3					Нарушения психических, сенсорных функций, нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций, нарушения функций сердечно-сосудистой	Выраженные нарушения функций организма вследствие проявлений туберкулеза различной локализации (МБТ+ или МБТ-) и/или осложнений. Проявления множественной или широкой лекарственной

					системы, дыхательной, пищеварительной, эндокринной систем и метаболизма, мочевыделительной функции, функции кожи и связанных с ней систем; МКФ: B 110 - 139, B 140 - 189, B 198, B 199, B 210 - 299, B 710 - 789, B 798, B 799, B 410 - 429, B 440 - 449, B 510 - 539, B 540 - 559, B 610 - 639, B 810 - 849	устойчивости к микобактериям туберкулеза при наличии ДН II, III степени, ХСН IIA стадии
1.2.4					Нарушения психических, сенсорных, нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций, нарушения функций сердечно-сосудистой системы, дыхательной, пищеварительной, систем, эндокринной системы и метаболизма, мочевыделительной функции; функции кожи и связанных с ней систем; МКФ: B 110 - 139, B 140 - 189, B 198, B 199, B 210 - 299, B 710 - 789, B 798, B	Значительно выраженные нарушения функций организма вследствие проявлений туберкулеза различной локализации с полиорганными осложнениями (амилоидоз, полисерозиты, декомпенсированное хроническое легочное сердце, кахексия и прочее); Наличие ДН III степени и ХСН ПБ или III стадии

					799, B 410 - 429, B 440 - 449, B 510 - 539, B 540 - 559, B 610 - 639, B 810 - 849	
1.3			Последствия туберкулеза	B90		
1.3.1					Нарушения психических, сенсорных, нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций, нарушения сердечно-сосудистой системы, дыхательной системы, пищеварительной, систем и метаболизма, мочевыделительной функции, функции кожи и связанных с ней систем; МКФ: B 110 - 139, B 140 - 189, B 198, B 199, B 210 - 299, B 710 - 789, 798, B 799, B 410 - 429, B 440 - 449, B 510 - 539, B 540 - 559, B 610 - 639, B 810 - 849	Незначительные нарушения функций организма вследствие отдаленных проявлений последствий излеченного туберкулеза различной локализации и неуточненного туберкулеза. При отсутствии дыхательной недостаточности либо наличии ДН 1 степени
1.3.2					Нарушения психических, сенсорных, нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций, нарушения	Умеренные нарушения функций организма вследствие отдаленных проявлений последствий излеченного туберкулеза различной локализации и

					сердечно-сосудистой системы, дыхательной системы, пищеварительной, систем и метаболизма, мочевыделительной функции, функции кожи и связанных с ней систем; МКФ: B 110 - 139, B 140 - 189, B 198, B 199, B 210 - 299, B 710 - 789, 798, B 799, B 410 - 429, B 440 - 449, B 510 - 539, B 540 - 559, B 610 - 639, B 810 - 849	неуточненного туберкулеза. Наличие ДН II степени, преходящая или постоянная легочная гипертензия (ХСН 0 или ХСН 1 стадии)
1.3.3					Нарушения психических, сенсорных, нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций, нарушения сердечно-сосудистой системы, дыхательной системы, пищеварительной, систем и метаболизма, мочевыделительной функции, функции кожи и связанных с ней систем; МКФ: B 110 - 139, B 140 - 189, B 198, B 199, B 210 - 299, B 710 - 789, 798, B 799, B 410 - 429, B 440 - 449, B 510 - 539, B 540 - 559, B 610	Выраженные нарушения функций организма вследствие отдаленных проявлений последствий излеченного туберкулеза различной локализации и неуточненного туберкулеза. Наличие ДН II III степени, ХСН IIA стадии

					- 639, B 810 - 849	
1.3.4					Нарушения психических, сенсорных, нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций, нарушения сердечно-сосудистой системы, дыхательной системы, пищеварительной, систем и метаболизма, мочевыделительной функции, функции кожи и связанных с ней систем; МКФ: B 110 - 139, B 140 - 189, B 198, B 199, B 210 - 299, B 710 - 789, 798, B 799, B 410 - 429, B 440 - 449, B 510 - 539, B 540 - 559, B 610 - 639, B 810 - 849	Значительно выраженные нарушения функций организма вследствие отдаленных проявлений последствий излеченного туберкулеза различной локализации и неуточненного туберкулеза. Наличие ДН III степени, ХСН ПБ или III стадии
1.4			Болезнь, вызванная вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ) Бессимптомный инфекционный статус	B20 - B24 Z21		
1.4.1					Нарушение функций системы крови и иммунной системы;	Бессимптомный инфекционный статус, вызванный вирусом

					МКФ: B 430 - 439	иммунодефицита человека. ВИЧ-инфекция: стадия 3 (субклиническая стадия). Стадия 4А (вторичных заболеваний), фаза ремиссии (спонтанная, после АРТ, на фоне АРТ). Количество CD4+ - 350 и более клеток/мкл. Отсутствие или незначительные нарушения функций организма
1.4.2					Нарушения функций системы крови и иммунной системы, нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций; сердечно-сосудистой, дыхательной, эндокринной систем и метаболизма, пищеварительной системы, мочевыделительной функции, психических функций; МКФ: B 430 - 439, B 710 - 789, B 410 - 429, B 440 - 449, B 540 - 559, B 510 - 539, B 610 - 639, B 110 -	ВИЧ - инфекция: Стадия 4А (вторичных заболеваний), фаза прогрессирования на фоне АРТ. Умеренные нарушения функций организма на фоне АРТ и уровня CD4+ от 200 до 350 клеток/мкл. Стадия 4Б (вторичных заболеваний), фаза ремиссии на фоне АРТ (не менее 6 месяцев). Умеренные нарушения функций организма на фоне АРТ и уровня CD4+ от 200 до 350 клеток/мкл. Стадия 4В (вторичных заболеваний), фаза ремиссии

					139, B 140 - 189, B 198, B 199	на фоне АРТ (не менее 6 месяцев). Умеренные нарушения функций организма на фоне АРТ и уровня CD4+ более 200 клеток/мкл
1.4.3					Нарушения функций системы крови и иммунной системы, нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций; сердечно-сосудистой, дыхательной системы, эндокринной систем и метаболизма, пищеварительной системы, мочевыделительной функции, психических функций; МКФ: B 430 - 439, B 710 - 789, B 410 - 429, B 440 - 449, B 540 - 559, B 510 - 539, B 610 - 639, B 110 - 139, B 140 - 189, B 198, B 199	ВИЧ-инфекция: стадия 4Б (вторичных заболеваний), фаза прогрессирования на фоне АРТ. Выраженные нарушения функций организма на фоне АРТ и уровня CD4+ от 100 до 200 клеток/мкл. Стадия 4В (вторичных заболеваний), фаза ремиссии на фоне АРТ (не менее 6 месяцев). Выраженные нарушения функций организма на фоне АРТ и уровня CD4+ от 100 до 200 клеток/мкл
1.4.4					Нарушение функций системы крови и иммунной системы; нарушения	ВИЧ - инфекция: стадия 4В (вторичных заболеваний), фаза прогрессирования на

					нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций; сердечно-сосудистой, дыхательной системы; эндокринной системы и метаболизма; пищеварительной системы; мочевыделительной функции; нарушения психических функций; МКФ: B 430 - 439, B 710 - 789, B 410 - 429, B 440 - 449, B 540 - 559, B 510 - 539, B 610 - 639, B 110 - 139, B 140 - 189, B 198, B 199	фоне АРТ. Значительно выраженные нарушения функций организма на фоне АРТ и уровня CD4+ менее 100 клеток/мкл. Стадия 5 (терминальная). Значительно выраженные нарушения функций организма
2	Новообразования (класс II)			C00 - D48		

Примечание к пункту 2.
Количественная оценка степени выраженности стойких нарушений функций организма граждан в возрасте 18 лет и старше при зло
новообразованиях при первичном освидетельствовании зависит от клинико-морфологических факторов прогноза, локализации и размера опухоли, а
формы роста (эндофитная, экзофитная, смешанная), темпа роста опухоли и распространения опухоли (T), наличия и характера поражения лимфат
(N), наличия или отсутствия отдаленных метастазов (M), гистологического строения, степени дифференцировки и злокачественности опухол
опухолевого процесса (клиническая классификация по системе cTNMG до лечения, классификация pTNM - по результатам хирургического вм
cyTNM - по результатам лучевого, химиолучевого, химиотерапевтического, гормонального лечения). Учитываются также вид и объем лечения:
комбинированное, комплексное и паллиативное (хирургическое, лучевая терапия, химиотерапевтическое, гормональное лечения); наличия
проводимого лечения или противопоказаний к специальному лечению.
При повторном освидетельствовании количественная оценка проводится с учетом степени нарушенных функций организма после проведенного леч

ремиссии или возникновения рецидивов, метастазов, осложнений, продолженного роста опухоли после радикального лечения, а также с учетом неэ проводимой терапии.						
2.1		Злокачественные новообразования уточненных локализаций		C00 - C75		
2.1.1			Злокачественные новообразования губы	C00		
2.1.1.1					Нарушения функций системы крови и иммунной системы, языковых и речевых функций; МКФ: B 430 - 439; B 310 - 399	Рак нижней губы I, II стадии (T1N0M0) после радикального лечения
2.1.1.2					Нарушения функций системы крови и иммунной системы, пищеварительной системы, языковых и речевых функций; МКФ: B 430 - 439, B 510 - 539, B 310 - 399	Рак нижней губы I, II стадии (T1,2,3N1,2M0) после радикального лечения без местных и/или общих осложнений
2.1.1.3					Нарушения функций системы крови и иммунной системы, сердечно-сосудистой, дыхательной системы; эндокринной систем и метаболизма,	Рак нижней губы II, III стадии (T1,2,3,4N1,2,3M0) после проведенного радикального лечения с наличием местных и/или общих осложнений. Рак нижней губы после паллиативного лечения со

					пищеварительной системы, языковых и речевых функций; МКФ: B 430 - 439, B 410 - 429, B 440 - 449, B 540 - 559, B 510 - 539, B 310 - 399	стабилизацией опухолевого процесса
2.1.1.4					Нарушения функций системы крови и иммунной системы, нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций; сердечно-сосудистой, дыхательной, эндокринной систем и метаболизма, пищеварительной системы, психических функций, языковых и речевых функций; МКФ: B 430 - 439, B 710 - 789, B 410 - 429, B 440 - 449, B 540 - 559, B 510 - 539, B 110 - 139, B 140 - 189, B 198, B 199, B 310 - 399	Рак нижней губы IV стадии (T1,2,3,4N,1,2,3M1), инкурабельное состояние
2.1.2			Злокачественные новообразования полости рта и глотки (носоглотки, ротоглотки,	C01 - C14		

			гортаноглотки)			
2.1.2.1					Нарушения функций дыхательной системы, системы крови и иммунной системы, пищеварительной системы; языковых и речевых МКФ: B 440 - 450, B 430 - 439, B 510 - 539, B 310 - 399	Рак полости рта и глотки I, II стадии (T1,2N0M0) после радикального лечения, без признаков рецидива и остаточной опухоли
2.1.2.2					Нарушения функций дыхательной системы, системы крови и иммунной системы, языковых и речевых функций, функций пищеварительной системы; МКФ: B 440 - 450, B 430 - 439, B 310 - 399, B 510 - 539	Рак полости рта и глотки I, II стадии (T1,2N1M0) после радикального лечения, без местных и/или общих осложнений. Устранимая трахеостома
2.1.2.3					Нарушения функций системы крови и иммунной системы, сердечно-сосудистой, дыхательной системы, языковых и речевых функций, функций пищеварительной системы; МКФ: B 440 - 450, B 430 - 439, B 310 - 399, B 510 - 539	Рак полости рта и глотки II, III стадии (T1,2,3,4N1,2,3M0) после радикального или паллиативного лечения со стабилизацией; с наличием местных и/или общих осложнений. Неустранимая трахеостома
2.1.2.4					Нарушения функций системы крови и иммунной	Рак полости рта и глотки IV стадии (T1,2,3,4N1,2,3M1)

					системы, нарушения нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций; сердечно-сосудистой, дыхательной, эндокринной систем и метаболизма, пищеварительной системы, мочевыделительной функции; языковых и речевых функций, психических функций; МКФ: B 430 - 439, B 710 - 789, B 410 - 429, B 440 - 449, B 510 - 539, B 540 - 559, B 610 - 639, B 110 - 139, B 140 - 189, B 198, B 199, B 310 - 399	после радикального, паллиативного лечения, генерализации опухолевого процесса; наличием отдаленных метастазов, местных и/или общих осложнений. Инкурабельное состояние
2.1.3			Злокачественное новообразование пищевода	C15		
2.1.3.1					Нарушения функций системы крови и иммунной системы, пищеварительной, эндокринной систем и метаболизма; МКФ: B 430 - 439, B 510 - 539, B 540 - 559	Рак пищевода I, II стадии (T1N0M0) после радикального лечения

2.1.3.2					Нарушения функций системы крови и иммунной системы, пищеварительной, эндокринной систем и метаболизма; МКФ: B 430 - 439, B 510 - 539, B 540 - 559	Рак пищевода I, II стадии (T1,2N0,1M0) после радикального лечения без местных и/или общих осложнений. Устранимая гастростома, временное наличие эзофагогастрального зонда
2.1.3.3					Нарушения функций системы крови и иммунной системы, сердечно-сосудистой, дыхательной, эндокринной систем и метаболизма, пищеварительной системы; МКФ: B 430 - 439, B 410 - 429, B 440 - 449, B 540 - 559, B 510 - 539	Рак пищевода II, III стадии (T1,2,3N1,2,3M0) после радикального лечения при наличии местных и/или общих осложнений. Неустранимая гастростома, постоянное наличие эзофагогастрального зонда Рак пищевода (после паллиативного лечения со стабилизацией опухолевого процесса)
2.1.3.4					Нарушения функций системы крови и иммунной системы; нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций, сердечно-сосудистой, дыхательной, эндокринной систем и метаболизма,	Рак пищевода IV стадии (T1,2,3,4N,1,2,3M1), инкурабельное состояние

					пищеварительной систем, психических функций; МКФ: B 110 - 139, B 140 - 189 B 430 - 439, B 710 - 789, B 410 - 429, B 440 - 449, B 540 - 559, B 510 - 539, B 198, B 199	
2.1.4			Злокачественное новообразование желудка	C16		
2.1.4.1					Нарушение функции системы крови и иммунной системы; МКФ: B 430 - 439	Рак желудка I, II стадии (T1N0M0) после радикального лечения
2.1.4.2					Нарушения функций системы крови и иммунной системы, пищеварительной системы; МКФ: B 430 - 439, B 510 - 539	Рак желудка I, II стадии (T1,2N0M0) после радикального лечения без местных и/или общих осложнений. Гастрэктомия
2.1.4.3					Нарушение функции системы крови и иммунной системы; сердечно-сосудистой, дыхательной, эндокринной систем и метаболизма, пищеварительной системы; МКФ: B 430 - 439, B 410 - 429, B 440 - 449, B 540 - 559, B 510 - 539	Рак желудка II, III стадии (T1,2,3N1,2,3M0) после радикального лечения при наличии местных и/или общих осложнений и последствий лечения. Рак желудка после паллиативного лечения со стабилизацией опухолевого процесса

2.1.4.4					Нарушения функций системы крови и иммунной системы, нарушения нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций, сердечно-сосудистой, дыхательной, эндокринной систем и метаболизма, пищеварительной системы, нарушения психических функций; МКФ: B 110 - 139, B 140 - 189, B 430 - 439, B 710 - 789, B 410 - 429, B 440 - 449, B 540 - 559, B 510 - 539, B 198, B 199	Рак желудка IV стадии (T1,2,3,4N,1,2,3M0,1), инкурабельное состояние
2.1.5			Злокачественное новообразование тонкого кишечника Злокачественное новообразование ободочной кишки Злокачественное новообразование ректосигмоидного соединения	C17 C18 C19		
2.1.5.1					Нарушение функции	Рак кишечника I, II стадии

					системы крови и иммунной системы; МКФ: B 430 - 439	(T1N0M0) после радикального лечения
2.1.5.2					Нарушения функций системы крови и иммунной системы, пищеварительной системы; МКФ: B 430 - 439, B 510 - 539	Рак кишечника I, II стадии (T1,2N1M0) после радикального лечения без местных и/или общих осложнений. Сигмостома (устранимая) Еюностома (устранимая)
2.1.5.3					Нарушения функций системы крови и иммунной системы, сердечно-сосудистой, дыхательной, эндокринной систем и метаболизма; пищеварительной системы; МКФ: B 430 - 439, B 410 - 429, B 440 - 449, B 540 - 559, B 510 - 539	Рак кишечника II, III стадии (T1,2,3N1,2,3M0) после радикального лечения при наличии местных и/или общих осложнений. Еюностома, сигмостома (неустранимая) Рак кишечника после паллиативного лечения со стабилизацией опухолевого процесса.
2.1.5.4					Нарушения функции системы крови и иммунной системы, нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций, сердечно-сосудистой,	Рак кишечника IV стадии (T1,2,3,4N,1,2,3M1), инкурабельное состояние

					дыхательной, эндокринной систем и метаболизма, пищеварительной системы, нарушения психических функций; МКФ: B 110 - 139, B 140 - 189, B 430 - 439, B 710 - 789, B 410 - 429, B 440 - 449, B 540 - 559, B 510 - 539 B 198, B 199	
2.1.6			Злокачественное новообразование прямой кишки	C20		
2.1.6.1					Нарушения функций системы крови и иммунной системы, пищеварительной системы, МКФ: B 430 - 439, B 510 - 539	Рак прямой кишки I, II стадии (T1,2N0M0) после радикального лечения
2.1.6.2					Нарушения функций системы крови и иммунной системы, пищеварительной системы МКФ: B 430 - 439, B 510 - 539	Рак прямой кишки I, II стадии (T1,2N1M0) после радикального лечения без местных и/или общих осложнений Сигмостома, еюностома (устранимая)
2.1.6.3					Нарушение функции системы крови и иммунной системы; сердечно-сосудистой,	Рак прямой кишки II, III стадии (T1,2,3,4N1,2,3M0) после радикального лечения при наличии местных и/или

					дыхательной системы; эндокринной системы и метаболизма; пищеварительной системы; МКФ: B 430 - 439, B 410 - 429, B 440 - 449, B 540 - 559, B 510 - 539	общих осложнений. Сигмостома, еюностома, ректовагинальный свищ (неустранимые) Рак прямой кишки после паллиативного лечения со стабилизацией опухолевого процесса
2.1.6.4					Нарушения функции системы крови и иммунной системы, нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций, сердечно-сосудистой, дыхательной, эндокринной систем и метаболизма, пищеварительной системы, нарушения психических функций; МКФ: B 430 - 439, B 710 - 789, B 410 - 429, B 440 - 449, B 540 - 559, B 510 - 539, B 110 - 139, B 140 - 189, B 198, B 199	Рак прямой кишки IV стадии (T1,2,3,4N,1,2,3M0,1), инкурабельное состояние
2.1.7			Злокачественное новообразование печени и внутрипеченочных желчных протоков	C22		

2.1.7.1					Нарушения функций системы крови и иммунной системы, пищеварительной системы; МКФ: B 430 - 439, B 510 - 539	Рак печени и внутрипеченочных желчных протоков I, II стадии (T1,2N0,1M0) после радикального лечения без местных и общих осложнений
2.1.7.2					Нарушения функций системы крови и иммунной системы, сердечно-сосудистой, дыхательной, эндокринной систем и метаболизма, пищеварительной системы; МКФ: B 410 - 429, B 430 - 439, B 440 - 449, B 540 - 559, B 510 - 539	Рак печени и внутрипеченочных желчных протоков II, III стадии (T1,2,3N1,2,3M0) после радикального лечения при наличии местных и/или общих осложнений
2.1.7.3					Нарушения функций системы крови и иммунной системы, нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций, сердечно-сосудистой, дыхательной, эндокринной систем и метаболизма, пищеварительной системы, нарушения психических функций; МКФ: B 110 - 139, B 140 -	Рак печени и внутрипеченочных желчных протоков IV стадии (T1,2,3,4N1,2,3M0,1), инкурабельное состояние

					189, B 430 - 439, B 710 - 789, B 410 - 429, B 440 - 449, B 540 - 559, B 510 - 539, B 198, B 199	
2.1.8			Злокачественное новообразование желчного пузыря Злокачественное новообразование других и неуточненных частей желчевыводящих путей	C23 C24		
2.1.8.1					Нарушения функций системы крови и иммунной системы, пищеварительной системы; МКФ: B 430 - 439, B 510 - 539	Рак желчного пузыря или желчевыводящих путей II, III стадии (T1,2N0,1M0) после радикального лечения без местных и/или общих осложнений
2.1.8.2					Нарушения функций системы крови и иммунной системы, сердечно-сосудистой, дыхательной, эндокринной систем и метаболизма, пищеварительной системы; МКФ: B 430 - 439, B 410 - 429, B 440 - 449, B 540 - 559, B 510 - 539	Рак желчного пузыря или желчевыводящих путей I, II стадии (T1,2,3N1,2,3M0) после радикального лечения с общими и/или местными осложнениями
2.1.8.3					Нарушения функций	Рак желчного пузыря или

					системы крови и иммунной системы, нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций, сердечно-сосудистой, дыхательной, эндокринной систем и метаболизма, пищеварительной системы, нарушения психических функций; МКФ: B 110 - 139, B 140 - 189, B 430 - 439, B 710 - 789, B 410 - 429, B 440 - 449, B 540 - 559, B 510 - 539, B 198, B 199	желчевыводящих путей IV стадии (T1,2,3,4N1,2,3M1); инкурабельное состояние
2.1.9			Злокачественное новообразование поджелудочной железы	C25		
2.1.9.1					Нарушения функций системы крови и иммунной системы; нарушения нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций; сердечно-сосудистой, дыхательной системы; эндокринной системы и	Рак поджелудочной железы I, II, III стадии (Tis1,2,3N0,1,2,3M0) после радикального лечения с общими и/или местными осложнениями

					метаболизма; пищеварительной системы; МКФ: B 430 - 439, B 710 - 789, B 410 - 429, B 440 - 449, B 540 - 559, B 510 - 539	
2.1.9.2					Нарушения функций системы крови и иммунной системы, нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций, сердечно-сосудистой, дыхательной, эндокринной систем и метаболизма, пищеварительной системы, мочевыделительной функции, психических функций; МКФ: B 110 - 139, B 140 - 189, B 430 - 439, B 710 - 789, B 410 - 429, B 440 - 449, B 540 - 559, B 510 - 539, B 610 - 639, B 198, B 199	Рак поджелудочной железы IV стадии (T1,2,3,4N1,2,3M1); инкурабельное состояние
2.1.10			Злокачественное новообразование гортани	C32		
2.1.10.1					Нарушения функций дыхательной системы,	Рак гортани I, II стадии (T1N0M0G1) после

					системы крови и иммунной системы; языковых и речевых функций МКФ: B 440 - 450, B 430 - 439, B 310 - 399	радикального удаления опухоли (хордэктомия)
2.1.10.2					Нарушения функций дыхательной системы, системы крови и иммунной системы, языковых и речевых функций; МКФ: B 440 - 450, B 430 - 439, B 310 - 399	Рак гортани I, II стадии (T1,2,3N1M0) после радикального удаления опухоли (резекция гортани) и/или лучевая терапия по радикальной программе без местных и/или общих осложнений. Трахеостома с нарушением голосообразования
2.1.10.3					Нарушения функций системы крови и иммунной системы, сердечно-сосудистой, дыхательной систем, языковых и речевых функций; МКФ: B 430 - 439, B 410 - 429, B 440 - 449, B 310 - 399	Рак гортани II, III стадии (T1,2,3,4N1,2,3M0) после радикального или паллиативного лечения со стабилизацией; с наличием местных и/или общих осложнений. Трахеостома с нарушением голосообразования
2.1.10.4					Нарушения функций системы крови и иммунной системы, нейромышечных, скелетных и связанных с движением	Рак гортани IV стадии (T1,2,3,4N1,2,3M1) после радикального лечения с рецидивом или генерализации опухолевого процесса,

					(статодинамических) функций, сердечно-сосудистой, дыхательной, эндокринной систем и метаболизма, пищеварительной системы; мочевыделительной функции, психических функций; МКФ: B 110 - 139, B 140 - 189, B 430 - 439, B 710 - 789, B 410 - 429, B 440 - 449, B 540 - 559, B 510 - 539, B 610 - 639, B 198, B 199	наличием отдаленных метастазов, с наличием местных и/или общих осложнений. Инкурабельное состояние
2.1.11			Злокачественное новообразование бронхов и легкого Карцинома in situ	C34 D02.2		
2.1.11.1					Нарушение функции системы крови и иммунной системы; МКФ: B 430 - 439	Рак бронхов и легкого I стадии (Tis,1N0M0) после радикального лечения
2.1.11.2					Нарушения функций дыхательной системы, сердечно-сосудистой системы, системы крови и иммунной системы; МКФ: B 440 - 450, B 410 -	Рак бронхов и легкого I, II стадии (Tis,1,2N0,1M0) после радикального лечения без местных и/или общих осложнений. Пульмонэктомия

					429; B 430 - 439	
2.1.11.3					Нарушения функций дыхательной системы, сердечно-сосудистой системы, системы крови и иммунной системы; МКФ: B 440 - 450, B 410 - 429; B 430 - 439	Рак легкого II, III стадии (T1,2,3,4N1,2,3M04) после радикального лечения с местными и/или общими осложнениями. Рак легкого после паллиативного лечения со стабилизацией опухолевого процесса
2.1.11.4					Нарушения функций системы крови и иммунной системы, нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций, сердечно-сосудистой, дыхательной, эндокринной систем и метаболизма, пищеварительной системы, мочевыделительной функции, психических функций; МКФ: B 110 - 139, B 140 - 189, B 198, B 430 - 439, B 710 - 789, B 410 - 429, B 440 - 449, B 540 - 559, B 510 - 539, B 610 - 639, B 199	Рак легкого IV стадии (T1,2,3,4N1,2,3M1), инкурабельное состояние

2.1.12			Злокачественные новообразования костей и суставных хрящей	C40 - C41		
2.1.12.1					Нарушения функций системы крови и иммунной системы, нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций, сердечно-сосудистой, дыхательной, эндокринной систем и метаболизма, пищеварительной системы, мочевыделительной функции, психических функций; МКФ: B 110 - 139, B 140 - 189, B 430 - 439, B 710 - 789, B 410 - 429, B 440 - 449, B 540 - 559, B 510 - 539, B 610 - 639, B 198, B 199	Рак кости II, III стадии (T1,2,3,4N1,2,3M0) после радикального лечения без местных и/или общих осложнений. Сомнительный прогноз после операции по поводу саркомы Юинга, остеогенной саркомы. При длительном комбинированном или комплексном лечении. При рецидивах и метастазах опухоли. При наличии местных и/или общих осложнений с вовлечением соседних органов
2.1.12.2					Нарушения функций системы крови и иммунной системы, нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций,	Прогрессирование заболевания после проведенного радикального лечения. Тяжелое состояние больного при рецидиве опухоли, отдаленных метастазах.

					сердечно-сосудистой, дыхательной, эндокринной систем и метаболизма, пищеварительной системы, мочевыделительной функции, психических функций; МКФ: B 110 - 139, B 140 - 189, B 430 - 439, B 710 - 789, B 410 - 429, B 440 - 449, B 540 - 559, B 510 - 539, B 610 - 639, B 198, B 199	Инкурабельное состояние. Осложнения после комбинированного или комплексного лечения
2.1.13			Злокачественная меланома кожи	C43		
2.1.13.1					Нарушения функций системы крови и иммунной системы, функции кожи и связанных с ней систем; МКФ: B 430 - 439; B 810 - 849	Меланома кожи I, стадии (T1aN0M0) после радикального удаления
2.1.13.2					Нарушения функции системы крови и иммунной системы, функции кожи и связанных с ней систем; МКФ: B 430 - 439; B 810 - 849	Меланома кожи I, II стадии (T1a,bN0,1M0) после радикального удаления без местных и/или общих осложнений
2.1.13.3					Нарушения функций системы крови и иммунной	Меланома кожи II, III стадии (T1,2,3,4N1,2,3M0) после

					системы, функции кожи и связанных с ней систем МКФ: B 430 - 439; B 810 - 849	радикального лечения с местными и/или общими осложнениями. Наличие местного рецидива на фоне проводимой терапии
2.1.13.4					Нарушения функций системы крови и иммунной системы, нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций, сердечно-сосудистой, дыхательной, эндокринной систем и метаболизма, пищеварительной системы; нарушения психических функций, функции кожи и связанных с ней систем; МКФ: B 110 - 139, B 140 - 189, B 430 - 439, B 710 - 789, B 410 - 429, B 440 - 449, B 510 - 539, B 540 - 559, B 810 - 849, B 198, B 199	Меланома IV стадии (T1,2,3,4,N1,2,3M1), инкурабельное состояние. Прогрессирование опухолевого процесса
2.1.14			Меланома глаза	C43.3		
Примечание к подпункту 2.1.14. Количественная оценка нарушенных функций организма граждан в возрасте 18 лет и старше при меланоме глаза п освидетельствовании производится с учетом нарушения зрительных функций лучше видящего или единственного глаза в) условиях максимально коррекции.						

2.1.14.1					Нарушения функций системы крови и иммунной системы, сенсорных функций (зрения), функции кожи и связанных с ней систем; МКФ: B 430 - 439; B 210 - 229 (зрения), B 810 - 849	Меланома глаза T1,2N0M0 после радикального лечения с местными и/или общими осложнениями. Меланома глаза T1,2,3,4N0,1M0 после радикального лечения при повторном освидетельствовании
2.1.14.2					Нарушения функций системы крови и иммунной системы, сенсорных функций (зрения), функции кожи и связанных с ней систем; МКФ: B 430 - 439; B 210 - 229 (зрения), B 810 - 849	Меланома глаза T1,2,3,4N0,1M0 после радикального лечения с местными и/или общими осложнениями
2.1.14.3					Нарушения функций системы крови и иммунной системы, сенсорных функций (зрения), функции кожи и связанных с ней систем; МКФ: B 430 - 439; B 210 - 229 (зрения), B 810 - 849	Меланома глаза (T1,2,3,4N0,1M1) инкурабельное состояние. Прогрессирование опухолевого процесса
2.1.15			Злокачественные новообразования кожи	C44		
2.1.15.1					Нарушения функций системы крови и иммунной	Рак кожи I, II стадии (T1,2N0M0) после

					системы, функции кожи и связанных с ней систем; МКФ: B 430 - 439; B 810 - 849	радикального лечения
2.1.15.2					Нарушения функций системы крови и иммунной системы, сердечно-сосудистой, дыхательной, эндокринной систем и метаболизма, функции кожи и связанных с ней систем; МКФ: B 430 - 439, B 410 - 429, B 440 - 449, B 540 - 559, B 810 - 849	Рак кожи II стадии (T2,3N0M0) после радикального лечения без местных и/или общих осложнений
2.1.15.3					Нарушения функций системы крови и иммунной системы, сердечно-сосудистой, дыхательной, эндокринной систем и метаболизма, функции кожи и связанных с ней систем; МКФ: B 430 - 439, B 410 - 429, B 440 - 449, B 540 - 559; B 810 - 849	Рак кожи III стадии (T1,2,3,4N1,2,3M0) после радикального или паллиативного лечения; рецидив, требующий специального лечения. Наличие местных и/или общих осложнений
2.1.15.4					Нарушения функций системы крови и иммунной системы,	Рак кожи IV стадии (T1,2,3,4N2,3M1), инкурабельное состояние

					сердечно-сосудистой, дыхательной, эндокринной систем и метаболизма, функции кожи и связанных с ней систем; МКФ: B 430 - 439, B 410 - 429, B 440 - 449, B 540 - 559; B 810 - 849	
2.1.16			Злокачественные новообразования мягких тканей Новообразование неопределенного или неизвестного характера других и неуточненных локализаций Десмоидные фибромы	C49 D48.1		
2.1.16.1					Нарушения функций системы крови и иммунной системы, нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций, сердечно-сосудистой, дыхательной, эндокринной систем и метаболизма, пищеварительной системы; мочевыделительной	Саркома мягких тканей II III стадии (T12N1M0) после радикального лечения без местных и/или общих осложнений. Сомнительный прогноз после операции по поводу внескелетной саркомы Юинга, саркомы мягких тканей, десмоидной фибромы. При длительном комбинированном и/или комплексном лечении. При

					функции; психических функций, функции кожи и связанных с ней систем; МКФ: B 110 - 139, B 140 - 189, B 410 - 429, B 430 - 439, B 440 - 449, B 540 - 559, B 510 - 539, B 610 - 639, B 710 - 789, B 810 - 849	рецидивах и метастазах опухоли. При наличии общих осложнений с вовлечением соседних органов и структур
2.1.16.2					Нарушения функций системы крови и иммунной системы, нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций, сердечно-сосудистой, дыхательной, эндокринной систем и метаболизма, пищеварительной системы, мочевыделительной функции, нарушения психических функций, функции кожи и связанных с ней систем; МКФ: B 110 - 139, B 140 - 189, B 430 - 439, B 710 - 789, B 410 - 429, B 440 - 449, B 510 - 539, B 540 - 559, B 610 - 639, B 810 - 849	Прогрессирующие заболевание после проведенного лечения. Тяжелое состояние больного при рецидиве опухоли, отдаленных метастазах. Инкурабельное состояние
2.1.17			Злокачественное	C50		

			новообразование молочной железы Карцинома in situ молочной железы	D05		
2.1.17.1					Нарушение функции системы крови и иммунной системы; МКФ: B 430 - 439	Рак молочной железы I стадии (Tis,1N0M0) после радикального лечения
2.1.17.2					Нарушения функций системы крови и иммунной системы, сердечно-сосудистой, дыхательной, эндокринной систем и метаболизма, функции кожи и связанных с ней систем; МКФ: B 430 - 439, B 410 - 429, B 440 - 449, B 540 - 559; B 810 - 849	Рак молочной железы I, II стадии (T1N0M0) после двусторонней мастэктомии. Рак молочной железы I, II стадии (T1,2N1M0) после радикального лечения без местных и/или общих осложнений
2.1.17.3					Нарушения функций системы крови и иммунной системы, нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций, сердечно-сосудистой, дыхательной, эндокринной систем и метаболизма,	Рак молочной железы I, II стадии (T1,2N0,1M0) после двусторонней мастэктомии. Рак молочной железы II, III стадии (T2,3N1M0) после радикального лечения, наличие местных и/или общих осложнений. Рак молочной железы после паллиативного лечения с

					функции кожи и связанных с ней систем; МКФ: B 430 - 439, B 710 - 789, B 410 - 429, B 440 - 449, B 540 - 559; B 810 - 849	удалением единичного метастаза со стабилизацией опухолевого процесса
2.1.17.4					Нарушения функций системы крови и иммунной системы, нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций, сердечно-сосудистой, дыхательной, эндокринной систем и метаболизма, пищеварительной системы, мочевыделительной функции, нарушения психических функций, функции кожи и связанных с ней систем; МКФ: B 110 - 139, B 140 - 189, B 430 - 439, B 410 - 429, B 440 - 449, B 540 - 559, B 510 - 539, B 610 - 639, B 710 - 789, B 810 - 849	Рак молочной железы IV (T1,2,3,4N1,2,3M1), инкурабельное состояние
2.1.18			Злокачественные новообразования наружных женских половых органов	C51.8		

			Злокачественные новообразования влагалища	C52		
2.1.18.1					Нарушение функции системы крови и иммунной системы МКФ: B 430 - 439	Рак наружных женских половых органов, влагалища I, II стадии (T1N0M0) после радикального лечения
2.1.18.2					Нарушения функций системы крови и иммунной системы, сердечно-сосудистой, эндокринной системы и метаболизма; МКФ: B 430 - 439, B 410 - 429, B 540 - 559	Рак наружных женских половых органов, влагалища I, II стадии (T1,2N1M0) после радикального лечения, без местных и/или общих осложнений
2.1.18.3					Нарушения функций системы крови и иммунной системы, сердечно-сосудистой, дыхательной, эндокринной систем и метаболизма, мочевыделительной функции; МКФ: B 430 - 439, B 410 - 429, B 440 - 449, B 540 - 559, B 610 - 639, B 640 - 679	Рак наружных женских половых органов, влагалища II, III стадии (T1,2,3N1,2,3M0) после радикального лечения; наличие местных и/или общих осложнений (неустранимые урогенитальный, ректовагинальный свищи). Рак наружных женских половых органов, влагалища после паллиативного лечения со стабилизацией опухолевого процесса
2.1.18.4					Нарушения функций	Рак наружных женских

					системы крови и иммунной системы, нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций, сердечно-сосудистой, дыхательной, эндокринной систем и метаболизма, пищеварительной системы, мочевыделительной функции, нарушения психических функций; МКФ: B 110 - 139, B 140 - 189, B 430 - 439, B 410 - 429, B 440 - 449, B 540 - 559, B 510 - 539, B 610 - 639, B 640 - 679, B 710 - 789	половых органов, влагалища IV стадии (T1,2,3,4N1,2,3M1), инкурабельное состояние
2.1.19			Злокачественное новообразование шейки матки Злокачественное новообразование тела матки	C53 C54		
2.1.19.1					Нарушение функции системы крови и иммунной системы; МКФ: B 430 - 439	Рак шейки или тела матки I, II стадии (T1N0M0) после радикального лечения
2.1.19.2					Нарушения функций	Рак шейки или тела матки I, II

					системы крови и иммунной системы, сердечно-сосудистой, эндокринной систем и метаболизма; МКФ: B 430 - 439, B 410 - 429, B 540 - 559	стадии (T1,2aN0,1M0) после радикального лечения без местных и/или общих осложнений
2.1.19.3					Нарушения функций системы крови и иммунной системы, сердечно-сосудистой, дыхательной, эндокринной систем и метаболизма, мочевыделительной функции; МКФ: B 430 - 439, B 410 - 429, B 440 - 449, B 540 - 559, B 610 - 639, B 640 - 679	Рак шейки или тела матки II, III стадии (T1,2a,b,N1,2,3M0) после радикального лечения с наличием местных и/или общих осложнений (неустранимые урогенитальный, ректовагинальный свищи). Рак шейки или тела матки после паллиативного лечения со стабилизацией опухолевого процесса
2.1.19.4					Нарушения функций системы крови и иммунной системы, нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций, сердечно-сосудистой, дыхательной, эндокринной систем и метаболизма, пищеварительной системы,	Рак шейки или тела матки IV стадии (T1,2,3,4N1,2,3M1), инкурабельное состояние

					мочевыделительной функции, нарушения психических функций; МКФ: B 110 - 139, B 140 - 189, B 430 - 439, B 410 - 429, B 440 - 449, B 540 - 559, B 510 - 539, B 610 - 639, B 640 - 679, B 710 - 789	
2.1.20			Злокачественные новообразования яичника	C56		
2.1.20.1					Нарушения функций системы крови и иммунной системы, сердечно-сосудистой, эндокринной систем и метаболизма; МКФ: B 430 - 439, B 410 - 429, B 540 - 559	Рак яичника I, II стадии (T1a-b,2N0,1M0) после радикального лечения без местных и/или общих осложнений
2.1.20.2					Нарушения функций системы крови и иммунной системы, сердечно-сосудистой, дыхательной эндокринной систем и метаболизма, мочевыделительной функции; МКФ: B 430 - 439, B 410 - 429, B 440 - 449, B 540 - 559, B 610 - 639, B 640 - 679	Рак яичника II, III стадии (T1,2,3,4N1,2,3M0) после радикального лечения с наличием местных и/или общих осложнений. Рак яичника после паллиативного лечения со стабилизацией опухолевого процесса

2.1.20.3					Нарушения функций системы крови и иммунной системы, нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций, сердечно-сосудистой, дыхательной, эндокринной систем и метаболизма, пищеварительной системы, мочевыделительной функции, психических функций; МКФ: B 110 - 139, B 140 - 189, B 430 - 439, B 410 - 429, B 440 - 449, B 540 - 559, B 510 - 539, B 610 - 639, B 640 - 679, B 710 - 789	Рак яичника IV стадии (T1,2,3,4N1,2,3M1), инкурабельное состояние
2.1.21			Злокачественное новообразование полового члена	C60		
2.1.21.1					Нарушения функций системы крови и иммунной системы, мочевыделительной функции; МКФ: B 430 - 439, B 610 - 639	Рак полового члена I стадии (T1a-bN0,M0) после радикального лечения без местных и/или общих осложнений

2.1.21.2					Нарушения функций системы крови и иммунной системы, мочевыделительной функции; МКФ: B 430 - 439, B 610 - 639	Рак полового члена I, II стадии (T1,2N0,1M0) после радикального лечения без местных и/или общих осложнений
2.1.21.3					Нарушения функций системы крови и иммунной системы, сердечно-сосудистой, дыхательной, эндокринной систем и метаболизма, мочевыделительной функции, психических функций; МКФ: B 110 - 139, B 140 - 189, B 430 - 439, B 410 - 429, B 440 - 449, B 540 - 559, B 610 - 639, B 640 - 679	Рак полового члена II, III стадии (T1a-b,2,3,4N1,2M0) после радикального лечения, наличие местных и/или общих осложнений
2.1.21.4					Нарушения функций системы крови и иммунной системы, сердечно-сосудистой, дыхательной, эндокринной систем и метаболизма, мочевыделительной функции, психических функций; МКФ: B 110 - 139, B 140 -	Рак полового члена IV стадии (T1,2,3,4N1,2,3M1, инкурабельное состояние

					189, B 430 - 439, B 410 - 429, B 440 - 449, B 540 - 559, B 610 - 639, B 640 - 679	
2.1.22			Злокачественное новообразование предстательной железы	C61		
2.1.22.1					Нарушения функций системы крови и иммунной системы, эндокринной системы и метаболизма, мочевыделительной функции; МКФ: B 430 - 439, B 610 - 639, B 540 - 559	Рак предстательной железы I - IV стадии (T1,2N0,1M0) после радикального лечения без местных и/или общих осложнений
2.1.22.2					Нарушения функций системы крови и иммунной системы, сердечно-сосудистой, дыхательной, эндокринной систем и метаболизма, мочевыделительной функции, нарушения психических функций; МКФ: B 110 - 139, B 140 - 189, B 430 - 439, B 410 - 429, B 440 - 449, B 540 - 559, B 610 - 639, B 640 - 679	Рак предстательной железы II - IV стадии (T1,2,3N1M0) после радикального лечения при наличии местных и/или общих осложнений. Рак предстательной железы после паллиативного лечения со стабилизацией опухолевого процесса
2.1.22.3					Нарушения функции системы крови и иммунной	Рак предстательной железы IV стадии (T1,2,3,4N1M1),

					системы, нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций, сердечно-сосудистой, дыхательной, эндокринной систем и метаболизма, пищеварительной системы; мочевыделительной функции, психических функций; МКФ: B 110 - 139, B 140 - 189 B 430 - 439, B 410 - 429, B 440 - 449, B 540 - 559, B 510 - 539, B 610 - 639, B 640 - 679, B 710 - 789	инкурабельное состояние
2.1.23			Злокачественные новообразования яичка	C62		
2.1.23.1					Нарушение функции системы крови и иммунной системы МКФ: B 430 - 439	Рак яичка I стадии (T1N0M0, SO, SX) после радикального лечения
2.1.23.2					Нарушения функций системы крови и иммунной системы, эндокринной системы и метаболизма, мочевыделительной функции;	Рак яичка IIA стадии (T1-4N1M0, SO, SX) после радикального удаления без местных и/или общих осложнений

					МКФ: B 430 - 439, B 540 - 559, B 610 - 639, B 640 - 679	
2.1.23.3					Нарушения функций системы крови и иммунной системы, сердечно-сосудистой, дыхательной, эндокринной систем и метаболизма, мочевыделительной функции, психических функций; МКФ: B 110 - 139, B 140 - 189, B 430 - 439, B 410 - 429, B 440 - 449, B 540 - 559, B 610 - 639, B 640 - 679	Рак яичка IIA - IIIC стадии (T1,2,3,4N1,2,3M0S1-3) после радикального удаления при наличии местных и/или общих осложнений
2.1.23.4					Нарушения функций системы крови и иммунной системы, сердечно-сосудистой, дыхательной, эндокринной систем и метаболизма, мочевыделительной функции, нарушения психических функций; МКФ: B 110 - 139, B 140 - 189, B 430 - 439, B 410 - 429, B 440 - 449, B 540 - 559, B 610 - 639, B 640 - 679	Рак яичка IIA - IIIC стадии (T1,2,3,4N1,2,3M1a-b), инкурабельное состояние
2.1.24			Злокачественное	C64		

			новообразование почки, кроме почечной лоханки Злокачественное новообразование почечных лоханок	C65		
2.1.24.1					Нарушение функции системы крови и иммунной системы; МКФ: B 430 - 439	Рак почки (T1,2,3,4N0M0) Рак почечной лоханки (T1,2N0M0) после радикального лечения, при удовлетворительной функции второй почки.
2.1.24.2					Нарушения функций системы крови и иммунной системы, мочевыделительной функции; МКФ: B 430 - 439; B 610 - 639	Рак почки (T1-4N0-1M0). Рак почечной лоханки (T1-2N0M0) после радикального лечения без местных и/или общих осложнений, при умеренно выраженных нарушениях функции второй почки.
2.1.24.3					Нарушения функций системы крови и иммунной системы, нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций, сердечно-сосудистой, дыхательной систем, мочевыделительной	Рак почки (T1-4N0-1M1 и рак почечной лоханки (T3-4N0-1M0-1) после радикального лечения при наличии местных и/или общих осложнений или после радикального лечения без местных и/или общих осложнений, но при выраженных нарушениях

					функции; МКФ: B 430 - 439, B 710 - 789, B 410 - 429, B 440 - 449, B 610 - 639	функции второй почки. Рак почки после паллиативного лечения со стабилизацией опухолевого процесса. Неудаляемая (постоянная) нефростома.
2.1.24.4					Нарушения функций системы крови и иммунной системы, нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций, сердечно-сосудистой, дыхательной, эндокринной систем и метаболизма, пищеварительной системы; мочевыделительной функции, психических функций; МКФ: B 110 - 139, B 140 - 189, B 430 - 439, B 410 - 429, B 440 - 449, B 540 - 559, B 610 - 639, B 710 - 789	Рак почки и почечной лоханки (T1-4N0-1M1). Рак почечной лоханки (T3-4N0-3M1), инкурабельное состояние
2.1.25			Злокачественное новообразование мочевого пузыря	C67		
2.1.25.1					Нарушение функции системы крови и иммунной	Рак мочевого пузыря I - II стадии (T1,2aN0M0) после

					системы; МКФ: B 430 - 439	радикального удаления опухоли. За исключением цистэктомии
2.1.25.2					Нарушения функций системы крови и иммунной системы, мочевыделительной функции; МКФ: B 430 - 439, B 610 - 639	Рак мочевого пузыря I - IV стадии (T1,2a,bN0,1M0) после радикального удаления (включая цистэктомию) без местных и/или общих осложнений. Устранимая цистостома. Устранимая уретерокутанеостома
2.1.25.3					Нарушения функций системы крови и иммунной системы, мочевыделительной функции, психических функций; МКФ: B 430 - 439, B 610 - 639, B 110 - 139, B 140 - 189	Рак мочевого пузыря I - IV стадия (T1,2,3,4N2,3M0) после радикального лечения с наличием местных и/или общих осложнений. Рак мочевого пузыря после паллиативного лечения со стабилизацией опухолевого процесса. Неустранимая цистостома. Неустранимая уретерокутанеостома
2.1.25.4					Нарушения функций системы крови и иммунной системы, нейромышечных, скелетных и связанных с движением	Рак мочевого пузыря IV стадии (T1,2,3,4N1,2,3M1), инкурабельное состояние

					(статодинамических) функций, сердечно-сосудистой, дыхательной, эндокринной систем и метаболизма, пищеварительной системы, мочевыделительной функции, психических функций; МКФ: B 110 - 139, B 140 - 189, B 430 - 439, B 410 - 429, B 440 - 449, B 540 - 559, B 510 - 539; B 610 - 639, B 710 - 789	
2.1.26			Злокачественное новообразование головного мозга Злокачественное новообразование мозжечка Злокачественное новообразование спинного мозга	C71 C71.6 C72		
2.1.26.1					Нарушения функций системы крови и иммунной системы, нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических)	Опухоли головного и спинного мозга 2 степени злокачественности после радикального лечения без местных и/или общих осложнений

					функций, языковых и речевых, сенсорных, психических функций; МКФ: B 110 - 139, B 140 - 189, B 210 - 229, B 230 - 249, B 310 - 399, B 430 - 439, B 710 - 789	
2.1.26.2					Нарушения функций системы крови и иммунной системы, нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) языковых и речевых, сенсорных, психических функций; МКФ: B 110 - 139, B 140 - 189, B 210 - 229, B 230 - 249, B 310 - 399, B 430 - 439, B 710 - 789	Опухоли головного и спинного мозга 3 степени злокачественности после радикального лечения с наличием местных и/или общих осложнений
2.1.26.3					Нарушения функций системы крови и иммунной системы, нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций, сердечно-сосудистой, дыхательной, эндокринной систем и метаболизма,	Опухоли головного и спинного мозга 4 степени злокачественности после радикального или паллиативного лечения, инкурабельное состояние

					пищеварительной системы, мочевыделительной функции, языковых и речевых, сенсорных функций, психических функций; МКФ: B 110 - 139, B 140 - 189, B 210 - 229, B 230 - 249, B 310 - 399, B 410 - 429, B 430 - 439, B 440 - 449, B 540 - 559, B 510 - 539; B 610 - 639; B 710 - 789	
2.1.27			Злокачественное новообразование щитовидной железы	C73		
2.1.27.1					Нарушение функции системы крови и иммунной системы; МКФ: B 430 - 439	Рак щитовидной железы (T1,2N0M0) после радикального лечения
2.1.27.2					Нарушения функций системы крови и иммунной системы, эндокринной системы и метаболизма, языковых и речевых функций; МКФ: B 310 - 399, B 430 - 439, B 540 - 559	Рак щитовидной железы (T1,2,3N1,2M0) после радикального лечения без местных и/или общих осложнений
2.1.27.3					Нарушения функций системы крови и иммунной	Рак щитовидной железы (T2,3,4N1,2,3M0) после

					системы, эндокринной системы и метаболизма, языковых и речевых функций; МКФ: B 310 - 399, B 430 - 439, B 540 - 559	радикального лечения с наличием местных и/или общих осложнений. Рак щитовидной железы после паллиативного лечения со стабилизацией опухолевого процесса
2.1.27.4					Нарушения функций системы крови и иммунной системы, нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций, сердечно-сосудистой, дыхательной, эндокринной системы и метаболизма, пищеварительной системы; мочевыделительной функции, психических функций; МКФ: B 110 - 139, B 140 - 189, B 430 - 439, B 410 - 429, B 440 - 449, B 540 - 559, B 510 - 539; B 610 - 639, B 710 - 789	Рак щитовидной железы (T1,2,3,4N1,2,3M1), инкурабельное состояние
2.1.28		Злокачественное новообразование надпочечника	Злокачественная феохромоцитома	C74.1 (добавочный код E27.5)	Нарушения функций системы крови и иммунной системы, нейромышечных, скелетных и связанных с	Злокачественная феохромоцитома IV стадии (T1,2,3,4N1,2,3M1) после радикального, комплексного

					движением (статодинамических) функций, сердечно-сосудистой, дыхательной, эндокринной системы и метаболизма, пищеварительной системы; мочевыделительной функции, психических функций; МКФ: B 110 - 139, B 410 - 429, B 450 - 469, B 430 - 439, B 510 - 559, B 610 - 639, B 730 - 749	или комбинированного лечения с наличием местных и/или общих осложнений. Злокачественная феохромоцитома после паллиативного лечения со стабилизацией опухолевого процесса. Инкурабельное состояние
2.1.29		Злокачественные новообразования неточно обозначенных, вторичных и неуточненных локализаций		C76 - C80		
2.1.29.1						Метастазы без выявленного первичного очага после радикального лечения
2.1.29.2					Нарушения функций системы крови и иммунной системы, нейромышечных, скелетных и связанных с движением	Метастазы без выявленного первичного очага

					(статодинамических) функций, сердечно-сосудистой, дыхательной, эндокринной систем и метаболизма, пищеварительной системы, мочевыделительной функции, языковых, и речевых, сенсорных, психических функций; МКФ: B 430 - 439, B 710 - 789, B 410 - 429, B 440 - 449, B 540 - 559, B 510 - 539, B 610 - 639, B 110 - 139, B 140 - 189, B 198, B 310 - 399, B 201 - 229, B 230 - 249, B 199	
2.1.30		Злокачественные новообразования лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей		C81 - C96		
2.1.30.1			Болезнь Ходжкина (лимфогранулематоз)	C81		
2.1.30.1.1					Нарушение функции системы крови и иммунной системы; МКФ: B 430 - 439	Лимфома Ходжкина I, II стадии после курса лечения при достижении полной клинико-гематологической

						ремиссии
2.1.30.1.2					Нарушения функций системы крови и иммунной системы; дыхательной, сердечно-сосудистой системы; МКФ: B 430 - 439, B 440 - 449; B 410 - 429	Лимфома Ходжкина I, II стадии после курса лечения при достижении неполной клинико-гематологической ремиссии с умеренными нарушениями функций организма
2.1.30.1.3					Нарушения функций системы крови и иммунной системы; функций сердечно-сосудистой, дыхательной, пищеварительной систем; мочевыделительной функции; МКФ: B 410 - 429, B 430 - 439, B 440 - 450, B 510 - 539, B 610 - 639	Лимфома Ходжкина III, IV стадии на фоне терапии с выраженными нарушениями функций организма. Лимфома Ходжкина II стадии при наличии осложнений терапии с выраженными нарушениями функций организма
2.1.30.1.4					Нарушения психических функций, функции системы крови и иммунной системы, сердечно-сосудистой, дыхательной, эндокринной систем и метаболизма, пищеварительной системы, мочевыделительной функции, психических функций;	Лимфома Ходжкина IV стадии, резистентная к лечению Трансформация в другое лимфо/миелопролиферативное заболевание. Значительно выраженные нарушения функций организма

					МКФ: B 110 - 139, B 140 - 189, B 198, B 199, B 430 - 439, B 410 - 429, B 440 - 450, B 510 - 539, B 540 - 559, B 610 - 639	
2.1.30.2			Фолликулярная (нодулярная) неходжкинская лимфома Диффузная неходжкинская лимфома Другие и неуточненные типы неходжкинской лимфомы Другие уточненные типы T/NK-клеточной лимфомы Макроглобулинемия Вальденстрема	C82 C83 C85 C86 C88.0		
2.1.30.2.1					Нарушения функций системы крови и иммунной системы, функций сердечно-сосудистой, дыхательной, эндокринной систем и метаболизма, пищеварительной системы, мочевыделительной функции;	При первичном освидетельствовании - неходжкинская лимфома любой стадии

					МКФ: B 430 - 439, B 410 - 429, B 440 - 450, B 540 - 559, B 510 - 539, B 610 - 639	
2.1.30.2.2					Нарушения функций системы крови и иммунной системы, функций сердечно-сосудистой, дыхательной, эндокринной систем и метаболизма, пищеварительной системы, мочевыделительной функции; МКФ: B 430 - 439, B 410 - 429, B 440 - 450, B 540 - 559, B 510 - 539, B 610 - 639	При первичном освидетельствовании - прогрессия неходжкинских лимфом на фоне терапии со значительно выраженными нарушениями функций крови и иммунной системы, других функций организма
Повторное освидетельствование						
2.1.30.2.3					Нарушения функций системы крови и иммунной системы, функций сердечно-сосудистой, дыхательной, эндокринной систем и метаболизма, пищеварительной системы, мочевыделительной функции; МКФ: B 430 - 439, B 410 - 429, B 440 - 450, B 540 - 559, B 510 - 539, B 610 - 639	Неходжкинские лимфомы I, II, III стадии, при отсутствии прогрессирования заболевания или при достижении длительной ремиссии с умеренными нарушениями функций организма
2.1.30.2.4					Нарушения функций	Неходжкинские лимфомы I,

					системы крови и иммунной системы, функций сердечно-сосудистой, дыхательной, эндокринной систем и метаболизма, пищеварительной системы, мочевыделительной функции; психических функций; МКФ: B 110 - 139, B 140 - 189, B 430 - 439, B 410 - 429, B 440 - 450, B 540 - 559, B 510 - 539, B 610 - 639	II, III, IV стадии с прогрессированием на фоне терапии. Выраженные нарушения функций организма
2.1.30.2.5					Нарушения функций системы крови и иммунной системы, нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций, нарушения функций сердечно-сосудистой, дыхательной, эндокринной систем и метаболизма, пищеварительной системы, мочевыделительной функции, психических функций; МКФ: B 430 - 439, B 710 - 789, B 410 - 429, B 440 - 450, B 540 - 559, B 510 -	Прогрессирующие неходжкинские лимфомы со значительно выраженными нарушениями функций организма

					539, B 610 - 639, B 110 - 139, B 140 - 189	
2.1.30.3			Множественная миелома и злокачественные плазмоклеточные новообразования	C90		
2.1.30.3.1					Нарушение функции системы крови и иммунной системы; МКФ: B 430 - 439	При первичном освидетельствовании - латентная, индолентная, вялотекущая формы на фоне проводимого лечения
2.1.30.3.2					Нарушение функции системы крови и иммунной системы; МКФ: B 430 - 439	При первичном освидетельствовании множественная миелома любой стадии
Повторное освидетельствование						
					Нарушения функций системы крови и иммунной системы, нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций, нарушения функций сердечно-сосудистой, дыхательной, эндокринной систем и метаболизма, пищеварительной системы,	Множественная миелома I, II, III стадии с наличием умеренных нарушений функций организма

					мочевыделительной функции, психических функций; МКФ: B 110 - 139, B 140 - 189, B 430 - 439, B 410 - 429, B 440 - 450, B 540 - 559, B 510 - 539, B 610 - 639, B 710 - 789	
2.1.30.3.3					Нарушения функций системы крови и иммунной системы, нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций, нарушения функций сердечно-сосудистой, дыхательной, эндокринной систем и метаболизма, пищеварительной системы, мочевыделительной функции, психических функций; МКФ: B 110 - 139, B 140 - 189, B 430 - 439, B 710 - 789, B 410 - 429, B 440 - 450, B 540 - 559; B 510 - 539, B 610 - 639	Множественная миелома I, II, III стадии с наличием выраженных нарушений функций организма. Миеломная болезнь любой стадии, резистентная к терапии с умеренными или выраженными нарушениями функций
2.1.30.3.4					Нарушения функций системы крови и иммунной	Множественная миелома I, II или III стадии, резистентная к

					системы, нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций, нарушения функций сердечно-сосудистой, дыхательной, эндокринной систем и метаболизма, пищеварительной системы, мочевыделительной функции, психических функций; МКФ: B 110 - 139, B 140 - 189, B 430 - 439, B 410 - 429, B 440 - 450, B 510 - 539, B 540 - 559; B 610 - 639, B 710 - 789	лечению; наличие значительно выраженных нарушений функций организма. Прогрессирование основного заболевания; наличие осложнений
2.1.30.4			Хронический лимфоидный лейкоз (лимфолейкоз)	C91.1 C91.4 - 9		
2.1.30.4.1					Нарушение функции системы крови и иммунной системы; МКФ: B 430 - 439	При первичном освидетельствовании хронический лимфолейкоз 0-I стадии по Rai (или стадия A по Binet), требующая динамического наблюдения при отсутствии необходимости в терапии

2.1.30.4.2					Нарушения функций системы крови и иммунной системы, нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций, нарушения функций сердечно-сосудистой, дыхательной, эндокринной систем и метаболизма, пищеварительной системы, мочевыделительной функции, психических функций; МКФ: B 110 - 139, B 140 - 189, B 430 - 439, B 410 - 429, B 440 - 450, B 510 - 539, B 540 - 559; B 610 - 639, B 710 - 789	При первичном освидетельствовании хронический лимфолейкоз II стадии по Rai (или стадия A по Binet) - осложнения от проводимой терапии в виде умеренных нарушений функций организма
2.1.30.4.3					Нарушения функций системы крови и иммунной системы, нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций, нарушения функций сердечно-сосудистой, дыхательной, эндокринной систем и метаболизма,	При первичном освидетельствовании хронический лимфолейкоз III и IV стадии по Rai (или стадия B и C по Binet) после проведенной индукционной терапии при достижении ремиссии с возникновением рецидива; резистентная форма заболевания

					пищеварительной системы, мочевыделительной функции, психических функций; МКФ: B 110 - 139, B 140 - 189, B 430 - 439, B 410 - 429, B 440 - 450, B 510 - 539, B 540 - 559; B 610 - 639, B 710 - 789	
2.1.30.4.4					Нарушения функций системы крови и иммунной системы, нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций, нарушения функций сердечно-сосудистой, дыхательной, эндокринной систем и метаболизма, пищеварительной системы, мочевыделительной функции, психических функций; МКФ: B 110 - 139, B 140 - 189, B 430 - 439, B 410 - 429, B 440 - 450, B 510 - 539, B 540 - 559; B 610 - 639, B 710 - 789	При первичном освидетельствовании - осложнения со значительно выраженными нарушениями функций организма (значительно выраженные нарушения костно-мозгового кроветворения); терминальная стадия заболевания
Повторное освидетельствование						

2.1.30.4.5					Нарушение функции системы крови и иммунной системы; МКФ: B 430 - 439	Достижение полной клинико-гематологической ремиссии продолжительностью не менее 1 года. Отсутствие или незначительные нарушения функций организма
2.1.30.4.6					Нарушения функций системы крови и иммунной системы, нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций, нарушения функций сердечно-сосудистой, дыхательной, эндокринной систем и метаболизма, пищеварительной системы, мочевыделительной функции, психических функций; МКФ: B 430 - 439, B 710 - 789, B 410 - 429, B 440 - 450, B 540 - 559, B 510 - 539, B 610 - 639, B 110 - 139, B 140 - 189, B 198, B 199	При достижении полной или частичной ремиссии с умеренными нарушениями функций организма. Хронический лимфолейкоз II или III стадии по Rai (стадия A или B по Binet), медленно прогрессирующего течения; умеренные нарушения функции организма
2.1.30.4.7					Нарушения функций	Отсутствие клинической

					системы крови и иммунной системы, нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций, нарушения функций сердечно-сосудистой, дыхательной, эндокринной систем и метаболизма, пищеварительной системы, мочевыделительной функции, психических функций; МКФ: B 430 - 439, B 710 - 789, B 410 - 429, B 440 - 450, B 540 - 559, B 510 - 539, B 610 - 639, B 110 - 139, B 140 - 189, B 198, B 199	ремиссии с высоким риском возможной трансформации в прогрессирующую и бластную фазу Хронический лимфолейкоз прогрессирующего течения; резистентность к терапии. Осложнения терапии и/или поражение органов-мишеней с выраженными нарушениями функций организма
2.1.30.4.8					Нарушения функций системы крови и иммунной системы, нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций, нарушения функций сердечно-сосудистой, дыхательной, эндокринной систем и метаболизма,	Хронический лимфолейкоз IV стадии, резистентный к терапии. Хронический лимфолейкоз со значительно выраженными нарушениям функций организма. Опухолевая прогрессия, трансформация в другие лимфо/миелопролиферативные заболевания

					пищеварительной системы, мочевыделительной функции, психических функций; МКФ: B 430 - 439, B 710 - 789, B 410 - 429, B 440 - 450, B 540 - 559, B 510 - 539, B 610 - 639, B 110 - 139, B 140 - 189, B 198, B 199	
2.1.30.5			Хронический миелоидный лейкоз (миелолейкоз). Моноцитарный лейкоз Другой лейкоз уточненного клеточного типа Лейкоз неуточненного клеточного типа Другой миелоидный лейкоз	C92.1 C93 C94 C95 C92.7		
2.1.30.5.1						При первичном освидетельствовании хронический миелолейкоз любой стадии на период лечения

Повторное освидетельствование						
2.1.30.5.2					Нарушение функции системы крови и иммунной системы; МКФ: B 430 - 439	Хронический миелолейкоз при достижении полной клинико-гематологической, цитогенетической и молекулярной ремиссии; отсутствие или незначительные нарушения функций организма
2.1.30.5.3					Нарушения функций системы крови и иммунной системы, функций сердечно-сосудистой, дыхательной, пищеварительной систем, мочевыделительной функции; МКФ: B 430 - 439, B 410 - 429, B 440 - 450, B 510 - 539, B 610 - 639	Хронический миелолейкоз при достижении клинико-гематологической ремиссии; умеренные нарушения функций организма
2.1.30.5.4					Нарушения функций системы крови и иммунной системы, функций сердечно-сосудистой, дыхательной, эндокринной систем и метаболизма, пищеварительной системы, мочевыделительной функции;	Хронический миелолейкоз при отсутствии клинико-гематологической ремиссии; выраженные нарушения функций организма

					МКФ: B 410 - 429, B 430 - 439, B 440 - 450, B 510 - 539, B 540 - 559, B 610 - 639	
2.1.30.5.5					Нарушения функций системы крови и иммунной системы, нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций, нарушения функций сердечно-сосудистой, дыхательной, эндокринной систем и метаболизма, пищеварительной системы, мочевыделительной функции, психических функций; МКФ: B 110 - 139, B 140 - 189, B 410 - 429, B 430 - 439, B 440 - 450, B 540 - 559, B 510 - 539, B 610 - 639, B 710 - 789, B 198, B 199	Хронический миелолейкоз в стадии акселерации или властного криза. Хронический миелолейкоз со значительно выраженными нарушениями функций организма
2.1.30.6			Острый миелобластный лейкоз Острый лимфобластный лейкоз Острый	C92.0 C91.0 C92.4		

			промиелоцитарный лейкоз			
			Острый миеломоноцитарный лейкоз	C92.5		
			Острый миелоидный лейкоз с 11q23-аномалией	C92.6		
			Другой миелоидный лейкоз	C92.7		
			Острый миелоидный лейкоз с многолинейной дисплазией	C92.8		
			Миелоидный лейкоз неуточненный	C92.9		
2.1.30.6.1					Нарушения функций системы крови и иммунной системы, нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций, нарушения функций сердечно-сосудистой, дыхательной, эндокринной систем и метаболизма, пищеварительной системы,	Острый лейкоз в развернутой стадии. Терминальная стадия острого лейкоза с полиорганной недостаточностью, резистентной к терапии, значительно выраженными нарушениями функций организма

					мочевыделительной функции, психических функций; МКФ: B 430 - 439, B 710 - 789, B 410 - 429, B 440 - 450, B 540 - 559, B 510 - 539, B 610 - 639, B 110 - 139, B 140 - 189, B 198, B 199	
2.1.30.6.2					Нарушения функций системы крови и иммунной системы, функций сердечно-сосудистой, дыхательной, эндокринной систем и метаболизма, пищеварительной системы, мочевыделительной функции, психических функций; МКФ: B 430 - 439, B 410 - 429, B 440 - 450, B 540 - 559, B 510 - 539, B 610 - 639, B 110 - 139, B 140 - 189, B 198, B 199	Острый лейкоз после проведенной индукционной терапии при достижении полной клинико-гематологической ремиссии при наличии осложнений лечения и/или выраженных нарушениях функций организма
2.1.30.6.3					Нарушения функций системы крови и иммунной системы; функций сердечно-сосудистой, дыхательной, эндокринной систем и метаболизма,	Острый лейкоз при достижении полной клинико-гематологической ремиссии с наличием осложнений терапии и/или умеренными нарушениями

					пищеварительной системы, мочевыделительной функции; МКФ: B 430 - 439, B 410 - 429, B 440 - 450, B 540 - 559, B 510 - 539, B 610 - 639	функций организма
2.1.30.7			Миелодиспластические синдромы (МДС)	D46		
2.1.30.7.1					Нарушение функции системы крови и иммунной системы; МКФ: B 430 - 439	Латентная, вялотекущая, индолентная формы МДС без признаков прогрессирования с незначительными нарушениями функций организма
2.1.30.7.2					Нарушения функций системы крови и иммунной системы, функций сердечно-сосудистой, дыхательной, пищеварительной систем, мочевыделительной функции; МКФ: B 430 - 439, B 410 - 429, B 440 - 450, B 510 - 539, B 610 - 639	МДС с умеренными нарушениями функции крови и иммунной системы на фоне терапии
2.1.30.7.3					Нарушения функций системы крови и иммунной системы, функций сердечно-сосудистой,	МДС с выраженными нарушениями функции крови и иммунной системы на фоне терапии

					дыхательной, эндокринной систем и метаболизма, пищеварительной системы, мочевыделительной функции; МКФ: B 430 - 439, B 410 - 429, B 440 - 450, B 540 - 559, B 510 - 539, B 610 - 639	
2.1.30.7.4					Нарушения функций системы крови и иммунной системы, нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций, нарушения функций сердечно-сосудистой, дыхательной, эндокринной систем и метаболизма, пищеварительной системы, мочевыделительной функции, психических функций; МКФ: B 430 - 439, B 710 - 789, B 410 - 429, B 440 - 450, B 540 - 559, B 510 - 539, B 610 - 639, B 110 - 139, B 140 - 189, B 198, B 199	МДС высокого риска; терминальная стадия заболевания, со значительно выраженными нарушениями функции крови и иммунной системы, трансформация в острый лейкоз
2.2			Доброкачественные	D00 - D48		

			новообразования Доброкачественные новообразования мозговых оболочек Доброкачественные новообразования головного мозга и других отделов ЦНС Опухоль гипофиза	 D32 D33 D35.2		
2.2.1					Нарушения психических, языковых и речевых, сенсорных функций, нарушения нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций, функций сердечно-сосудистой, дыхательной, пищеварительной, эндокринной систем и метаболизма, системы крови и иммунной системы, мочевыделительной функции, функции кожи и связанных с ней систем; МКФ: B 110 - 139, B 140 - 189, B 198, B 199, B 310 - 340, B 398, B 399, B 210 -	Доброкачественные опухоли различной локализации при: небольших размерах или отсутствии роста (медленном росте), опухоли без влияния на функцию смежных структур и/или органов; гормонально неактивные опухоли; опухоли после проведенного радикального оперативного лечения при отсутствии признаков рецидива или продолженного роста опухоли

					299, B 710 - 789, B 798, B 799, B 410 - 429, B 440 - 449, B 510 - 539, B 540 - 559, B 430 - 439, B 610 - 639, B 810 - 849	
2.2.2					Нарушения психических, языковых и речевых, сенсорных функций, нарушения нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций, функций сердечно-сосудистой, дыхательной, пищеварительной, эндокринной систем и метаболизма, системы крови и иммунной системы, мочевыделительной функции; функции кожи и связанных с ней систем; МКФ: B 110 - 139, B 140 - 189, B 198, B 199, B 310 - 340, B 398, B 399, B 210 - 299, B 710 - 789, B 798, B 799, B 410 - 429, B 440 - 449, B 510 - 539, B 540 - 559, B 430 - 439, B 610 - 639, B 810 - 849	Доброкачественные опухоли различной локализации при: больших размерах опухоли с воздействием на положение и функцию смежных структур, гормонально активные опухоли, приводящие к умеренным нарушениям функций организма; после проведенного оперативного лечения (радикального или нерадикального) при наличии умеренных нарушений функций организма

2.2.3					Нарушения психических, языковых и речевых, сенсорных функций, нарушения нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций, функций сердечно-сосудистой, дыхательной, пищеварительной, эндокринной систем и метаболизма, системы крови и иммунной системы, мочевыделительной функции; функции кожи и связанных с ней систем; МКФ: B 110 - 139, B 140 - 189, B 198, B 199, B 310 - 340, B 398, B 399, B 210 - 299, B 710 - 789, B 798, B 799, B 410 - 429, B 440 - 449, B 510 - 539, B 540 - 559, B 430 - 439, B 610 - 639, B 810 - 849	Доброкачественные опухоли различной локализации (преимущественно головного и спинного мозга) при: быстром росте опухоли с выраженным воздействием на положение и функцию смежных органов и невозможности радикального ее удаления; гормонально активные опухоли, приводящие к выраженным нарушениям функций организма; после проведенного оперативного лечения (радикального или нерадикального) при наличии продолженного роста опухоли; при наличии выраженных нарушений функций организма
2.2.4					Нарушения психических, языковых и речевых, сенсорных функций, нарушения нейромышечных, скелетных и связанных с движением	Доброкачественные опухоли головного и спинного мозга при невозможности радикального хирургического лечения или после проведенного хирургического

					(статодинамических) функций, функций сердечно-сосудистой, дыхательной, пищеварительной, эндокринной систем и метаболизма, системы крови и иммунной системы, мочевыделительной функции; функции кожи и связанных с ней систем; МКФ: B 110 - 139, B 140 - 189, B 198, B 199, B 310 - 340, B 398, B 399, B 210 - 299, B 710 - 789, B 798, B 799, B 410 - 429, B 440 - 449, B 510 - 539, B 540 - 559, B 430 - 439, B 610 - 639, B 810 - 849	лечения со значительно выраженными нарушениями функций организма
2.2.5		Доброкачественное новообразование надпочечника	Доброкачественная феохромоцитома/Альдостерома	D35.0		
2.2.5.1					Нарушения функций сердечно-сосудистой, эндокринной систем и метаболизма, нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций;	Доброкачественная феохромоцитома/альдостерома после радикального лечения без первичной надпочечниковой недостаточности

					МКФ: B 410 - 429, B 450 - 4469, B 510 - 559, B 730 - 749	
2.2.5.2					Нарушение функции сердечно-сосудистой, эндокринной систем и метаболизма; нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций, мочевыделительных и двигательных функций, МКФ: B 410 - 429, B 450 - 469, B 510 - 559, B 730 - 749, B 750 - 789, B 610 - 639	Доброкачественная феохромоцитома/альдостерома после радикального лечения с развитием первичной надпочечниковой недостаточности
3	Болезни крови, кроветворных органов и отдельные нарушения, вовлекающие иммунный механизм (класс III), патология других органов и систем организма, вовлекающая иммунный					

	механизм, и представленная в других классах болезней					
Примечание к пункту 3. Количественная оценка степени выраженности стойких нарушений функций крови, кроветворных органов и иммунной системы организ обусловленных заболеваниями, последствиями травм или дефектами, зависит от вида и тяжести течения заболевания (по данным клинико-л обследования); частоты и тяжести кризов; наличия и вида кровоизлияний во внутренние органы, а также в полости крупных суставов (некри жизнеугрожающие), от поражения органов-мишеней, вида, объема и эффективности проводимого лечения (в том числе от регулярного применения гемопоэза, переливания компонентов крови или трансплантации костного мозга), резистентности к проводимой терапии, наличия осложнений (в проводимой терапии), от степени нарушения функции других органов и систем организма; прогноза заболевания.						
3.1		Другие болезни крови и кроветворных органов		D70 - D77		
3.1.1			Гипоспленизм. Врожденные аномалии селезенки - аспления	D73.0 Q89.0		
3.1.1.1					Нарушение функций системы крови и иммунной системы; МКФ: B 430 - 439	Незначительные нарушения функций организма при отсутствии селезенки
3.1.2			Агранулоцитоз (наследственная нейтропения)	D70		

			Иммунодефициты с преимущественной недостаточностью антител Комбинированные иммунодефициты Иммунодефициты, связанные с другими значительными дефектами Обычный вариабельный иммунодефицит Другие иммунодефициты Дефект в системе комплемента	D80 D81 D82 D83 D84 D84.1		
3.1.2.1					Нарушение функции системы крови и иммунной системы; МКФ: B 430 - 439	При отсутствии осложнений после проведенного эффективного лечения и достижения стойкой длительной (6 и более месяцев) ремиссии
3.1.2.2					Нарушения функций системы крови и иммунной системы, функций сердечно-сосудистой, дыхательной,	Рецидивирующее течение заболевания, наличие инфекционных осложнений с умеренными нарушениями функций организма на фоне

					пищеварительной системы, мочевыделительной функции; МКФ: B 430 - 439, B 410 - 429, B 440 - 449, B 510 - 539, B 610 - 639	базисной терапии
3.1.2.3					Нарушения функций системы крови и иммунной системы, функций сердечно-сосудистой, дыхательной, пищеварительной систем, мочевыделительной функции; МКФ: B 430 - 439, B 410 - 429, B 440 - 450, B 510 - 539, B 610 - 639	Непрерывно рецидивирующее течение заболевания, наличие инфекционных осложнений с выраженными нарушениями функций организма на фоне базисной терапии
3.2		Гемолитические анемии Серповидно-клеточные нарушения Апластические и другие анемии		D55 - D59 D57 D60 - D64		
3.2.1					Нарушение функции системы крови и иммунной системы; сердечно-сосудистой, дыхательной системы;	Легкая форма анемии при отсутствии нарушений (клинико-гематологическая ремиссия) либо с незначительными

					МКФ: B 430 - 439, B 410 - 429, B 440 - 450	нарушениями функций организма на фоне базисной терапии
3.2.2					Нарушение функции системы крови и иммунной системы; сердечно-сосудистой, дыхательной системы; МКФ: B 430 - 439, B 410 - 429, B 440 - 450	Средне-тяжелая форма анемии с умеренными нарушениями функций организма на фоне базисной терапии
3.2.3					Нарушение функции системы крови и иммунной системы; сердечно-сосудистой, дыхательной системы; МКФ: B 430 - 439, B 410 - 429, B 440 - 450	Тяжелая или сверхтяжелая форма анемии с выраженными нарушениями функций организма на фоне базисной терапии
3.2.4					Нарушение функции системы крови и иммунной системы; сердечно-сосудистой, дыхательной системы; МКФ: B 430 - 439, B 410 - 429, B 440 - 450	Анемии, резистентные к терапии. Тяжелая или сверхтяжелая форма анемии со значительно выраженными нарушениями функций организма на фоне базисной терапии
3.3			Наличие другого трансплантированного органа или ткани (костного мозга)	Z94.8		

Первичное освидетельствование						
3.3.1					Нарушения функций системы крови и иммунной системы, сердечно-сосудистой, дыхательной, пищеварительной систем; мочевыделительной функции, психических функций; МКФ: B 430 - 439, B 410 - 429, B 440 - 450, B 540 - 559, B 510 - 539, B 610 - 639, B 110 - 139, B 140 - 189, B 198, B 199	После аллогенной трансплантации костного мозга на срок 2 года
Повторное освидетельствование (через 2 года после трансплантации костного мозга)						
3.3.2					Нарушения функции системы крови и иммунной системы; сердечно-сосудистой, дыхательной, эндокринной системы и метаболизма, пищеварительной системы, мочевыделительной функции, психических функций; МКФ: B 430 - 439, B 410 - 429, B 440 - 449, B 540 - 559, B 510 - 539, B 610 -	При наличии осложнений с умеренными нарушениями функций организма

					639, B 110 - 139, B 140 - 189, B 198, B 199	
3.3.3					Нарушения функций системы крови и иммунной системы, сердечно-сосудистой, дыхательной, эндокринной систем и метаболизма, пищеварительной системы, мочевыделительной функции, психических функций; МКФ: B 430 - 439, B 410 - 429, B 440 - 449, B 540 - 559, B 510 - 539, B 610 - 639, B 110 - 139, B 140 - 189, B 198, B 199	При наличии осложнений с выраженными нарушениями функций организма
3.3.4					Нарушения функций системы крови и иммунной системы, сердечно-сосудистой, дыхательной, эндокринной систем и метаболизма, пищеварительной системы; мочевыделительной функции, психических функций; МКФ: B 430 - 439, B 410 - 429, B 440 - 449, B 540 - 559, B 510 - 539, B 610 -	При наличии осложнений со значительно выраженными нарушениями функций организма

					639, B 110 - 139, B 140 - 189, B 198, B 199	
3.4		Нарушения свертываемости крови, пурпура и другие геморрагические состояния		D65 - D69		
3.4.1			Наследственный дефицит фактора VIII (гемофилия A) Наследственный дефицит фактора IX (гемофилия B) Болезнь Виллебранда Наследственный дефицит фактора XI (гемофилия C) Наследственный дефицит фактора I (фибриногена); наследственный дефицит фактора II (гипопротромбинемия); наследственный дефицит фактора V (лабильного); наследственный дефицит фактора VII	D66 D67 D68.0 D68.1 D68.2		

			(стабильного); наследственный дефицит фактора X (Стюарта-Прауэра); наследственный дефицит фактора XII (Хагемана); наследственный дефицит фактора XIII (фибринстабилизирующего; дисфибриногенемия (врожденная), гипопроконвертинемия; Болезнь Оврена Геморрагические нарушения, обусловленные циркулирующими в крови антикоагулянтами Ингибиторы к факторам свертывания крови Приобретенный дефицит фактора свертывания Различные комбинации врожденного дефицита II, VII, IX и X факторов свертывания	D68.3 D68.4		
3.4.1.1					Нарушение функции системы крови и иммунной	Легкая форма заболевания при отсутствии кровотечений

					системы; МКФ: B 430 - 439	либо с редкими (не более 1 раза в год) кровотечениями, требующими обращения в медицинскую организацию; не требующих заместительной терапии и/или не приводящими к развитию анемии; отсутствие кровоизлияний в суставы и/или мышцы/внутренние органы; нерегулярное использование концентратов факторов свертывания крови и/или препаратов крови с профилактической целью (при оперативных вмешательствах или травмах); для гемофилии A и B - активность факторов свертывания VIII/IX более 5% (учитывается минимальная степень активности факторов свертывания VIII/IX, когда-либо определенная у данного пациента)
3.4.1.2					Нарушения функций системы крови и иммунной системы, нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических)	Легкая и среднетяжелая форма заболевания с редкими (не более 3 раз в год) кровотечениями, требующих заместительной терапии и/или с развитием анемии;

					функций, нарушения функций сердечно-сосудистой, дыхательной, эндокринной систем и метаболизма, пищеварительной системы, мочевыделительной функции, психических функций; МКФ: B 430 - 439, B 710 - 789, B 410 - 429, B 440 - 449, B 540 - 559, B 510 - 539, B 610 - 639, B 110 - 139, B 140 - 189	кровоизлияния в суставы и/или мышцы/внутренние органы не более 1 раза в год; для гемофилии A и B - активность факторов свертывания VIII/IX от 2 до 5% (учитывается минимальная степень активности факторов свертывания VIII/IX, когда-либо определенная у данного пациента)
3.4.1.3					Нарушения функций системы крови и иммунной системы, нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций, нарушения функций сердечно-сосудистой, дыхательной, эндокринной систем и метаболизма, пищеварительной системы, мочевыделительной функции, психических функций; МКФ: B 430 - 439, B 710 - 789, B 410 - 429, B 440 -	Среднетяжелая и тяжелая форма заболеваний с повторными (более 3 раз в год) кровотечениями, требующими заместительной терапии и/или госпитализации; кровоизлияния в суставы и/или мышцы/внутренние органы не более 2 - 3 раз в год; наличие хронического синовиита и/или артропатии одного крупного сустава; для гемофилии A и B - активность факторов свертывания VIII/IX 1 - 2% (учитывается

					449, B 540 - 559, B 510 - 539, B 610 - 639, B 110 - 139, B 140 - 189	минимальная степень активности факторов свертывания VIII/IX, когда-либо определенная у данного пациента); регулярное использование концентратов факторов свертывания крови и/или препаратов крови с профилактической и гемостатической целью
3.4.1.4					Нарушения функций системы крови и иммунной системы, нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций, нарушения функций сердечно-сосудистой, дыхательной, эндокринной систем и метаболизма, пищеварительной системы, мочевыделительной функции, психических функций; МКФ: B 430 - 439, B 710 - 789, B 410 - 429, B 440 - 449, B 540 - 559, B 510 - 539, B 610 - 639, B 110 - 139, B 140 - 189	Тяжелые формы заболеваний с частыми повторными (6 и более раз в год) кровотечениями, со склонностью к частым (более 3 раз в год) тяжелым кровотечениям (в том числе спонтанным); кровоизлияния в суставы и/или мышцы более 3 раз в год и/или кровоизлияния во внутренние органы более 2 раз в год, и/или любой эпизод внутричерепного кровоизлияния и/или повторные эпизоды почечных кровотечений; признаки хронического синовиита и/или артропатии более чем одного крупного

						сустава; для гемофилии A и B - активность факторов свертывания VIII/IX менее 1% (учитывается минимальная степень активности факторов свертывания VIII/IX, когда-либо определенная у данного пациента); наличие ингибиторной гемофилии с титром ингибитора > 0,6 БЕ
3.4.2.			Болезнь Виллебранда Качественные дефекты тромбоцитов Тромбастения, болезнь Гланцманна, болезнь Бернара-Сулье, синдром Скотта, дефицит/дефект мобилизации пулов хранения тромбоцитов, дефект сигнальных путей тромбоцитов, другие формы Другие первичные тромбоцитопении, MYH9-ассоциированная тромбоцитопения,	D68.0 D69.1 D69.4		

			семейная тромбоцитопения с предрасположенностью к миелодисплазии, синдром "серых" тромбоцитов, средиземноморская макротромбоцитопения и другие			
3.4.2.1					Нарушение функции системы крови и иммунной системы; МКФ: B 430 - 439	Легкая форма заболевания (отсутствие кровотечений или редкие (не более 3 раз в год) кровотечения, не требующие медикаментозной и гемостатической терапии и/или не приводящие к анемизации; использование концентратов факторов свертывания крови и/или препаратов крови не требуется
3.4.2.2					Нарушения функций системы крови и иммунной системы, нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций, нарушения функций сердечно-сосудистой,	Среднетяжелая форма заболевания с частотой кровотечений (3 - 10 раз в год), либо до 3-х кровотечений, требующих гемостатической терапии и/или госпитализации; хроническая постгеморрагическая анемия

					дыхательной, эндокринной систем и метаболизма, пищеварительной системы, мочевыделительной функции, психических функций; МКФ: B 430 - 439, B 710 - 789, B 410 - 429, B 440 - 449, B 540 - 559, B 510 - 539, B 610 - 639; B 110 - 139, B 140 - 189, B 198, B 199	средней степени, не требующая заместительной терапии препаратами крови; использование концентратов факторов свертывания крови и/или препаратов крови при оперативных вмешательствах/травмах с целью профилактики (купирования) геморрагических эпизодов
3.4.2.3					Нарушения функций системы крови и иммунной системы, нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций, нарушения функций сердечно-сосудистой, дыхательной, эндокринной систем и метаболизма, пищеварительной системы, мочевыделительной функции, психических функций; МКФ: B 430 - 439, B 710 - 789, B 410 - 429, B 440 - 449, B 540 - 559, B 510 - 539, B 610 - 639, B 110 -	Тяжелая форма заболевания с частыми (более 10 раз в год) либо 1 - 3 обильных кровотечений, приводящих к развитию острой постгеморрагической анемии; кровотечения из слизистой оболочки полости рта, макрогематурия, кровоизлияния в суставы/мышцы до 3 раз в год, во внутренние органы 2 раза в год и/или кровотечение из ЖКТ не приведшее к развитию острой или хронической постгеморрагической анемии. Использование концентратов факторов свертывания крови

					139, B 140 - 189, B 198, B 199	и/или препаратов крови с профилактической или гемостатической целью при оперативных вмешательствах/травмах и/или по другим показаниям
3.4.2.4					Нарушения функций системы крови и иммунной системы, нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций, нарушения функций сердечно-сосудистой, дыхательной, эндокринной систем и метаболизма, пищеварительной системы, мочевыделительной функции, психических функций; МКФ: B 430 - 439, B 710 - 789, B 410 - 429, B 440 - 449, B 540 - 559, B 510 - 539, B 610 - 639, B 110 - 139, B 140 - 189, B 198, B 199	Тяжелая форма заболевания с частыми (более 3 раз в год) тяжелыми кровотечениями, приводящими к развитию острой постгеморрагической анемии, либо иными жизнеугрожающими кровотечениями
3.4.3.			Первичная тромбофилия дефицит Антитромбина носительство FV Leiden	D68.5		

			(аномалия фактора V-мутация Лейдена); носительство FII G20210A; недостаточность антитромбина, протеинов C и S; мутация гена протромбина Другая тромбофилия; синдром антикардиолипина, антифосфолипидный синдром, наличие волчаночного антикоагулянта	D68.6		
3.4.3.1					Нарушения функций системы крови и иммунной системы, нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций, нарушения функций сердечно-сосудистой, дыхательной, эндокринной систем и метаболизма, пищеварительной системы, мочевыделительной функции, психических	Легкая форма заболевания при отсутствии тромбоза в анамнезе, требующая первичной фармакологической антитромботической профилактики только в ситуациях присоединившегося высокого тромботического риска (тяжелый инфекционный процесс, крупные хирургические вмешательства и прочее)

					функций; МКФ: B 430 - 439, B 710 - 789, B 410 - 429, B 440 - 449, B 540 - 559, B 510 - 539, B 610 - 639, B 110 - 139, B 140 - 189, B 198, B 199	
3.4.3.2					Нарушения функций системы крови и иммунной системы, нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций, нарушения функций сердечно-сосудистой, дыхательной, эндокринной систем и метаболизма, пищеварительной системы, мочевыделительной функции, психических функций; МКФ: B 430 - 439, B 710 - 789, B 410 - 429, B 440 - 449, B 540 - 559, B 510 - 539, B 610 - 639, B 110 - 139, B 140 - 189, B 198, B 199	Среднетяжелая форма заболевания с однократным случаем спровоцированного тромбоза (не идиопатический тромбоз), не приводящая к развитию ПТФБ, требующая курса вторичной фармакологической профилактики
3.4.3.3					Нарушения функций системы крови и иммунной	Тяжелая форма заболевания с повторными не более 2-х

					системы, нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций, нарушения функций сердечно-сосудистой, дыхательной, эндокринной систем и метаболизма, пищеварительной системы, мочевыделительной функции, психических функций; МКФ: B 430 - 439, B 710 - 789, B 410 - 429, B 440 - 449, B 540 - 559, B 510 - 539, B 610 - 639, B 110 - 139, B 140 - 189, B 198, B 199	спровоцированных или 1 не спровоцированного тромбоза (идиопатический вариант). И/или требующей вторичной профилактики Или тромбоз любой локализации, приведший к ПТФБ. Дефицит протеина C/S/антитромбина менее 50%, но более 12%
3.4.3.4					Нарушения функций системы крови и иммунной системы, нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций, нарушения функций сердечно-сосудистой, дыхательной, эндокринной систем и метаболизма, пищеварительной системы,	Тяжелая и крайне тяжелая форма заболевания с более чем 2 случаями спровоцированного тромбоза (не идиопатический тромбоз) и/или более чем 1 случаем идиопатического тромбоза, и/или 2 и более случаями тромбоза сосудов ЦНС, внутренних органов, тромбоэмболии легочной артерии вне зависимости от

					мочевыделительной функции, психических функций; МКФ: B 430 - 439, B 710 - 789, B 410 - 429, B 440 - 449, B 540 - 559, B 510 - 539, B 610 - 639, B 110 - 139, B 140 - 189, B 198, B 199	наличия/отсутствия видимой причины для тромбоза; значительно выраженные нарушения функций организма. Дефицит протеина C/S антитромбина менее 12%
3.4.3.5					Нарушения функций системы крови и иммунной системы, нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций, нарушения функций сердечно-сосудистой, дыхательной, эндокринной систем и метаболизма, пищеварительной системы, мочевыделительной функции, психических функций; МКФ: B 430 - 439, B 710 - 789, B 410 - 429, B 440 - 449, B 540 - 559, B 510 - 539, B 610 - 639, B 110 - 139, B 140 - 189, B 198, B 199	Легкая форма заболевания при отсутствии тромбоза в анамнезе, требующая первичной фармакологической антитромботической профилактики только в ситуациях присоединившегося высокого тромботического риска (тяжелый инфекционный процесс, крупные хирургические вмешательства и прочее)

3.4.3.6					Нарушения функций системы крови и иммунной системы, нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций, нарушения функций сердечно-сосудистой, дыхательной, эндокринной систем и метаболизма, пищеварительной системы, мочевыделительной функции, психических функций; МКФ: B 430 - 439, B 710 - 789, B 410 - 429, B 440 - 449, B 540 - 559, B 510 - 539, B 610 - 639, B 110 - 139, B 140 - 189, B 198, B 199	Среднетяжелая форма заболевания с однократным случаем спровоцированного тромбоза (не идиопатический тромбоз), не приводящая к развитию ПТФБ, требующая курса вторичной фармакологической профилактики
3.4.4			Первичная тромбофилия дефицит Антитромбина носительство FV Leiden (аномалия фактора V-мутация Лейдена); носительство FII G20210A; недостаточность антитромбина, протеинов C и S; мутация гена	D68.5		

			протромбина Другая тромбофилия; синдром антикардиолипина, антифосфолипидный синдром, наличие волчаночного антикоагулянта	D68.6		
3.4.4.1					Нарушения функций системы крови и иммунной системы, нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций, нарушения функций сердечно-сосудистой, дыхательной, эндокринной систем и метаболизма, пищеварительной системы, мочевыделительной функции, психических функций; МКФ: B 430 - 439, B 710 - 789, B 410 - 429, B 440 - 449, B 540 - 559, B 510 - 539, B 610 - 639, B 110 - 139, B 140 - 189, B 198, B 199	Легкая форма заболевания при отсутствии тромбоза в анамнезе, требующая первичной фармакологической антитромботической профилактики только в ситуациях присоединившегося высокого тромботического риска (тяжелый инфекционный процесс, крупные хирургические вмешательства и прочее)

3.4.4.2					Нарушения функций системы крови и иммунной системы, нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций, нарушения функций сердечно-сосудистой, дыхательной, эндокринной систем и метаболизма, пищеварительной системы, мочевыделительной функции, психических функций; МКФ: B 430 - 439, B 710 - 789, B 410 - 429, B 440 - 449, B 540 - 559, B 510 - 539, B 610 - 639, B 110 - 139, B 140 - 189, B 198, B 199	Среднетяжелая форма заболевания с однократным случаем спровоцированного тромбоза (не идиопатический тромбоз), не приводящая к развитию ПТФБ, требующая курса вторичной фармакологической профилактики
3.4.4.3					Нарушения функций системы крови и иммунной системы, нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций, нарушения функций сердечно-сосудистой, дыхательной, эндокринной	Тяжелая форма заболевания с повторными случаем спровоцированного тромбоза (не более двух спровоцированных случаев или однократным случаем не спровоцированного тромбоза (идиопатический вариант) и/или требующий вторичной профилактики тромбоз, или

					систем и метаболизма, пищеварительной системы, мочевыделительной функции, психических функций; МКФ: B 430 - 439, B 710 - 789, B 410 - 429, B 440 - 449, B 540 - 559, B 510 - 539, B 610 - 639, B 110 - 139, B 140 - 189, B 198, B 199	тромбоз любой локализации, приведший к ПТФБ. Дефицит протеина C/S/антитромбина менее 50%, но более 12%
3.4.4.4					Нарушения функций системы крови и иммунной системы, нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций, нарушения функций сердечно-сосудистой, дыхательной, эндокринной систем и метаболизма, пищеварительной системы, мочевыделительной функции, психических функций; МКФ: B 430 - 439, B 710 - 789, B 410 - 429, B 440 - 449, B 540 - 559, B 510 - 539, B 610 - 639, B 110 - 139, B 140 - 189, B 198, B	Тяжелая и крайне тяжелая форма заболевания с более чем 2 случаями спровоцированного тромбоза (не идиопатический тромбоз) и/или более чем однократным случаем идиопатического тромбоза, и/или двумя и более случаями тромбоза сосудов ЦНС, внутренних органов, тромбоэмболии легочной артерии вне зависимости от наличия/отсутствия видимой причины для тромбоза; значительно выраженные нарушения функций организма. Дефицит протеина C/S антитромбина менее 12%

					199	
4	Болезни эндокринной системы, расстройства питания и нарушения обмена веществ (класс IV) и патология органов эндокринной системы, представленная в других классах болезней			E00 - E90		
Примечание к пункту 4. Количественная оценка степени выраженности стойких нарушений функций организма граждан в возрасте 18 лет и старше при болезнях эндокрин расстройствах питания и нарушениях обмена веществ зависит от характера и степени выраженности клинической симптоматики заболевания клинических и инструментальных методов исследования, а также возможности компенсации нарушенных функций с применением современных ме и реабилитации.						
4.1		Болезни щитовидной железы Эндокринные и метаболические нарушения, возникшие после		E00 - E07 E89		

		медицинских процедур, не классифицированные в других рубриках				
Примечание к подпункту 4.1. Количественная оценка степени выраженности стойких нарушений функций организма граждан в возрасте 18 лет и старше, обусловленны щитовидной железы, производится с учетом того, что данная патология хорошо поддается лечению современными лекарственными препаратами и не приводит к стойкому нарушению функций организма. К умеренным нарушениям функций организма могут приводить осложнения заболеваний железы, оценка выраженности которых проводится только после достижения компенсации основного заболевания.						
4.1.1			Врожденный гипотиреоз с диффузным зобом Врожденный гипотиреоз без зоба	E03.0 E03.1		
4.1.1.1					Нарушения психических функций, нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций, функций эндокринной системы и метаболизма, сердечно-сосудистой системы; МКФ: B 110 - 139, B 140 - 189; B 710 - 789, B 798, B 799; B 540 - 559, B 410 - 429	незначительные нарушения функций организма на фоне адекватной заместительной терапии
4.1.1.2					Нарушения психических	Умеренные нарушения

					функций, нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций, функций эндокринной системы и метаболизма, сердечно-сосудистой системы; МКФ: B 110 - 139, B 140 - 189; B 710 - 789, B 798, B 799; B 540 - 559, B 410 - 429	функций организма на фоне адекватной заместительной терапии
4.1.1.3					Нарушения психических функций, нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций, функций эндокринной системы и метаболизма, сердечно-сосудистой системы; МКФ: B 110 - 139, B 140 - 189; B 710 - 789, B 798, B 799; B 540 - 559, B 410 - 429	Выраженные нарушения функций организма на фоне адекватной заместительной терапии
4.1.2			Тиреотоксикоз (гипертиреоз)	E05		
4.1.2.1					Нарушения психических функций, сенсорных	Осложнения, приводящие к незначительным нарушениям

					функций (зрения), функций сердечно-сосудистой, эндокринной систем и метаболизма; МКФ: B 110 - 139, B 140 - 189; B 198, B 199; B 210 - 229; B 410 - 429, B 540 - 559	функций организма
4.1.2.2					Нарушения психических функций, сенсорных функций (зрения), функций сердечно-сосудистой, эндокринной систем и метаболизма; МКФ: B 110 - 139, B 140 - 189; B 198, B 199; B 210 - 229; B 410 - 429, B 540 - 559	Осложнения, приводящие к умеренным нарушениям функций организм
4.1.2.3					Нарушения психических функций, сенсорных функций (зрения), функций сердечно-сосудистой, эндокринной систем и метаболизма; МКФ: B 110 - 139, B 140 - 189; B 198, B 199; B 210 - 229; B 410 - 429, B 540 - 559	Осложнения, приводящие к выраженным нарушениям психических, сенсорных функций, функций сердечно-сосудистой системы
4.2		Сахарный диабет		E10 - E14		
4.2.1			Инсулинзависимый сахарный диабет.	E10		

			Инсулиннезависимый сахарный диабет. Сахарный диабет, связанный с недостаточностью питания. Другие уточненные формы сахарного диабета. Сахарный диабет неуточненный	E11 E12 E13 E14		
Примечание к подпункту 4.2.1. Количественная оценка степени выраженности стойких нарушений функций организма граждан в возрасте 18 лет и старше, обусловленных сахарн основывается на оценке степени выраженности нарушенных функций при верифицированных осложнениях со стороны органов-мишене диабетическая нефропатия, ретинопатия, катаракта, неврологические осложнения (диабетическая невропатия), нарушения периферического кро (диабетическая ангиопатия, трофическая язва, гангрена), диабетическая остеоартропатия (стопа или сустав Шарко) и прочее.						
4.2.1.1					Нарушения сенсорных функций (зрения), нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций, функций эндокринной системы и метаболизма; сердечно-сосудистой системы, мочевыделительной функции;	Сахарный диабет без поражения органов-мишеней (отсутствие осложнений) или при наличии осложнений с незначительным нарушением функций организма: диабетическая нефропатия - ХБП 1, 2 и 3а стадии; диабетическая ретинопатия с остротой зрения лучше видящего или единственного глаза коррекцией > 0,3,

					МКФ: B 210 - 229; B 710 - 789, B 798, B 799; B 540 - 559, B 410 - 429; B 610 - 639	сужено до 40°; незначительная или умеренная дистальная сенсорная и сенсомоторная полиневропатия; диабетическая ангиопатия с незначительными нарушениями функций организма
4.2.1.2					Нарушения психических функций, сенсорных функций (зрения); нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций, функций эндокринной системы и метаболизма, сердечно-сосудистой системы, мочевыделительной функции; МКФ: B 110 - 139, B 140 - 189; B 210 - 229; B 710 - 789, B 798, B 799; B 540 - 559, B 410 - 429; B 610 - 639	Осложнения сахарного диабета с умеренными нарушениями функций органов-мишеней: диабетическая нефропатия - ХБП 3Б стадии. диабетическая ретинопатия с остротой зрения лучше видящего или единственного глаза с коррекцией > 0,1 до 0,3; поле зрения - в пределах 20 - 40°; выраженная сенсомоторная невропатия с наличием пареза стоп и/или с нарушением равновесия, и/или с формированием высокого риска развития рецидива язвы стопы; диабетическая ангиопатия с умеренными нарушениями функций организма

4.2.1.3					Нарушения психических функций, сенсорных функций (зрения); нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций, функций эндокринной системы и метаболизма, сердечно-сосудистой системы, мочевыделительной функции; МКФ: B 110 - 139, B 140 - 189; B 210 - 229; B 710 - 789, B 798, B 799; B 540 - 559, B 410 - 429, B 610 - 639	Осложнения сахарного диабета с выраженными нарушениями функций органов-мишеней: диабетическая нефропатия - ХБП 4 стадии (подготовка к диализу) и ХБП 5 стадии при эффективности диализа и отсутствии его осложнений; диабетическая ретинопатия с остротой зрения лучше видящего или единственного глаза с коррекцией 0,1 - 0,05; поле зрения - от 10 до 20° диабетическая ангиопатия с выраженными нарушениями функций организма
4.2.1.4					Нарушения психических функций, сенсорных функций (зрения); нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций, функций эндокринной системы и метаболизма, сердечно-сосудистой системы, мочевыделительной функции; МКФ: B 110 - 139, B 140 -	Осложнения сахарного диабета со значительно выраженными нарушениями функций органов-мишеней, такие как: диабетическая нефропатия - ХБП 5 стадии, осложнения заместительной почечной терапии; Диабетическая пролиферативная ретинопатия с остротой зрения лучше видящего глаза коррекцией 0,04 и ниже вплоть до

					189; B 210 - 229; B 710 - 789, B 798, B 799; B 540 - 559, B 410 - 429, B 610 - 639	слепоты; поле зрения < 10°, диабетическая ангиопатия со значительно выраженными нарушениями функций организма
4.2.2			Сахарный диабет с нарушениями периферического кровообращения (диабетическая ангиопатия, трофическая язва)	E10.5		
4.2.2.1					Нарушения функций эндокринной системы и метаболизма, функции сердечно-сосудистой системы; МКФ: B 540 - 559, B 410 - 429	Диабетическая ангиопатия обеих нижних конечностей с ХАН 0 или I стадии
4.2.2.2					Нарушения функций эндокринной системы и метаболизма, функции сердечно-сосудистой системы; МКФ: B 540 - 559, B 410 - 429	Диабетическая ангиопатия обеих нижних конечностей с ХАН II стадии
4.2.2.3					Нарушения функций эндокринной системы и метаболизма, функции	ХАН III стадии с язвенным дефектом после заживления или ампутации на уровне

					сердечно-сосудистой системы; МКФ: B 540 - 559, B 410 - 429	стопы с деформацией и формированием зоны высокого риска рецидива язвы стопы одной конечности
4.2.3			Сахарный диабет с другими уточненными осложнениями (диабетическая нейро-остеоартропатия (Шарко)	E10.6		
4.2.3.1					Нарушения нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций, функций эндокринной системы и метаболизма; МКФ: B 710 - 789, B 798, B 799; B 540 - 559	Диабетическая нейроостеоартропатия одной или обеих стоп с незначительными нарушениями статодинамических функций
4.2.3.2					Нарушения нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций, функций эндокринной системы и метаболизма; МКФ: B 710 - 789, B 540 - 559	Диабетическая нейроостеоартропатия одной или обеих стоп с умеренными нарушениями статодинамических функций
4.2.3.3					Нарушения	Выраженная деформация

					нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций, функций эндокринной системы и метаболизма; МКФ: B 710 - 789, B 540 - 559	обеих стоп или одной стопы в сочетании с ампутацией другой стопы с выраженными нарушениями статодинамических функций
4.2.4			Ампутационная культя конечности			
4.2.4.1					Нарушения нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций, функций эндокринной системы и метаболизма; МКФ: B 710 - 789, B 540 - 559	Ампутационная культя стопы, голени, бедра при отсутствии нарушений на другой конечности
4.2.4.2					Нарушения нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций, функций эндокринной системы и метаболизма; МКФ: B 710 - 789, B 540 - 559	Ампутационная культя бедра/голени/стопы одной конечности в сочетании с ХАН II, III стадии или диабетической нейроостеартропатией на другой конечности
4.2.4.3					Нарушения	Ампутационные культи

					нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций, функций эндокринной системы и метаболизма; МКФ: B 710 - 789, B 540 - 559	голени/бедра обеих конечностей при невозможности их протезирования
4.3		Нарушения других эндокринных желез		E20 - E35		
4.3.1			Гипопаратиреоз Гипопаратироидизм, возникший после медицинских процедур	E20 E89.2		
Примечание к подпункту 4.3.1. Количественная оценка стойких нарушений функций организма граждан в возрасте 18 лет и старше при гипопаратиреозе зависит от частоты и (судорожных сокращений скелетных мышц, дыхательных мышц и мышц желудочно-кишечного тракта), а также от степени выраженност фосфорно-кальциевого обмена при измерении показателей в условиях стационара (содержание кальция - общего и ионизированного, фосфора и па сыворотке крови; уровень кальция и фосфора в моче).						
4.3.1.1					Нарушения психических функций, сенсорных, нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций, функций эндокринной системы и	Незначительные нарушения функций организма на фоне постоянной заместительной терапии при наличии редких тетаний преимущественно скелетных мышц, отсутствие или наличие незначительных

					метаболизма, мочевыделительной функции; МКФ: B 110 - 139, B 140 - 189, B 210 - 229, B 710 - 789, B 540 - 559, B 610 - 639	изменений показателей фосфорно-кальциевого обмена (при измерении в условиях стационара)
4.3.1.2					Нарушения психических функций, сенсорных, нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций, функций эндокринной системы и метаболизма, мочевыделительной функции; МКФ: B 110 - 139, B 140 - 189, B 210 - 229, B 710 - 789, B 540 - 559, B 610 - 639	Умеренные нарушения функций организма на фоне постоянной заместительной терапии при наличии частых тетаний различных мышечных групп (скелетных, дыхательных, мышц ЖКТ) и/или наличия умеренных изменений показателей фосфорно-кальциевого обмена (при измерении в условиях стационара)
4.3.2			Гиперпаратиреоз и другие нарушения паращитовидной (околощитовидной) железы	E21		
Примечание к подпункту 4.3.2. Количественная оценка стойких нарушений функций организма граждан в возрасте 18 лет и старше при гиперпаратиреозе зависит от наруше опорно-двигательного аппарата (остеопороз, остеодистрофия, деформации костей, патологические переломы), а также от нарушений мочев функции (проявления нефролитиаза, нефрокальциноза), функции пищеварительной системы.						
4.3.2.1					Нарушения	Нормокальцемическая и

					нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций, функций эндокринной системы и метаболизма, функций пищеварительной системы, мочевыделительной функции; МКФ: B 710 - 789, B 540 - 559, B 510 - 539, B 610 - 639	мягкая форма гиперпаратиреоза без клинических проявлений либо с незначительными нарушениями функций организма
4.3.2.2					Нарушения нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций, функций эндокринной системы и метаболизма, функций пищеварительной системы, мочевыделительной функции; МКФ: B 710 - 789, B 540 - 559, B 510 - 539, B 610 - 639	Манифестная форма гиперпаратиреоза с умеренными нарушениями функций организма на фоне базисной терапии
4.3.2.3					Нарушения нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций, функций эндокринной системы и метаболизма, функций	Манифестная форма гиперпаратиреоза с выраженными нарушениями функций организма на фоне базисной терапии

					пищеварительной системы, мочевыделительной функции; МКФ: B 710 - 789, B 540 - 559, B 510 - 539, B 610 - 639	
4.3.3		Гиперфункция гипофиза		E22		
4.3.3.1			Акромегалия и гипофизарный гигантизм	E22.0		
4.3.3.1.1					Нарушения психических, сенсорных, нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций, функций эндокринной системы и метаболизма, функций сердечно-сосудистой системы; МКФ: B 110 - 139, B 140 - 189, B 210 - 229, B 710 - 789, B 540 - 559, B 410 - 429	Акромегалия (и гипофизарный гигантизм) легкого течения с незначительными нарушениями функций организма
4.3.3.1.2					Нарушения психических, сенсорных, нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций, функций эндокринной системы и	Акромегалия (и гипофизарный гигантизм) среднетяжелого течения с умеренными нарушениями функций организма

					метаболизма, функций сердечно-сосудистой системы; МКФ: B 110 - 139, B 140 - 189, B 210 - 229, B 710 - 789, B 540 - 559, B 410 - 429	
4.3.3.1.3					Нарушения психических, сенсорных, нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций, функций эндокринной системы и метаболизма, функций сердечно-сосудистой системы, мочевыделительной функции; МКФ: B 110 - 139, B 140 - 189, B 210 - 229, B 710 - 789, B 540 - 559, B 410 - 429, B 610 - 639	Акромегалия (и гипофизарный гигантизм) среднетяжелого течения с выраженными нарушениями функций организма
4.3.4		Гипофункция и другие нарушения гипофиза.		E23		
4.3.4.1			Гипопитуитаризм	E23.0		
4.3.4.1.1					Нарушения психических функций, сенсорных функций, нарушения	Гипогонадотропный гипогонадизм, СТГ-недостаточность без

					нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций; функций пищеварительной, сердечно-сосудистой системы, эндокринной системы и метаболизма, мочевыделительной функции; МКФ: B 117 - 139, B 140 - 189, B 210 - 279, B 710 - 789, B 510 - 539, B 410 - 429, B 540 - 559, B 610 - 639	карликовости; пангипопитуитаризм, состояние медикаментозной компенсации или субкомпенсации
4.3.4.1.2					Нарушения психических функций, сенсорных функций, нарушения нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций, функций пищеварительной, сердечно-сосудистой системы, эндокринной системы и метаболизма, мочевыделительной функции; МКФ: B 117 - 139, B 140 - 189, B 210 - 279, B 710 - 789, B 510 - 539, B 410 - 429, B 540 - 559, B 610 - 639	СТГ-недостаточность с карликовостью; пангипопитуитаризм с умеренно выраженными нарушениями функций организма

4.3.5			Несахарный диабет. Нефрогенный несахарный диабет	E23.2 N25.1		
4.3.5.1					Нарушение нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций; функции эндокринной системы и метаболизма, сердечно-сосудистой, пищеварительной системы, мочевыделительной функции, функции кожи и связанных с ней систем; МКФ: B 710 - 789, B 540 - 559, B 410 - 429, B 510 - 539, B 610 - 639, B 810 - 849	Несахарный диабет (центральный или нефрогенный), компенсированный или субкомпенсированный на фоне проводимой терапии
4.3.5.2					Нарушение нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций; функции эндокринной системы и метаболизма, сердечно-сосудистой, пищеварительной системы, мочевыделительной функции, функции кожи и	Умеренные нарушения функций организма при декомпенсации несахарного диабета (центрального или нефрогенного) на фоне резистентности к терапии

					связанных с ней систем; МКФ: B 710 - 789, B 540 - 559, B 410 - 429, B 510 - 539, B 610 - 639, B 810 - 849	
4.3.6			Синдром и болезнь Иценко-Кушинга	E24		

Примечание к подпункту 4.3.6.
Количественная оценка степени выраженности стойких нарушений функций организма граждан в возрасте 18 лет и старше, обусловленных болезнью Иценко-Кушинга, зависит от фазы заболевания (активная, неактивная), степени тяжести формы заболевания (легкая, средней тяжести, тяж наличия осложнений (миопатии, кардиомиопатия с проявлениями ХСН, стероидный диабет, остеопороз, аменорея, атрофия мышц, спонтанные пере нейроофтальмологические нарушения, гипертоническая первично-сморщенная почка, почечная недостаточность, органические поражения ЦНС, нарушения), а также наличия злокачественных опухолей гипофиза, надпочечников и резистентности к проводимой терапии.

4.3.6.1					Нарушения психических, нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций, функций эндокринной системы и метаболизма, сердечно-сосудистой системы, мочевыделительной функции; МКФ: B 117 - 139, B 140 - 189, B 710 - 789, B 540 - 559, B 410 - 429, B 610 - 639	Гиперкортицизм с отсутствием или незначительными нарушениями функций организма на фоне проводимой терапии
4.3.6.2					Нарушения психических, нейромышечных, скелетных и связанных с движением	Гиперкортицизм средней тяжести синдрома без осложнений, с умеренными

					(статодинамических) функций, функций эндокринной системы и метаболизма, сердечно-сосудистой системы, мочевыделительной функции; МКФ: B 117 - 139, B 140 - 189, B 710 - 789, B 540 - 559, B 410 - 429, B 610 - 639	нарушениями функций организма на фоне проводимой терапии
4.3.6.3					Нарушения психических, нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций, функций эндокринной системы и метаболизма, сердечно-сосудистой системы, мочевыделительной функции; МКФ: B 117 - 139, B 140 - 189, B 710 - 789, B 540 - 559, B 410 - 429, B 610 - 639	Тяжелая форма гиперкортицизма с прогрессирующим течением на фоне проводимой терапии; с осложнениями, в том числе от хирургического и/или лучевого лечения опухолей, продуцирующих АКТГ; рецидив заболевания, приводящих к выраженным нарушениям функций организма
4.3.6.4					Нарушения психических, нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций, функций	Тяжелая форма гиперкортицизма с прогрессирующим течением на фоне терапии; с осложнениями, в том числе от

					эндокринной системы и метаболизма, сердечно-сосудистой системы, мочевыделительной функции; МКФ: B 117 - 139, B 140 - 189, B 710 - 789, B 540 - 559, B 410 - 429, B 610 - 639	оперативного и/или лучевого лечения опухолей надпочечников или гипофиза; рецидив заболевания, приводящих к значительно выраженным нарушениям функций организма
4.3.7			Врожденные адреногенитальные нарушения, связанные с дефицитом ферментов	E25.0		
4.3.7.1					Нарушение функции эндокринной системы и метаболизма; МКФ: B 540 - 559	Недостаточность функции надпочечников без нарушений функций или с незначительными нарушениями функций организма на фоне постоянной заместительной терапии
4.3.7.2					Нарушение функции эндокринной системы и метаболизма; МКФ: B 540 - 559	Недостаточность функции надпочечников с умеренными нарушениями функций организма на фоне постоянной заместительной терапии
4.3.7.3					Нарушения функций эндокринной системы и	Недостаточность функции надпочечников с

					метаболизма, нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций; МКФ: B 540 - 559, B 710 - 789	выраженными нарушениями функций организма
4.3.8			Гиперальдостеронизм	E26		
4.3.8.1					Нарушения функций эндокринной системы и метаболизма, сердечно-сосудистой системы; МКФ: B 540 - 559, B 410 - 429	Гиперальдостеронизм с незначительными нарушениями функций организма на фоне проводимой терапии (в том числе хирургической)
4.3.8.2					Нарушения функций эндокринной системы и метаболизма, сердечно-сосудистой системы, нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций; МКФ: B 540 - 559, B 410 - 429, B 710 - 789	Гиперальдостеронизм с умеренными нарушениями функции организма при неэффективности лечения (невозможность радикального удаления, рецидивы, продолженный рост опухоли, резистентность к медикаментозной терапии)
4.3.8.3					Нарушения функций эндокринной системы и метаболизма,	Гиперальдостеронизм с выраженными нарушениями функции организма при

					сердечно-сосудистой системы; нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций; МКФ: B 540 - 559, B 410 - 429, B 710 - 789	неэффективности лечения (невозможность радикального удаления, рецидивы, продолженный рост опухоли, резистентность к медикаментозной терапии)
4.3.9		Другие нарушения надпочечников Полигландулярная дисфункция		E27 E31		
Примечание к подпункту 4.3.9. Количественная оценка стойких нарушений функций организма граждан в возрасте 18 лет и старше при полигландулярной дисфункции надпочечниковой недостаточности зависит от прогредиентного характера течения заболевания, от "компонентов" заболевания (количества и вида систем организма, вовлеченных в патологический процесс), вида и степени нарушенных функций организма: сенсорных (снижение остроты зрен слепоты), статодинамических (множественные патологические переломы, остеопороз, контрактуры суставов, анкилозы), функций пищеварител (синдром мальабсорбции, язвенная болезнь), сердечно-сосудистой системы (ХСН различной стадии), эндокринной системы и метаболизма (гипогл синдром, сахарный диабет), мочевыделительной системы (ХБП различной стадии), функции кожи и связанных с ней систем, а также от наличия о стороны каждого "компонента" заболевания и эффективности проводимой терапии.						
4.3.9.1			Первичная надпочечниковая недостаточность Аутоиммунная полигландулярная недостаточность	E27.1 E31.0		

			Полигландулярная гиперфункция	E31.1		
4.3.9.1.1					Нарушения психических, сенсорных, нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций, функций пищеварительной, сердечно-сосудистой системы, системы крови и иммунной системы, эндокринной системы и метаболизма, мочевыделительной функции, функции кожи и связанных с ней систем; МКФ: B 117 - 139, B 140 - 189, B 210 - 279, B 710 - 789, B 510 - 539, B 410 - 429, B 430 - 439, B 540 - 559, B 610 - 639, B 810 - 849	Отсутствие клинико-функциональных проявлений заболевания на фоне проводимой терапии (в том числе хирургического лечения) или незначительные нарушения функций организма
4.3.9.1.2					Нарушения психических, сенсорных, нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций, функций пищеварительной, сердечно-сосудистой	Умеренные нарушения функций организма при неэффективности лечения (в том числе хирургического)

					системы, системы крови и иммунной системы, эндокринной системы и метаболизма, мочевыделительной функции, функции кожи и связанных с ней систем; МКФ: B 117 - 139, B 140 - 189, B 210 - 279, B 710 - 789, B 510 - 539, B 410 - 429, B 430 - 439, B 540 - 559, B 610 - 639, B 810 - 849	
4.3.9.1.3					Нарушения психических, сенсорных, нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций, функций пищеварительной, сердечно-сосудистой системы, системы крови и иммунной системы, эндокринной системы и метаболизма, мочевыделительной функции, функции кожи и связанных с ней систем; МКФ: B 117 - 139, B 140 - 189, B 210 - 279, B 710 - 789, B 510 - 539, B 410 - 429, B 430 - 439, B 540 -	Выраженные нарушения функций организма при неэффективности лечения и/или наличия осложнений со стороны органа и/или системы, вовлеченной в синдром

					559, B 610 - 639, B 810 - 849	
4.4		Ожирение и другие виды избыточности питания		E65 - 68		
4.4.1			Морбидное ожирение	E66.0 E67.8		
4.4.1.1					Нарушения психических, нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций, функций пищеварительной системы, сердечно-сосудистой, дыхательной системы, эндокринной системы и метаболизма; МКФ: B 140 - 189, B 710 - 789, B 510 - 539, B 410 - 429, B 440 - 449, B 540 - 559	Ожирение без осложнений либо в сочетании с незначительными нарушениями функций организма
4.4.1.2					Нарушения психических, нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций, функций пищеварительной системы, сердечно-сосудистой, дыхательной системы, эндокринной системы и	Ожирение с ИМТ более 40,0 в сочетании с умеренными нарушениями функций организма

					метаболизма; МКФ: B 140 - 189, B 710 - 789, B 510 - 539, B 410 - 429, B 440 - 449, B 540 - 559	
4.4.1.3					Нарушения психических, нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций, функций пищеварительной системы, сердечно-сосудистой, дыхательной системы, эндокринной системы и метаболизма; МКФ: B 140 - 189, B 710 - 789, B 510 - 539, B 410 - 429, B 440 - 449, B 540 - 559	Ожирение с ИМТ более 40,0 в сочетании с выраженными нарушениями функций организма
4.4.1.4					Нарушения психических, нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций, функций пищеварительной системы, сердечно-сосудистой, дыхательной системы, эндокринной системы и метаболизма; МКФ: B 140 - 189, B 710 - 789, B 510 - 539, B 410 - 429, B 440 - 449, B 540 - 559	Ожирение с ИМТ более 40,0 в сочетании со значительно выраженными нарушениями функций организма

4.5		Нарушения обмена веществ		E70 - E90		
4.5.1			Классическая фенилкетонурия Другие виды гиперфенилаланинемии	E70.0 E70.1		
Примечание к подпункту 4.5.1. Количественная оценка степени выраженности стойких нарушений функций организма граждан в возрасте 18 лет и старше, обусловленных фени основывается на определении степени выраженности сформированных в детском возрасте стойких нарушений психических функций, а также учит течение заболевания, возможность достижения безопасного допустимого уровня фенилаланина и прогноз.						
4.5.1.1			Фенилкетонурия легкая (6 - 10 мг/дл), среднетяжелая (10 - 20 мг/дл) форма Фенилкетонурия классическая форма (более 20 мг/дл) Другие виды гиперфенилаланинемии: птерин-зависимая (кофакторная, атипичная форма фенилкетонурии) - ФКУ II и III типа	E70.0 E70.1		
4.5.1.1.1					Нарушение психических функций; МКФ: B 110 - 139, B 140 -	При наличии незначительных нарушений функций организма: незначительное

					189;	когнитивное снижение; незначительное снижение интеллекта (IQ = 65 - 69 баллов)
4.5.1.1.2					Нарушение психических функций; МКФ: B 110 - 139, B 140 - 189,	При наличии умеренных нарушений функций организма: умеренное когнитивное снижение; умеренное снижение интеллекта (IQ = 50 - 64 баллов)
4.5.1.1.3					Нарушение психических функций; МКФ: B 110 - 139, B 140 - 189; B 310 - 340	При наличии выраженных нарушений функций организма: выраженное когнитивное снижение; выраженное снижение интеллекта (IQ = 35 - 49 баллов)
4.5.1.1.4					Нарушение психических функций; МКФ: B 110 - 139, B 140 - 189	При наличии значительно выраженных нарушений функций организма: значительно выраженное снижение интеллекта (IQ < 35 баллов)
4.5.2			Нарушение обмена ароматических аминокислот Нарушение обмена	E70 E71		

			аминокислот с разветвленной цепью и обмена жирных кислот: болезнь "кленового сиропа" (лейциноз), изовалериановая, метилмалоновая, пропионовая ацидемия и другие			
			Другие нарушения обмена аминокислот: цистиноз, цистинурия, синдром Фанкони (-де Тони) (-Дебре), болезнь Хартнупа, синдром Лоу, глютарикацидурия, гомоцистинурия и другие	E72		
			Другие нарушения обмена углеводов: галактоземия, фруктоземия и другие	E74		
			Нарушения обмена сфинголипидов и другие болезни накопления липидов: болезнь Фабри, Тея-Сакса, Гоше, Краббе, Ниманна-Пика; синдром Фабера, метахроматическая	E75		

			лейкодистрофия; недостаточность сульфатазы)			
			Нарушения обмена глюкозаминогликанов (мукополисахаридозы I, II, III, IV, VI, VII типов)	E76		
			Нарушение обмена гликопротеинов	E77		
			Нарушение обмена липопротеидов и другие дислипидемии	E78		
			Нарушения обмена пуринов и пиримидинов: синдром Леша-Нихена, ксантинурия	E79		
			Нарушения обмена порфирина и билирубина (синдром Криглера-Найяра, болезнь Байлера, синдром Люси-Дрисколла)	E80		
			Нарушение минерального обмена (болезнь Вильсона-Коновалова, гепатолентикулярная	E83		

			дегенерация)			
Примечание к подпункту 4.5.2. Количественная оценка степени выраженности стойких нарушений функций организма граждан в возрасте 18 лет и старше при редких орфанных обусловленных нарушением обмена тирозина, аминокислот с разветвленной цепью, жирных кислот, сфинголипидов и других, основывает показателей нервно-психического, физического и речевого развития, а также учитывает форму и тип течения заболевания (прогредиентное и клинический полиморфизм симптоматики, возможность компенсации нарушенных функций организма патогенетическим лечением, про заболевания.						
4.5.2.1					Нарушения психических, языковых и речевых, сенсорных, нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций, функций пищеварительной, сердечно-сосудистой, эндокринной систем и метаболизма, мочевыделительной функции; МКФ: B 117 - 139, B 140 - 189, B 198, B 199, B 310 - 340, B 398, B 399; B 210 - 279, B 710 - 789, B 798, B 799; B 510 - 539, B 410 - 429, B 540 - 559, B 610 - 639	Прогредиентное течение заболевания, частично компенсируемое патогенетической терапией, при наличии незначительных нарушений функций организма
4.5.2.2					Нарушения психических, языковых и речевых, сенсорных,	Кризовое или прогредиентное течение заболевания, не компенсируемое

					нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций, функций пищеварительной, сердечно-сосудистой, эндокринной систем и метаболизма, мочевыделительной функции; МКФ: B 117 - 139, B 140 - 189, B 198, B 199, B 310 - 340, B 398, B 399, B 210 - 279, B 710 - 789, B 798, B 799; B 510 - 539, B 410 - 429, B 540 - 559, B 610 - 639	патогенетической терапией, при наличии умеренных нарушений функций организма
4.5.2.3					Нарушения психических, языковых и речевых, сенсорных, нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций, функций пищеварительной, сердечно-сосудистой, эндокринной систем и метаболизма, мочевыделительной функции; МКФ: B 117 - 139, B 140 - 189, B 198, B 199, B 310 -	Кризовое или прогредиентное течение заболевания, не компенсируемое патогенетической терапией, при наличии выраженных нарушений функций организма

					340, B 398, B 399, B 210 - 279, B 710 - 789, B 798, B 799, B 510 - 539, B 410 - 429, B 540 - 559, B 610 - 639	
4.5.2.4					Нарушения психических, языковых и речевых, сенсорных, нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций, функций пищеварительной, сердечно-сосудистой, эндокринной систем и метаболизма, мочевыделительной функции; МКФ: B 117 - 139, B 140 - 189, B 198, B 199, B 310 - 340, B 398, B 399; B 210 - 279, B 710 - 789, B 798, B 799, B 510 - 539, B 410 - 429, B 540 - 559, B 610 - 639	Кризовое или прогредиентное течение заболевания, не компенсируемое патогенетической терапией, при наличии значительно выраженных нарушений функций организма
4.5.3			Кистозный фиброз (муковисцидоз) с легочными проявлениями Кистозный фиброз (муковисцидоз) с другими проявлениями (с	E84.0 E84.1		

			комбинированными проявлениями) Кистозный фиброз неуточненный	E84.9		
Примечание к подпункту 4.5.3. Количественная оценка стойких нарушений функций организма граждан в возрасте 18 лет и старше, обусловленных муковисцидозом, основывает фазы и активности процесса, характера течения заболевания, вида генетических мутаций, степени выраженности проявлений со стороны пище дыхательной, сердечно-сосудистой, эндокринной систем, других систем организма, вида микробного патогена дыхательного тракта, а также наличия						
4.5.3.1					Нарушения функций дыхательной, пищеварительной, эндокринной систем и метаболизма; МКФ: B 440 - 449, B 510 - 539, B 540 - 559	Формы заболевания без клинической симптоматики или легкое течение заболевания с незначительными нарушениями функции дыхательной и пищеварительной систем
4.5.3.2					Нарушения функций пищеварительной, дыхательной, сердечно-сосудистой систем, системы крови и иммунной системы, эндокринной системы и метаболизма; МКФ: B 510 - 539, B 440 - 449; B 410 - 429, B 430 - 439, B 540 - 559	Среднетяжелая форма заболевания с умеренными нарушениями функций организма, первичный или интермитирующий высев: P. aeruginosa, B. cepacia complex, MRSA, Stenotrophomonas maltophilia, Achromobacter spp., нетуберкулезными микобактериями, грибами рода Aspergillus и других микробных патогенов, синдром потери соли,

						хроническая панкреатическая недостаточность, острый и рецидивирующий панкреатит, синдром дистальной интестинальной обструкции, кровохарканье, цирроз печени без портальной гипертензии, нарушенная толерантность к глюкозе и диабет без потребности в инсулине, хронический панкреатит, белково-энергетическая недостаточность
4.5.3.3					Нарушения функций пищеварительной, дыхательной, сердечно-сосудистой системы, системы крови и иммунной системы, эндокринной системы и метаболизма, нарушение психических функций; МКФ: B 510 - 539, B 440 - 449, B 410 - 429, B 430 - 439, B 540 - 559, B 110 - 139, B 140 - 189	Тяжелая форма заболевания с выраженными нарушениями функций организма; наличие тяжелых хронических инфекционных осложнений, вызванных: P. aeruginosa, B. cepacia complex, MRSA, Stenotrophomonas maltophilia, Achromobacter spp., нетуберкулезными микобактерии, грибами рода Aspergillus и другими микробными патогенами, повторный синдром потери соли или синдром дистальной интестинальной обструкции, легочное кровотечение, цирроз печени с портальной

						гипертензией, муковисцидоз-ассоциированный диабет с потребностью в инсулине, остеопороз, белково-энергетическая недостаточность 2 - 3 степени - носители гастростомы, панкреатическая недостаточность с высокой потребностью в панкреатических ферментах (> 10 000 Ед/кг или 4 000 Ед/грамм жира), частые обострения хронического панкреатита, пневмоторакс
4.5.3.4					Нарушения функций пищеварительной, дыхательной, сердечно-сосудистой системы, системы крови и иммунной системы, эндокринной системы и метаболизма, нарушение психических функций; МКФ: B 510 - 539, B 440 - 449, B 410 - 429, B 430 - 439, B 540 - 559, B 110 - 139, B 140 - 189	Хроническая дыхательная недостаточность с кислородозависимостью, $ОФВ_1$ < 30% от должного, пациенты находящиеся в листе ожидания трансплантации легких или печени
5	Психические расстройства и			F00 - F99		

	расстройства поведения (класс V)					

Примечание к пункту 5.
Количественная оценка стойких нарушений психических функций организма граждан в возрасте 18 лет и старше, обусловленных психическими ра и расстройствами поведения, основывается преимущественно на оценке типологии, выраженности и стойкости психопатологической с объективизируемых клинически и экспериментально-психологически. Учитываются также особенности течения заболевания, его стадия и прогно тяжесть осложнений, наличие и особенности патопластического фона, включая преморбидные особенности личности, эффективность ком механизмов и состояние адаптации в основных сферах жизнедеятельности (производственной, бытовой, социально-средовой).

5.1		Нарушения психологического развития		F80 - F89		
5.1.1.			Общие расстройства психологического развития	F84		
			Детский аутизм	F84.0		
			Атипичный аутизм	F84.1		
			Синдром Ретта.	F84.2		
			Синдром Аспергера	F84.5		

Примечание к подпункту 5.1.1.
Количественная оценка стойких нарушений психических функций организма граждан в возрасте 18 лет и старше при расстройствах аутистичес различного генеза основывается преимущественно на анализе степени дефицита социальной коммуникации (аутистическая отрешенность, замещение, тормозимость, снижение, вплоть до полного отсутствия социальной активности), выраженности и стойкости имеющейся клинической с и нарушений поведения (фобии и аффективные методы защиты - моторные и речевые стереотипии, поведенческие ритуалы, сверхценны патологические фантазии, "феномен тождества" или требование неизменности, постоянства; агрессивность, включая аутоагрессию). Учитываются та и выраженность специфических речевых нарушений, интеллектуальной недостаточности, когнитивного снижения, психопатологических

(кататонических, пароксизмальных и подобных), а также состояние компенсаторных механизмов и адаптации в основных сферах жизне (производственной, бытовой, социально-средовой).						
5.1.1.1					Нарушение психических, языковых и речевых функций; МКФ: B 110 - 199, B 310 - 399	Взрослый самостоятельно устанавливает контакт, но испытывает трудности в организации общения, особенно в новых социальных контактах (нервозность, робость, тормозимость). Нет активного избегания взгляда. "Поведенческий сценарий": сохранение постоянства среды за счет формирования штампов - образцов правильного социального поведения; защитные образования (стереотипии, ритуалы) минимальны, носят адекватный, компенсаторный характер, появляются только в ситуации тревоги. Речевые навыки сформированы, в речи возможны единичные эхолалии, стереотипии, речевые "штампы". Коммуникативная функция речи сохранена. Интеллект не снижен либо снижен незначительно (IQ = 65 - 69 баллов).

						В целом социально адаптирован, но нуждается в индивидуальном подходе, при необходимости - в социальном сопровождении
5.1.1.2					Нарушение психических, языковых и речевых функций; МКФ: B 110 - 199, B 310 - 399	Взрослый самостоятельно устанавливает лишь минимальный контакт с окружающими, требуется постоянное побуждение. Во время контакта - повышенный уровень нервозности и боязни. Наличие кратковременного фиксированного визуального контакта. "Поведенческий сценарий": допускаются минимальные нарушения стереотипа общения, формируются сложные виды аффективной защиты (патологические увлечения, компенсаторные фантазии, лишенные социальной направленности). Коммуникативная функция речи нарушена. Имеются умеренные специфические нарушения речи (речь "штампованная", "стереотипная"). Интеллект не снижен либо

						снижен от незначительной до умеренной степени (IQ = 50 - 69 баллов). Испытывает существенные трудности адаптации в основных сферах жизнедеятельности, нуждается в периодическом социальном сопровождении
5.1.1.3					Нарушения психических, языковых и речевых функций, функций пищеварительной системы, мочевыделительной функции; МКФ: B 110 - 199, B 310 - 399, B 510 - 539, B 610 - 639	Взрослый самостоятельно не устанавливает контакт с окружающими, возможно лишь кратковременное привлечение внимания после побуждения. Избегание визуального контакта. "Поведенческий сценарий": не допускаются нарушения стереотипа окружающей среды, формируются множественные стереотипии, поведенческие ритуалы; характерны выраженные фобии. Коммуникативная функция речи нарушена. Имеются выраженные специфические нарушения речи. Интеллект - выраженное снижение (IQ = 35 - 49 баллов).

						Возможно нарушение функции тазовых органов. Частичная дезадаптация в основных сферах жизнедеятельности, нуждается в постоянном социальном сопровождении
5.1.1.4					Нарушения психических, языковых и речевых функций, функций пищеварительной системы, мочевыделительной функции; МКФ: B 110 - 199, B 310 - 399, B 510 - 539, B 610 - 639	Отсутствие визуального и вербального контакта, привлечь внимание невозможно. "Поведенческий сценарий": при малейшем изменении постоянства окружающей среды - неуправляемое двигательное возбуждение либо полное отрешение от окружающего; многочисленные страхи, стереотипии, проявления кататонического синдрома. Методы аффективной защиты (ритуалы) не развиты. Интеллект: значительно выраженное снижение (IQ < 34 баллов). Нарушение или отсутствие контроля функции тазовых органов. Полная дезадаптация в основных сферах

						жизнедеятельности с нуждаемостью в постоянном постороннем уходе и надзоре
5.2		Умственная отсталость		F70 - F79		

Примечание к подпункту 5.2.
Количественная оценка стойких нарушений психических функций организма граждан в возрасте 18 лет и старше граждан в возрасте 18 лет
умственной отсталости основывается на оценке степени интеллектуальной недостаточности, объективизируемой кли
экспериментально-психологически (тест WAIS - Wechsler Adult Intelligence Scale, предназначенный для тестирования лиц от 16 лет и старше)
клиническом варианте и степени выраженности поведенческих нарушений (конфликтность, агрессивность, асоциальность, делинквентная на
аддиктивность, неусидчивость, моторное беспокойство, негативизм, истерические, отказные реакции и реакции ухода, индифферентность, аутиза
сопутствующей психопатологической и соматоневрологической симптоматики (пароксизмальные нарушения, параличи, парезы, патология зрен
другие); на клиническом и социальном прогнозе; на уровне адаптации взрослого в основных сферах жизнедеятельности (производственн
социально-средовой).

При наличии в структуре умственной отсталости системного недоразвития речи различной степени количественно оцениваются и нарушения
речевых функций. При невозможности или затруднении оценки степени интеллектуальной недостаточности методикой Векслера в связи с о
клинической симптоматики (тяжелые поведенческие расстройства, наличие патологии органов восприятия - зрения и/или слуха) оценка произво
клинически по результатам динамического наблюдения (заключение ВК ПНД).

5.2.1			Умственная отсталость легкой степени	F70		
5.2.1.1					Нарушения психических, языковых и речевых функций; МКФ: B 110 - 199, B 310 - 399	Легкая умственная отсталость (IQ 65 - 69 баллов) при отсутствии либо в сочетании с незначительными расстройствами поведения, соматоневрологическими

						нарушениями, существенно не влияющими на адаптацию в основных сферах жизнедеятельности
5.2.1.2					Нарушения психических, языковых и речевых функций; МКФ: B 110 - 199, B 310 - 399	Легкая умственная отсталость (IQ 50 - 64 балла) при отсутствии сопутствующей симптоматики; легкая умственная отсталость (IQ 50 - 69 баллов) в сочетании с умеренными стойкими расстройствами поведения, психическими нарушениями (когнитивными, аффективными и прочими), соматоневрологическими нарушениями, существенно затрудняющими адаптацию в основных сферах жизнедеятельности
5.2.1.3					Нарушения психических, языковых и речевых функций, функций пищеварительной системы, мочевыделительной функции; МКФ: B 110 - 199, B 310 - 399, B 510 - 539, B 610 - 639	Легкая умственная отсталость (IQ 50 - 69 баллов) в сочетании с выраженными стойкими расстройствами поведения с возможностью лишь частичной их коррекции; психическими нарушениями (когнитивными, аффективным и прочими), соматоневрологическими

						нарушениями, приводящими к дезадаптации в основных сферах жизнедеятельности. Нарушение контроля функции тазовых органов
5.2.2			Умственная отсталость умеренная	F71		
					Нарушения психических, языковых и речевых функций; МКФ: B 110 - 199, B 310 - 399	Умеренная умственная отсталость (IQ 35 - 49 баллов) при отсутствии сопутствующей симптоматики, либо в сочетании с незначительными стойкими расстройствами поведения, психическими нарушениями (когнитивными, аффективными и прочими), соматоневрологическими нарушениями, существенно затрудняющими адаптацию в основных сферах жизнедеятельности
5.2.2.1					Нарушения психических, языковых и речевых функций, функций пищеварительной системы, мочевыделительной функции; МКФ: B 110 - 199, B 310 -	Умеренная умственная отсталость (IQ 35 - 49 баллов) при отсутствии сопутствующей симптоматики; умеренная умственная отсталость (IQ 35 - 49 баллов)

					399, B 510 - 539, B 610 - 639	в сочетании с умеренными стойкими расстройствами поведения, психическими нарушениями (когнитивными, аффективными и прочими), соматоневрологическими нарушениями, приводящими к частичной дезадаптации в основных сферах жизнедеятельности. Нарушение контроля функции тазовых органов
5.2.2.2					Нарушения психических, языковых и речевых функций, функций пищеварительной системы, мочевыделительной функции; МКФ: B 110 - 199, B 310 - 399, B 510 - 539, B 610 - 639	Умеренная умственная отсталость (IQ 35 - 49 баллов) в сочетании с выраженными и значительно выраженными стойкими расстройствами поведения при невозможности их коррекции; психопатологическими нарушениями (затяжными психотическими состояниями, некорригируемыми аффективными, двигательными нарушениями, расстройствами сферы влечений и иными нарушениями), грубыми соматоневрологическими нарушениями, снижением или отсутствием контроля

						функции тазовых органов, приводящими к полной дезадаптации в основных сферах жизнедеятельности с необходимостью постоянного ухода и надзора
5.2.3			Умственная отсталость тяжелая	F72		
					Нарушения психических, языковых и речевых функций, функций пищеварительной системы, мочевыделительной функции; МКФ: B 110 - 199, B 310 - 399, B 510 - 539, B 610 - 639	Тяжелая умственная отсталость (IQ 20 - 34 баллов), приводящая к полной дезадаптации в основных сферах жизнедеятельности с необходимостью постоянного ухода и надзора. Отсутствие контроля функции тазовых органов
5.2.4			Умственная отсталость глубокая	F73		
5.2.4.1					Нарушения психических, языковых и речевых функций, функций пищеварительной системы, мочевыделительной функции; МКФ: B 110 - 199, B 310 - 399, B 510 - 539, B 610 - 639	Глубокая умственная отсталость (IQ < 20 баллов), приводящая к полной дезадаптации в основных сферах жизнедеятельности с необходимостью постоянного ухода и надзора. Отсутствие контроля функции тазовых органов

5.3		Шизофрения, шизотипические состояния и бредовые расстройства		F20 - F29		
Примечание к подпункту 5.3. Количественная оценка стойких нарушений психических функций организма граждан в возрасте 18 лет и старше при шизофрении преимущественно на анализе клинической формы, типа, темпа течения и стадии развития заболевания, типологии, выраженности психопатологической симптоматики, этапа, полноты и стойкости ремиссии, характера и выраженности эндогенных изменений личности, объект клинически и экспериментально-психологически. Учитываются также клинический и социальный прогноз; преморбидные особенности, урове компенсаторные возможности личности; состояние адаптации в основных сферах жизнедеятельности (производственной, бытовой, социально-средо						
5.3.1			Шизофрения, эпизодический ремитирующий (рекуррентный) тип течения: кататоническая, недифференцированная, постшизофреническая депрессия, другой тип, неуточненная Шизоаффективное расстройство	F20 F20.2 F20.3 F20.4 F20.8 F20.9 F25		
5.3.1.1					Нарушение психических	Приступ (приступы) общей

					функций; МКФ: B 110 - 199	продолжительностью до 4 месяцев в год; устойчивая ремиссия с незначительной стойкой резидуальной психопатологической симптоматикой, существенно не влияющей на адаптацию в основных сферах жизнедеятельности
5.3.1.2					Нарушение психических функций; МКФ: B 110 - 199	Приступ (приступы) общей продолжительностью от 4 до 10 месяцев в год; неполная и/или нестойкая ремиссия с умеренной психопатологической симптоматикой, резистентной к терапии, существенно затрудняющей адаптацию в основных сферах жизнедеятельности
5.3.1.3					Нарушение психических функций; МКФ: B 110 - 199	Затяжные или частые приступы общей продолжительностью 10 и более месяцев в год; неполная и нестойкая ремиссия с выраженной психопатологической симптоматикой, резистентной к терапии и приводящей к частичной дезадаптации в

						основных сферах жизнедеятельности
5.3.2			Шизофрения: эпизодический тип течения со стабильным дефектом, эпизодический тип течения с нарастающим дефектом: параноидная гебефреническая кататоническая недифференцированная постшизофреническая депрессия остаточная (резидуальная) другой тип неуточненная	F20 F20.0 F20.1 F20.2 F20.3 F20.4 F20.5 F20.8 F20.9		
5.3.2.1					Нарушение психических функций; МКФ: B 110 - 199	Не более одного приступа в год продолжительностью до 4 месяцев; стойкая ремиссия с незначительными стойкими дефицитарными расстройствами, эндогенными

						изменениями личности, существенно не влияющими на адаптацию в основных сферах жизнедеятельности
5.3.2.2					Нарушение психических функций; МКФ: B 110 - 199	Приступ (приступы) общей продолжительностью от 4 до 6 месяцев в год; неполная и/или нестойкая ремиссия с умеренными стабильными или нарастающими дефицитарными расстройствами, эндогенными изменениями личности, резидуальной психопатологической симптоматикой, существенно затрудняющими адаптацию в основных сферах жизнедеятельности
5.3.2.3					Нарушение психических функций; МКФ: B 110 - 199	Приступ (приступы) общей продолжительностью от 6 до 10 месяцев в год; неполная и нестойкая ремиссия с выраженными стабильными или нарастающими дефицитарными расстройствами, эндогенными изменениями личности, резидуальной психопатологической

						симптоматикой, резистентной к терапии, приводящими к частичной дезадаптации в основных сферах жизнедеятельности
5.3.2.4					Нарушения психических функций, функций пищеварительной системы, мочевыделительной функции; МКФ: B 110 - 199, B 510 - 539, B 610 - 639	Приступ (приступы) общей продолжительностью 10 и более месяцев в год; значительно выраженные стойкие дефицитарные расстройства, эндогенные изменения личности с отсутствием критики к состоянию, возможным снижением или отсутствием контроля функции тазовых органов, приводящие к полной дезадаптации в основных сферах жизнедеятельности с необходимостью постоянного ухода и надзора
5.3.3			Шизофрения, непрерывный тип течения: параноидная гебефреническая кататоническая,	F20 F20.0 F20.1 F20.2		

			недифференцированная, остаточная простая другой тип неуточненная	F20.3 F20.5 F20.6 F20.8 F20.9		
5.3.3.1					Нарушение психических функций; МКФ: B 110 - 199	Незначительные стойкие прогрессирующие дефицитарные расстройства, эндогенные изменения личности, продуктивная психопатологическая симптоматика, существенно не влияющие на адаптацию в основных сферах жизнедеятельности
5.3.3.2					Нарушение психических функций; МКФ: B 110 - 199	Умеренные стойкие прогрессирующие дефицитарные расстройства, эндогенные изменения личности, продуктивная психопатологическая симптоматика, существенно затрудняющие адаптацию в основных сферах жизнедеятельности
5.3.3.3					Нарушение психических	Выраженные стойкие

					функций; МКФ: B 110 - 199	прогрессирующие дефицитарные расстройства, эндогенные изменения личности, продуктивная психопатологическая симптоматика, резистентная к терапии, приводящие к частичной дезадаптации в основных сферах жизнедеятельности
5.3.3.4					Нарушения психических функций, функций пищеварительной системы, мочевыделительной функции; МКФ: B 110 - 199, B 510 - 539, B 610 - 639	Значительно выраженные стойкие дефицитарные расстройства (шизофреническое слабоумие), эндогенные изменения личности, продуктивная психопатологическая симптоматика, резистентная к терапии, с отсутствием критики к состоянию, возможным снижением или отсутствием контроля функции тазовых органов, приводящие к полной дезадаптации в основных сферах жизнедеятельности с необходимостью постоянного ухода и надзора
5.3.4			Шизотипическое	F21		

			расстройство			
5.3.4.1					Нарушение психических функций; МКФ: B 110 - 199	Незначительные стойкие дефицитарные расстройства, эндогенные изменения личности, психопатологическая симптоматика непсихотического регистра, существенно не влияющие на адаптацию в основных сферах жизнедеятельности
5.3.4.2					Нарушение психических функций; МКФ: B 110 - 199	Умеренные стойкие дефицитарные расстройства, эндогенные изменения личности, психопатологическая симптоматика непсихотического регистра, существенно затрудняющие адаптацию в основных сферах жизнедеятельности
5.3.4.3					Нарушение психических функций; МКФ: B 110 - 199	Выраженные стойкие дефицитарные расстройства; эндогенные изменения личности, психопатологическая симптоматика непсихотического регистра, приводящие к частичной

						дезадаптации в основных сферах жизнедеятельности
5.3.4.4					Нарушения психических функций, функций пищеварительной системы, мочевыделительной функции; МКФ: B 110 - 199, B 510 - 539, B 610 - 639	Значительно выраженные стойкие дефицитарные расстройства, эндогенные изменения личности, резистентные к терапии с отсутствием критики к состоянию, возможным снижением или отсутствием контроля функции тазовых органов, приводящие к полной дезадаптации в основных сферах жизнедеятельности с необходимостью постоянного ухода и надзора
5.4		Расстройства настроения (аффективные расстройства)		F30 - F39		
Примечание к подпункту 5.4. Количественная оценка стойких нарушений психических функций организма граждан в возрасте 18 лет и старше при аффективных расстройствах (м депрессивных, смешанных) основывается преимущественно на анализе их структуры, выраженности и стойкости, частоты и длительнос эффективности проводимого лечения, полноты, стойкости и длительности ремиссий, объективизируемых клинически и экспериментально-пси Учитываются также преморбидные особенности личности и ее реакция на болезнь, эффективность компенсаторных механизмов, уровень критики основных сферах жизнедеятельности (производственной, бытовой, социально-средовой).						
5.4.1					Нарушение психических функций;	Незначительные аффективные расстройства, общей

					МКФ: B 110 - 199	продолжительностью не более 6 месяцев в год, купирующиеся фармакотерапией, со стойкой ремиссией, существенно не влияющие на адаптацию в основных сферах жизнедеятельности
5.4.2					Нарушение психических функций; МКФ: B 110 - 199	Умеренные аффективные расстройства, стойкие затяжные или частые, общей продолжительностью от 6 до 10 месяцев в год, существенно затрудняющие адаптацию в основных сферах жизнедеятельности
5.4.3					Нарушение психических функций; МКФ: B 110 - 199	Выраженные аффективные расстройства, стойкие затяжные или частые, общей продолжительностью 10 и более месяцев в год, приводящие к частичной дезадаптации в основных сферах жизнедеятельности
5.4.4					Нарушение психических функций; МКФ: B 110 - 199	Значительно выраженные аффективные расстройства, стойкие затяжные или частые, общей продолжительностью 10 и более месяцев в год,

						приводящие к полной дезадаптации в основных сферах жизнедеятельности с необходимостью постоянного ухода и надзора
5.5		Невротические, связанные со стрессом и соматоформные расстройства		F40 - F48		
Примечание к подпункту 5.5. Количественная оценка стойких нарушений психических функций граждан в возрасте 18 лет и старше при невротических расстройствах преимущественно на анализе их длительности и динамики (реакции, состояние, патологическое развитие личности), типологии, выраженности психопатологической симптоматики, эффективности терапии, объективизируемых клинически и экспериментально-психологически. Учитыв преморбидные особенности личности, эффективность компенсаторных механизмов и состояние адаптации в основных сферах жизне (производственной, бытовой, социально-средовой).						
5.5.1			Фобические тревожные расстройства	F40		
			Другие тревожные расстройства	F41		
			Обсессивно-компульсивное расстройство	F42		
			Реакция на тяжелый стресс и нарушения адаптации	F43		
			Диссоциативные	F44		

			(конверсионные) расстройства Соматоформные расстройства Другие невротические расстройства	 F45 F48		
5.5.1.1					Нарушение психических функций; МКФ: B 110 - 199	Невротические реакции или состояния с незначительной симптоматикой невротического круга (неврастенической, фобической, тревожно-депрессивной, обсессивно-компульсивной, истероконверсионной и прочими), существенно не влияющие на адаптацию в основных сферах жизнедеятельности
5.5.1.2					Нарушение психических функций; МКФ: B 110 - 199	Невротические состояния с умеренными стойкими расстройствами невротического круга (неврастеническими, фобическими, тревожно-депрессивными, обсессивно-компульсивными, истероконверсионными и прочими), с тенденцией к

						ипохондризации, существенно затрудняющие адаптацию в основных сферах жизнедеятельности
5.5.1.3					Нарушение психических функций; МКФ: B 110 - 199	Невротические состояния с выраженными стойкими и резистентными к терапии расстройствами невротического круга (неврастеническими, фобическими, тревожно-депрессивными, обсессивно-компульсивными, истероконверсионными и прочими), с возможным переходом в патологическое развитие личности, приводящие к частичной дезадаптации в основных сферах жизнедеятельности
5.5.1.4					Нарушения психических функций, функций пищеварительной системы, мочевыделительной функции; МКФ: B 110 - 199, B 510 - 539, B 610 - 639	Патологическое развитие личности со значительно выраженной, стойкой и резистентной к терапии истероконверсионной симптоматикой (амавроз, псевдопаралич по типу геми- или параплегии, астазия-абазия, псевдодеменция, нарушение

						функции тазовых органов), с отсутствием критики к состоянию, приводящие к полной дезадаптации в основных сферах жизнедеятельности с необходимостью постоянного ухода и надзора
5.6		Органические, включая симптоматические, психические расстройства		F00 - F09		
Примечание к подпункту 5.6. Количественная оценка стойких нарушений психических функций организма граждан в возрасте 18 лет и старше при церебрально-органическ основывается преимущественно на анализе нозологической принадлежности, стадии и типа течения заболевания; структуры, выраженности психопатологической симптоматики: нарушений со стороны психических процессов (когнитивных и эмоционально-волевых), органических измене психотических, аффективных, неврозоподобных, пароксизмальных и иных расстройств, объективизируемых клинически и экспериментально-пси Учитываются также эффективность терапии, клинический и социальный прогноз; преморбидные особенности, уровень критики и компенсаторные личности, состояние адаптации в основных сферах жизнедеятельности (производственной, бытовой, социально-средовой).						
5.6.1			Деменция при болезни Альцгеймера Сосудистая деменция Деменция при других болезнях, классифицированных в других рубриках	F00 F01 F02		

			Деменция неуточненная Органический амнестический синдром, не вызванный алкоголем или другими психоактивными веществами Другие психические расстройства, обусловленные повреждением и дисфункцией головного мозга или соматической болезнью. Расстройства личности и поведения, обусловленные болезнью, повреждением или дисфункцией головного мозга Органическое или симптоматическое психическое расстройство неуточненное	F03 F04 F06 F07 F09		
5.6.1.1					Нарушение психических функций; МКФ: B 110 - 199	Стойкие незначительные и умеренные астенические, незначительные когнитивные,

						аффективные, неврозоподобные расстройства, органические изменения личности, редкие пароксизмальные расстройства, снижение интеллекта до уровня незначительной интеллектуальной недостаточности (IQ = 65 - 69 баллов), существенно не влияющие на адаптацию в основных сферах жизнедеятельности
5.6.1.2					Нарушение психических функций; МКФ: B 110 - 199	Стойкие выраженные астенические, умеренные когнитивные, аффективные, неврозоподобные, галлюцинаторные, бредовые расстройства, органические изменения личности, средней частоты пароксизмальные расстройства, снижение интеллекта до уровня умеренной интеллектуальной недостаточности (IQ = 50 - 64 баллов), существенно затрудняющие адаптацию в основных сферах жизнедеятельности

5.6.1.3					Нарушения психических функций, функций пищеварительной системы, мочевыделительной функции; МКФ: B 110 - 199, B 510 - 539, B 610 - 639	Стойкие значительно выраженные астенические, выраженные когнитивные, аффективные, неврозоподобные, галлюцинаторные, бредовые расстройства, органические изменения личности, частые пароксизмальные расстройства, снижение интеллекта до уровня выраженной интеллектуальной недостаточности (IQ = 35 - 49 баллов), снижение контроля функции тазовых органов, приводящие к частичной дезадаптации в основных сферах жизнедеятельности
5.6.1.4					Нарушения психических функций, функций пищеварительной системы, мочевыделительной функции; МКФ: B 110 - 199, B 510 - 539, B 610 - 639	Стойкое значительно выраженное снижение когнитивных процессов и интеллекта (IQ < 34) в сочетании с другой психопатологической симптоматикой или без нее, отсутствие контроля функции тазовых органов, приводящие к полной дезадаптации в основных сферах жизнедеятельности с

						необходимостью постоянного ухода и надзора
5.7		Эпизодические и пароксизмальные расстройства		G40 - G47		
Примечание к подпункту 5.7. Количественная оценка выраженности нарушений психических функций организма граждан в возрасте 18 лет и старше при эпилепсии и эп синдромах основывается на оценке возраста начала заболевания, генеза, локализации эпилептического очага, вида, частоты и тяжести эпилептическ типа течения заболевания (прогредиентный, доброкачественный, ремиттирующий и прочее), объема и эффективности проводимой противоэп терапии, наличия резистентности к ней, длительности межприступного периода. Частота эпилептических приступов должна быть верифицирована в организации, оценка производится на протяжении календарного года, обязательным условием является наличие противоэпилептической терапии. Необходимо также учитывать наличие, структуру и степень выраженности личностных изменений, обусловленных болезнью, с психопатологического и патопсихологического уровня реагирования (аффективной (дисфории), психоорганической, психотической, невр психопатоподобной и другой), а также уровень социальной адаптации в основных сферах жизнедеятельности (производственной, семейн социально-средовой).						
5.7.1					Нарушение психических функций; МКФ: B 110 - 199	Легкие приступы до 3 в день, тяжелые - 1 раз в 2 месяца и реже; незначительная психопатологическая симптоматика без заметных изменений личности; отсутствие снижения или незначительное снижение интеллекта (IQ = 65 - 69 баллов), существенно не сказывающиеся на адаптации в основных сферах жизнедеятельности
5.7.2					Нарушение психических	Легкие приступы (3 - 4 в день)

					функций; МКФ: B 110 - 199	в сочетании с умеренными изменениями личности, умеренной патопсихологической симптоматикой; тяжелые приступы - 1 - 2 в месяц; выраженные дисфории - 1 раз и реже в месяц; сумеречные расстройства сознания или особые состояния сознания - 1 раз и реже в 1,5 месяца; эпилептический статус, серийные приступы - 1 раз в 3 месяца и/или умеренные изменения личности, умеренная патопсихологическая симптоматика; умеренное снижение интеллекта (IQ = 50 - 64 балла), затрудняющие адаптацию в основных сферах жизнедеятельности
5.7.3					Нарушения психических функций, функций пищеварительной системы, мочевыделительной функции МКФ: B 110 - 199, B 510 - 539, B 610 - 639	Легкие приступы 5 и более в день при наличии выраженной патопсихологической симптоматики и изменений личности, приводящие к дезадаптации; тяжелые приступы - 3 раза в месяц, сумеречные расстройства сознания или особые

						состояния сознания - 1 раз в месяц, выраженные дисфории - 2 - 3 раза в месяц, эпилептический статус, серийные приступы - 1 раз в 2 месяца и/или выраженная патопсихологическая симптоматика, выраженные изменения личности, симптоматика психотического регистра, выраженное снижение интеллекта (IQ = 35 - 49 баллов), нарушение контроля функции тазовых органов, приводящие к дезадаптации в основных сферах жизнедеятельности (IQ = 35 - 49)
5.7.4					Нарушения психических функций, функций пищеварительной системы, мочевыделительной функции; МКФ: B 110 - 199, B 510 - 539, B 610 - 639	Тяжелые припадки - 4 и более в месяц, 2 и более сумеречных расстройства сознания или особых состояния сознания, 4 и более эпизодов выраженной дисфории, 1 и более эпистатус в месяц в сочетании со значительно выраженной патопсихологической, психопатологической симптоматикой (в том числе психотического регистра), значительно выраженное

						снижение интеллекта (IQ < 34); отсутствие контроля функции тазовых органов, приводящие к полной дезадаптации в основных сферах жизнедеятельности с необходимостью постоянного ухода и надзора
6	Болезни нервной системы (класс VI) и поражения нервной системы, представленные в других классах			G00 - G99		
Примечание к пункту 6. Количественная оценка степени выраженности стойких нарушений функций организма граждан в возрасте 18 лет и старше, обусловленная з нервной системы, основывается преимущественно на оценке степени выраженности двигательных нарушений (параличи, парезы, атаксия, затрудняющих опору и передвижение, способность осуществлять простые и сложные виды движений, а также на оценке наличия и степени психических, речевых и языковых, сенсорных нарушений функций организма. Учитываются также и другие факторы патологического процесса: форма, тип и тяжесть течения заболевания, активность процесса, длительность и частота обострений, наличие и курабельность пароксизмальны распространенность патологического процесса, наличие осложнений, факторы клинического и реабилитационного прогноза.						
6.1		Последствия травм, отравлений и других воздействий		T90 - T98		

		внешних причин				
6.1.1			Последствия травм головы (последствия ушиба головного мозга) Последствия воспалительных заболеваний центральной нервной системы Последствия цереброваскулярных болезней	T90 G09 I69		
6.1.1.1					Нарушения психических, языковых, и речевых, сенсорных, нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций; МКФ: B 110 - 139, B 140 - 189, B 198, B 199, B 310 - 340, B 398, B 399, B 210 - 299, B 710 - 789	Незначительные нарушения статодинамических функций: легкий гемипарез, легкий парез, парапарез; легкий атактический синдром и другие легкие очаговые нарушения; незначительные нарушения психических, языковых и речевых функций (дизартрия, афазия), сенсорных функций
6.1.1.2					Нарушения психических, языковых и речевых, сенсорных, нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических)	Умеренные нарушения статодинамических функций: легкий тетрапарез, умеренный гемипарез; умеренный парапарез; умеренный атактический синдром и

					функций; МКФ: B 110 - 139, B 140 - 189, B 198, B 199, B 310 - 340, B 398, B 399, B 210 - 299, B 710 - 789	другие умеренные очаговые нарушения; умеренные нарушения психических, языковых и речевых функций (дизартрия, афазия), сенсорных функций
6.1.1.3					Нарушения психических, языковых и речевых, сенсорных, нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций, функций пищеварительной системы, нарушения мочевыделительной функции; МКФ: B 110 - 139, B 140 - 189, B 198, B 199, B 310 - 340, B 398, B 399, B 210 - 299; B 710 - 789, B 798, B 799, B 510 - 539, B 610 - 639	Выраженные нарушения статодинамических функций: умеренный тетрапарез, выраженный гемипарез, выраженный парапарез, выраженный парез; выраженный атактический синдром и другие выраженные очаговые нарушения; выраженные нарушения психических, языковых и речевых функций (дизартрия, афазия), сенсорных функций; нарушение контроля функции тазовых органов
6.1.1.4					Нарушения психических, языковых и речевых, сенсорных, нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций, функций пищеварительной системы,	Значительно выраженные нарушения статодинамической функции: значительно выраженный парапарез (либо параплегия), значительно выраженный гемипарез (либо плегия); выраженный/значительно

					нарушения мочевыделительной функции; МКФ: B 110 - 139, B 140 - 189, B 198, B 199, B 310 - 340, B 398, B 399, B 210 - 299; B 710 - 789, B 798, B 799, B 510 - 539, B 610 - 639	выраженный тетрапарез (тетраплегия); значительно выраженная статическая и динамическая атаксия (самостоятельное передвижение невозможно); значительно выраженные нарушения психических, языковых и речевых, сенсорных функций; отсутствие контроля функции тазовых органов. Вегетативное состояние
6.2		Наследственная атаксия		G11		
6.2.1			Врожденная непрогрессирующая атаксия Атаксия Фридрейха (ранняя мозжечковая атаксия) Мозжечковая атаксия с нарушением репарации ДНК Другая наследственная атаксия	G11.0 G11.01 G11.3 G11.8		
6.2.2					Нарушения психических,	Незначительные нарушения

					сенсорных, нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций, нарушения функций сердечно-сосудистой системы; МКФ: B 110 - 139, B 140 - 189, B 198, B 199, B 210 - 299, B 710 - 789, B 798, B 799, B 410 - 429	координации и равновесия, целевой моторики; незначительные легкие сенситивно-мозжечковые нарушения, выявляемые только при выполнении специальных тестов, не нарушающие адаптацию и функционирование человека. Незначительные нарушения функций организма
6.2.3					Нарушения психических, сенсорных, нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций, нарушения функций сердечно-сосудистой системы; МКФ: B 110 - 139, B 140 - 189, B 198, B 199, B 210 - 299, B 710 - 789, B 798, B 799, B 410 - 429	Умеренные нарушения координации и равновесия, целевой моторики; умеренные сенситивно-мозжечковые нарушения, выявляемые при выполнении обычных движений, нарушающие опору и передвижение. Умеренные нарушения функций организма
6.2.4					Нарушения психических, сенсорных, нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических)	Выраженные нарушения координации и равновесия, целевой моторики; выраженные сенситивно-мозжечковые

					функций, нарушения функций сердечно-сосудистой системы; МКФ: B 110 - 139, B 140 - 189, B 198, B 199, B 210 - 299, B 710 - 789, B 798, B 799, B 410 - 429	нарушения (значительно затрудняется передвижение, выполнение обычных движений). Выраженные нарушения функций организма
6.2.5					Нарушения психических, сенсорных, нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций, нарушения функций сердечно-сосудистой системы; МКФ: B 110 - 139, B 140 - 189, B 198, B 199, B 210 - 299, B 710 - 789, B 798, B 799, B 410 - 429	Значительно выраженные нарушения координации и равновесия, целевой моторики; значительно выраженные сенситивно-атактические нарушения. Значительно выраженные нарушения функций организма
6.3			Болезнь Штрюмпелля (наследственная спастическая параплегия) - изолированная и осложненная формы	G11.4		
6.3.1					Нарушения психических, сенсорных, нейромышечных, скелетных	Легкий парез нижних конечностей (снижение мышечной силы до 4 баллов)

					и связанных с движением (статодинамических) функций; МКФ: B 110 - 139, B 140 - 189, B 198, B 199, B 399, B 210 - 299; B 710 - 789, B 798, B 799	без ограничения объема активных движений, нарушения опоры и передвижения, без деформаций стоп и формирования контрактур. Незначительные нарушения функций организма
6.3.2					Нарушения психических, сенсорных, нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций; МКФ: B 110 - 139, B 140 - 189, B 198, B 199, B 399, B 210 - 299; B 710 - 789, B 798, B 799	Умеренный парез нижних конечностей (снижение мышечной силы до 3 баллов) с умеренным нарушением способности к передвижению, формирование деформации стоп, контрактур в суставах. Умеренные нарушения функций организма
6.3.3					Нарушения психических, сенсорных, нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций; МКФ: B 110 - 139, B 140 - 189, B 198, B 199, B 399, B 210 - 299; B 710 - 789, B 798, B 799	Выраженный парез нижних конечностей (снижение мышечной силы до 2 баллов) с выраженным нарушением способности к передвижению, с формированием деформации стоп, контрактур в суставах. Выраженные нарушения функций организма
6.4			Спинальные амиотрофии	G12		

6.4.1					Нарушения языковых и речевых, нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций, функций дыхательной системы, пищеварительной системы; МКФ: B 310 - 340, B 398; B 710 - 789, B 798, B 799, B 440 - 450, B 510 - 539	Периферический легкий тетрапарез, умеренный парапарез и/или умеренный парез проксимального отдела обеих нижних конечностей (снижение мышечной силы до 3 баллов). Умеренные бульбарные расстройства. Деформации скелета (сколиоз, кифосколиоз) с умеренными нарушениями функций дыхательной системы
6.4.2					Нарушения языковых и речевых, нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций, функций сердечно-сосудистой, дыхательной систем, функций пищеварительной системы, нарушения мочевыделительной функции; МКФ: B 310 - 340, B 398; B 710 - 789, B 798, B 799; B 410 - 429, B 440 - 450, B 510 - 539, B 610 - 639	Генерализация атрофического процесса: выраженный нижний парапарез, умеренный верхний парапарез. Деформации скелета (сколиоз, кифосколиоз) с выраженными нарушениями функций дыхательной и сердечно-сосудистой систем. Выраженные бульбарные расстройства. Нарушение функции тазовых органов
6.4.3					Нарушения языковых и	Генерализация атрофического

					речевых, нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций, функций сердечно-сосудистой, дыхательной систем, функций пищеварительной системы, нарушения мочевыделительной функции; МКФ: B 310 - 340, B 398; B 710 - 789, B 798, B 799; B 410 - 429, B 440 - 450, B 510 - 539, B 610 - 639	процесса: значительно выраженный периферический тетрапарез. Тяжелые деформации скелета (сколиоз, кифосколиоз), нарушения функций дыхательной и сердечно-сосудистой систем, достигающих значительно выраженной степени. Значительно выраженные бульбарные и псевдобульбарные нарушения. Отсутствие контроля функции тазовых органов
6.5		Экстрапирамидные и другие двигательные нарушения		G20 - G26		
6.5.1			Болезнь Паркинсона Вторичный паркинсонизм Паркинсонизм при болезнях, классифицированных в других рубриках.	G20 G21 G22		
6.5.2					Нарушения	Незначительные, легкие

					нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций; МКФ: B 710 - 789, B 798, B 799	моторные и немоторные симптомы паркинсонизма. 1 и 2 стадии болезни по шкале Хен-Яра. Шкала Шваба-Ингланда 90 - 100%
6.5.3					Нарушения нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций; МКФ: B 710 - 789, B 798, B 799	Умеренные моторные и/или немоторные симптомы паркинсонизма. 3 стадия болезни по шкале Хен-Яра. Шкала Шваба-Ингланда 70 - 80%
6.5.4					Нарушения нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций; МКФ: B 710 - 789, B 798, B 799	Выраженные моторные и/или немоторные симптомы паркинсонизма. Умеренные продолжительные флуктуации и болезненные дискинезии, частично или не контролируемые оптимальной консервативной терапией. 4 стадия болезни по шкале Хен-Яра. Шкала Шваба-Ингланда 50 - 60%. На период подбора режима программирования при глубокой стимуляции глубоких структур головного мозга; наличие осложнений после оперативного

						вмешательства, приводящих к выраженным нарушениям
6.5.5					Нарушения нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций МКФ: B 710 - 789, B 798, B 799	Значительно выраженные моторные и/или немоторные симптомы паркинсонизма. 5 стадия болезни по шкале Хен-Яра. Шкала Шваба-Ингланда 0 - 40%
6.6			Другие дегенеративные болезни базальных ганглиев Дистония Другие экстрапирамидные и двигательные нарушения. Экстрапирамидные и двигательные нарушения при болезнях, классифицированных в других рубриках	G23 G24 G25 G26		
6.6.1					Нарушения психических, нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций; МКФ: B 110 - 139, B 140 -	Легкие фокальные и генерализованные гиперкинезы не изменяющие физиологическое положение тела, общая целенаправленность

					189, B 710 - 789, B 798, B 799	движений и действий сохранена. Наличие незначительных нарушений психических функций
6.6.2					Нарушения психических, нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций; МКФ: B 110 - 139, B 140 - 189, B 710 - 789, B 798, B 799	Умеренные фокальные и генерализованные гиперкинезы, изменяющие физиологическое положение тела и нарушающие последовательность и целенаправленность движений и действий. Наличие незначительных/умеренных нарушений психических функций
6.6.3					Нарушения психических, нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций; МКФ: B 110 - 139, B 140 - 189, B 710 - 789	Выраженные фокальные и генерализованные гиперкинезы, с нарушением равновесия, последовательности и целенаправленности движений и действий. Наличие умеренных/выраженных нарушений психических функций
6.6.4					Нарушения психических,	Значительно выраженные

					нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций; МКФ: B 110 - 139, B 140 - 189, B 710 - 789, B 798, B 799	генерализованные гиперкинезы не контролируемые медикаментозным лечением, с фиксированным патологическим положением тела. Наличие выраженных/значительно выраженных нарушений психических функций
6.7		Демиелинизирующие болезни центральной нервной системы		G35 - G37		
6.7.1			Рассеянный склероз Другая форма острой диссеминированной демиелинизации. Другие демиелинизирующие болезни центральной нервной системы	G35 G36 G37		
6.7.1.1					Нарушения языковых и речевых, сенсорных, нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических)	Отсутствие признаков активности заболевания в соответствии с критериями, в том числе - по данным МРТ. Отсутствие или

					функций, нарушение функций пищеварительной системы, нарушения мочевыделительной функции; МКФ: B 310 - 340, B 398 - 399, B 210 - 299, B 710 - 789, B 798, B 799, B 510 - 539, B 610 - 639	незначительные нарушения функций организма (включая легкие атактические нарушения) в том числе - на фоне терапии ПИТРС
6.7.1.2					Нарушения языковых и речевых, сенсорных, нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций, нарушение функций пищеварительной системы, нарушения мочевыделительной функции; МКФ: B 310 - 340, B 398 - 399, B 210 - 299, B 710 - 789, B 798, B 799, B 510 - 539, B 610 - 639	Умеренные парезы верхних и/или нижних конечностей, умеренные бульбарные нарушения; умеренные атактические нарушения, частичная атрофия зрительных нервов с умеренными нарушениями сенсорных функций; умеренные нарушения функций тазовых органов, в том числе - на фоне терапии ПИТРС
6.7.1.3					Нарушения языковых и речевых, сенсорных, нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций, нарушение функций пищеварительной	Выраженные парезы верхних и/или нижних конечностей, выраженные бульбарные нарушения; выраженные атактические нарушения, нарушение контроля функции тазовых органов, в том числе -

					системы, нарушения мочевыделительной функции; МКФ: B 310 - 340, B 398 - 399, B 210 - 299, B 710 - 789, B 798, B 799, B 510 - 539, B 610 - 639	на фоне терапии ПИТРС
6.7.1.4					Нарушения языковых и речевых, сенсорных функций, нарушения нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций; нарушение функций пищеварительной системы, нарушения мочевыделительной функции; МКФ: B 310 - 340, B 398, B 399, B 210 - 299, B 710 - 789, B 798, B 799, B 510 - 539, B 610 - 639	Значительно выраженные парезы или параличи верхних и/или нижних конечностей; значительно выраженные бульбарные нарушения, атактические нарушения, отсутствие контроля функции тазовых органов, в том числе - на фоне терапии ПИТРС
6.8			Наследственная и идиопатическая невропатия	G60		
6.8.1					Нарушения нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических)	Легкий парез нижних конечностей без нарушения опоры и передвижения (снижение мышечной силы до

					функций, сенсорных функций (осязания; тактильной, болевой, температурной, вибрационной и других видов чувствительности); МКФ: B 250 - 299, B 710 - 789	4 баллов)
6.8.2					Нарушения нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций, сенсорных функций (осязания; тактильной, болевой, температурной, вибрационной и других видов чувствительности); МКФ: B 250 - 299, B 710 - 789	Умеренный парез нижних конечностей (снижение мышечной силы до 3 баллов); изменение походки ("степаж"); незначительная деформация стоп
6.8.3					Нарушения нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций, сенсорных функций (осязания; тактильной, болевой, температурной, вибрационной и других видов чувствительности);	Выраженный парез нижних конечностей (снижение мышечной силы до 2 баллов), деформация стоп, нарушающая опору и передвижение, нарушение координации движений

					МКФ: B 250 - 299, B 710 - 789	
6.9		Болезни нервно-мышечного синапса и мышц		G70 - G73		
6.9.1			Myasthenia gravis и другие нарушения нервно-мышечного синапса	G70		
6.9.1.1					Нарушения языковых и речевых, сенсорных, нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций, нарушение функций пищеварительной, дыхательной систем; МКФ: B 310 - 340, B 398, B 399, B 210 - 299, B 710 - 789, B 798, B 799, B 510 - 539, B 440 - 450	Локальные формы заболевания (глазная), генерализованная и бульбарная формы с незначительными нарушениями функций организма: полная компенсация при лечении АХЭП или АХЭП в сочетании с глюкокортикоидами или незначительная мышечная слабость и патологическая утомляемость, проявляющаяся только при многократных повторных движениях или длительном статическом напряжении отдельных групп мышц туловища, конечностей, окулярных и

						кранио-бульбарных мышц. Положительный результат тимэктомии, позволяющий контролировать заболевание, регресс симптомов
6.9.1.2					Нарушения языковых и речевых, сенсорных, нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций, нарушение функций пищеварительной, дыхательной систем; МКФ: B 310 - 340, B 398, B 399, B 210 - 299, B 710 - 789, B 798, B 799, B 510 - 539, B 440 - 450	Умеренно выраженная мышечная слабость и патологическая утомляемость мышц туловища и (или) проксимальных сегментов конечностей, кранио-бульбарных мышц на фоне базисной терапии с колебаниями и нарастанием симптомов в течение суток, усиливающаяся при физической нагрузке, с учетом удовлетворительного эффекта тимэктомии, приводящие к умеренным нарушениям функций организма
6.9.1.3					Нарушения языковых и речевых, сенсорных, нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций, нарушение функций пищеварительной, дыхательной систем;	Выраженная мышечная слабость и патологическая утомляемость мышц туловища и (или) проксимальных сегментов конечностей, кранио-бульбарных мышц на фоне недостаточно

					МКФ: B 310 - 340, B 398, B 399, B 210 - 299, B 710 - 789, B 798, B 799, B 510 - 539, B 440 - 450	эффективной базисной терапии, тимомтимэктомии и лучевой терапии (при злокачественной тимоме), приводящие к выраженным нарушениям функций организма
6.9.1.4					Нарушения языковых и речевых, сенсорных, нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций, нарушение функций пищеварительной, дыхательной систем; МКФ: B 310 - 340, B 398, B 399, B 210 - 299, B 710 - 789, B 798, B 799, B 510 - 539, B 440 - 450	Значительно выраженная мышечная слабость и патологическая утомляемость мышц туловища, конечностей, дыхательных и (или) кранио-бульбарных мышц (генерализованная форма), быстро прогрессирующее течение при неэффективной терапии, приводящие к значительно выраженному нарушению функций организма, что требует постоянного применения интубации трахеи с ИВЛ или без нее, использование зондового питания и необходимость в постоянной посторонней помощи и уходе
6.10			Первичные поражения мышц (мышечные дистрофии)	G71		

6.10.1					Нарушения нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций, функции сердечно-сосудистой системы; МКФ: B 710 - 789, B 410 - 429	Снижение мышечной силы до 4 баллов, активные движения в суставах верхних и/или нижних конечностей сохранены в полном объеме. Незначительные нарушения функций организма
6.10.2					Нарушения нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций, функции сердечно-сосудистой системы; МКФ: B 710 - 789, B 410 - 429	Снижение мышечной силы до 3 баллов, умеренное ограничение амплитуды активных движений в суставах верхних и (или) нижних конечностей, гипотрофия мышц тазового пояса и плечевого пояса. Умеренные нарушения функций организма
6.10.3					Нарушения психических, нарушения нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций, функции сердечно-сосудистой системы; МКФ: B 110 - 139, B 140 - 189, B 710 - 789, B 410 - 429	Снижение мышечной силы до 2 баллов, выраженное ограничение амплитуды активных движений верхних и (или) нижних конечностей; выраженная гипотрофия мышц тазового пояса и плечевого пояса. Выраженные нарушения функций организма

6.10.4					Нарушения психических, языковых и речевых, нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций, функций сердечно-сосудистой системы; МКФ: B 110 - 139, B 140 - 189, B 310 - 340, B 710 - 789, B 410 - 429	Снижение мышечной силы до 1 балла с невозможностью самостоятельного передвижения. Значительно выраженные нарушения функций организма
6.11		Церебральный паралич и другие паралитические синдромы		G80 - G83		
6.11.1			Детский церебральный паралич	G80		
6.11.1.1					Нарушения психических, языковых и речевых, сенсорных, нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций; МКФ: B 110 - 139, B 140 - 189, B 198, B 199, B 310 - 340; B 210 - 299, B 710 - 789, B 798, B 799	Незначительные нарушения статодинамических функций: легкий спастический парапарез, легкий гемипарез (мышечная сила 4 балла) с сохранением активных движений в суставах верхних и нижних конечностей в полном объеме, либо имеет место тугоподвижность или легкая контрактура суставов, легкая деформация стоп(ы)

						и/или кистей(ти) вследствие повышенного тонуса; незначительная гипотрофия мышц и укорочение конечности(ей). Незначительная туловищная (статическая) атаксия, легкая мышечная гипотония с незначительным переразгибанием в суставах, некоординированной походкой; незначительные нарушения мелкой и целевой моторики. Незначительный псевдобульбарный синдром, не затрудняющий фонацию и глотание; отсутствие нарушений, либо незначительные нарушения языковых и речевых функций (дизартрия). Незначительные нарушения психических функций (незначительное когнитивное снижение, IQ = 65 - 69 баллов)
6.11.1.2					Нарушения психических, языковых и речевых, сенсорных, нейромышечных, скелетных и связанных с движением	Умеренные нарушения статодинамических функций: легкий тетрапарез, умеренный спастический парапарез, умеренный гемипарез

					(статодинамических) функций; МКФ: B 110 - 139, B 140 - 189, B 198, B 199, B 310 - 340, B 210 - 299, B 710 - 789, B 798, B 799	(мышечная сила 3 балла) с умеренными контрактурами суставов, умеренной деформацией стоп(ы) и/или кистей(и); умеренной гипотрофией мышц и укорочением конечности. Умеренный спастико-гиперкинетический синдром: умеренные ассиметричные спастико-гиперкинетические парезы, активные движения в суставах умеренно ограничены (в большей степени вследствие гиперкинезов); Умеренная туловищная (статическая) атаксия, умеренная мышечная гипотония с переразгибанием в суставах, некоординированной походкой: в медленном темпе, затруднены сложные виды движений; умеренные нарушения мелкой и целевой моторики. Умеренный псевдобульбарный синдром (дизартрия, дисграфия, дислексия, дисфония,

						дисфагия) с нарушением фонации и глотания, с умеренными языковыми и речевыми нарушениями (дизартрия). Сочетание двигательных нарушений с умеренным когнитивным снижением и/или умеренным снижением интеллекта (IQ = 50 - 64 баллов)
6.11.1.3					Нарушения психических, языковых и речевых, сенсорных, нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций, нарушение функций пищеварительной системы, мочевыделительной функции; МКФ: B 110 - 139, B 140 - 189, B 198, B 199, B 310 - 340, B 210 - 299, B 710 - 789, B 798, B 799, B 510 - 539, B 610 - 639	Выраженные нарушения статодинамических функций: умеренный тетрапарез, выраженный спастический парапарез, выраженный гемипарез (мышечная сила 2 балла) с выраженными контрактурами суставов, с выраженной деформацией стоп(ы) и/или кистей(ти); с фиксированным порочным положением стоп и/или кистей, затрудняющим опору и передвижение, схват и удержание предметов. Выраженный спастико-гиперкинетический синдром: выраженные ассиметричные спастико-гиперкинетические

						парезы, значительно ограничивающие активные движения в суставах. Выраженная мышечная гипотония, туловищная (статическая) атаксия, препятствующая вертикализации, и самостоятельному передвижению. Выраженный псевдобульбарный синдром с нарушение фонации и глотания, выраженными языковыми и речевыми нарушениями (дизартрия). Сочетание двигательных нарушений с выраженным когнитивным снижением и/или снижением интеллекта до уровня умеренной умственной отсталости (IQ = 35 - 49 баллов). Нарушение контроля функции тазовых органов
6.11.1.4					Нарушения психических, языковых и речевых, сенсорных, нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических)	Значительно выраженные нарушения статодинамических функций: выраженный или значительно выраженный тетрапарез, нижний спастический

					функций, нарушение функций пищеварительной системы, мочевыделительной функции; МКФ: B 110 - 139, B 140 - 189, B 198, B 199, B 310 - 340, B 210 - 299, B 710 - 789, B 798, B 799, B 510 - 539, B 610 - 639	парапарез, значительно выраженный гемипарез или гемиплегия (мышечная сила 1 балл), нижняя параплегия (мышечная сила 0 баллов) с множественными комбинированными контрактурами суставов конечностей; фиксированным порочным положением стоп и/или кистей; нарушение координации движений и равновесия, значительно затрудняющих вертикализацию, опору и передвижение. Либо - отсутствие произвольных движений в конечностях, туловище, фиксированное патологическое положение тела (в положении лежа), с незначительными нецеленаправленными движениями (поворот набок с помощью). Значительно выраженный спастико-гиперкинетический синдром: выраженный или значительно выраженный спастический тетрапарез, значительно выраженные асимметричные

						спастико-гиперкинетические парезы, значительно выраженные комбинированные контрактуры в суставах конечностей; движения в суставах практически отсутствуют (в большей степени вследствие гиперкинезов), значительно выраженный атетоз и/или двойной атетоз и/или баллизм, торсионная дистония с невозможностью отсутствием вертикализации, опоры и передвижения. Значительно выраженная туловищная (статическая) атаксия, значительно выраженная динамическая атаксия, значительно выраженная мышечная гипотония, препятствующая точным движениям, схвату и удержанию предметов, формированию вертикальной позы и произвольных движений. Значительно выраженный псевдобульбарный синдром (отсутствие функций жевания, глотания, анартрия),

						отсутствие устной речи. Значительно выраженное когнитивное снижение и/или снижение интеллекта до уровня тяжелой или глубокой умственной отсталости (IQ < 34 баллов). Отсутствие контроля функции тазовых органов
6.12			Гемиплегия Параплегия и тетраплегия Другие паралегические синдромы	G80 G81 G82		
6.12.1					Нарушения нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций; МКФ: B 710 - 789	Верхние конечности: легкий (4 балла) парапарез, легкий дистальный или умеренный (3 балла) проксимальный парапарез, умеренный или выраженный монопарез в том числе дистального или проксимального отдела верхней конечности; Нижние конечности: легкий парапарез, легкий проксимальный или умеренный дистальный парапарез, умеренный или выраженный монопарез, в том числе дистального или

						проксимального отдела нижней конечности, приводящие к незначительному нарушению статодинамической функции
6.12.2					Нарушения нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций; МКФ: B 710 - 789	Верхние конечности: умеренный парапарез, умеренный дистальный, выраженный (2 балла) проксимальный парапарез, значительно выраженный (1 балл) монопарез, дистальная моноплегия; Нижние конечности: умеренный парапарез, выраженный дистальный, умеренный проксимальный парапарез, значительно выраженный монопарез, моноплегия, незначительный тетрарапарез; умеренный гемипарез (снижение мышечной силы до 3 баллов); легкий тетрапарез, приводящие к умеренному нарушению статодинамической функции
6.12.3					Нарушения нейромышечных, скелетных и связанных с движением	Верхние конечности: выраженный парапарез, выраженный дистальный,

					(статодинамических) функций; МКФ: B 710 - 789	значительно выраженный проксимальный парапарез; нижние конечности: выраженный парапарез, значительно выраженный дистальный, выраженный проксимальный парапарез; выраженный гемипарез (снижение мышечной силы до 2 баллов); умеренный тетрапарез, приводящие к выраженному нарушению статодинамической функции
6.12.4					Нарушения нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций; МКФ: B 710 - 789	Значительно выраженный гемипарез, значительно выраженный трипарез, выраженный тетрапарез, значительно выраженный парапарез рук, значительно выраженный проксимальный парапарез ног, параплегия рук, ног, гемиплегия, триплегия, тетраплегия (снижение мышечной силы до 1 балла) со значительно выраженными нарушениями статодинамической функции
7	Болезни глаза и его придаточного			H00 - H59		

	аппарата (класс VII)					

Примечание к пункту 7.
Количественная оценка степени выраженности стойких нарушений функций глаза и его придаточного аппарата, обусловленных заболеваниями, п
травм или дефектами, основывается на характере и степени выраженности нарушения зрительных функций, основные из которых: острота зрени
единицах (ед.) и поле зрения в градусах (°).
Состояние зрительных функций определяется с учетом ранжирования их показателей, содержащихся в МКБ-10. Степень нарушения органа зрения
по состоянию функции лучше видящего (или единственного) глаза с максимально переносимой коррекцией и с применением контрольных методов и
При необходимости углубленного обследования используются данные электрофизиологических и других специальных морфофункциональ
исследования (оптическая когерентная томография сетчатки, определение остроты зрения - вызванные зрительные потенциалы).
Учитываются также другие факторы патологического процесса: форма и стадия течения, активность процесса, время наступления зрительного деф
адаптации к нему, вид и особенности коррекции (очковая, контактная, интраокулярная).

7.1			Острота зрения			
7.1.1					Нарушение сенсорных функций (зрение); МКФ: B 210 - 229	Острота зрения (лучше видящим или единственного глаза в условиях максимальной переносимой коррекции) > 0,3
7.1.2					Нарушение сенсорных функций (зрение); МКФ: B 210 - 229	Острота зрения (лучше видящим или единственного глаза в условиях максимальной переносимой коррекции) коррекцией) более 0,1 до 0,3 (включительно)
7.1.3					Нарушение сенсорных функций (зрение); МКФ: B 210 - 229	Острота зрения (лучше видящим глазом видящим глазом с коррекцией) 0,1 - 0,05

7.1.4					Нарушение сенсорных функций (зрение); МКФ: B 210 - 229	Острота зрения (лучше видящим глазом с коррекцией) 0,04 - 0 Острота зрения (лучше видящего или единственного глаза с оптимальной коррекцией) 0 - 0,04
7.2			Концентрическое сужение полей зрения (по 8 основным меридианам от точки фиксации); контрольно со смещенным центром фиксации в темпоральную сторону на 15 градусов, кампиметрия			
7.2.1					Нарушение сенсорных функций (зрение); МКФ: B 210 - 229	Концентрическое сужение поля зрения, лучше видящего или единственного глаза от 60° до 40° (включительно) без абсолютных скотом в остаточных полях зрения.
7.2.2					Нарушение сенсорных функций (зрение); МКФ: B 210 - 229	Концентрическое сужение поля зрения, лучше видящего или единственного глаза менее 40° до 20° (включительно)
7.2.3					Нарушение сенсорных функций (зрение);	Концентрическое сужение поля зрения, лучше видящего

					МКФ: B 210 - 229	или единственного глаза менее 20° до 10° (включительно)
7.2.4					Нарушение сенсорных функций (зрение); МКФ: B 210 - 229	Концентрическое сужение поля зрения, лучше видящего или единственного глаза менее 10°
7.3			Скотомы в центральном поле зрения (град.)			
7.3.1					Нарушение сенсорных функций (зрение); МКФ: B 210 - 229	Относительные парацентральные несливные скотомы
7.3.2					Нарушение сенсорных функций (зрение); МКФ: B 210 - 229	Единичные, сливные абсолютные центральные скотомы до 5 градусов и сливные абсолютные парацентральные скотомы или кольцевидные скотомы при концентрическом сужении полей зрения лучше видящего или единственного глаза от 55 до 40 градусов (включительно)
7.3.3					Нарушение сенсорных функций (зрение); МКФ: B 210 - 229	Центральные абсолютные скотомы более 5 до 10 лучше видящего или единственного глаза

7.3.4					Нарушение сенсорных функций (зрение); МКФ: B 210 - 229	Центральные абсолютные скотомы более 10 лучше видящего или единственного глаза
8	Болезни уха и сосцевидного отростка (класс VIII)			H60 - H95		
Примечание к пункту 8. Количественная оценка степени выраженности стойких нарушений функций уха и сосцевидного отростка, обусловленных заболеваниями, последс или дефектами, основывается преимущественно на оценке характера и степени выраженности нарушения функции слуха (степени тугоухости) лучш (единственного) уха (по международной классификации тугоухости). Учитываются также и другие факторы патологического процесса: форма и с заболевания, время наступления слухового дефекта, степени адаптивности к нему, вид и особенности осложнений, сочетание с нарушением речи и функций и другие. При необходимости углубленного обследования используются данные электрофизиологических и других морфофункциональных методов исследования (аудиоимпедансометрия, отоакустическая эмиссия, вызванные слуховые потенциалы).						
8.1			Болезни уха и сосцевидного отростка (потеря слуха (глухота), тугоухость, за исключением профессионально обусловленных)	H60 - H95		
8.1.1					Нарушения сенсорных, языковых и речевых функций; МКФ: B 230 - 349 (слух), B 310 - 340	Врожденная или приобретенная в детстве глухота или тугоухость IV степени с речевыми нарушениями
8.1.2					Нарушение сенсорных	Тугоухость I - IV степени,

					функций; МКФ: B 230 - 349 (слух)	односторонняя Тугоухость I - II степени, двусторонняя
8.1.3					Нарушение сенсорных функций; МКФ: B 230 - 349 (слух)	Тугоухость III и IV степени, двусторонняя Глухота двусторонняя
8.1.4					Нарушения психических, сенсорных функций; МКФ: B 230 - 349 (слух), B 110 - 139, B 140 - 189	Глухонемота, сопровождающаяся психическими нарушениями (незначительными, умеренными, выраженными)
8.1.5						Глухонемота, сопровождающаяся значительно выраженными нарушениями психических функций
8.2			Профессионально обусловленная потеря слуха (глухота), тугоухость			
8.2.1					Нарушение сенсорных функций; МКФ: B 230 - 349 (слух)	Тугоухость I - III степени, двусторонняя
8.2.2					Нарушение сенсорных функций; МКФ: B 230 - 349 (слух)	Тугоухость IV степени, двусторонняя, глухота двусторонняя

8.3		Комбинированное нарушение зрения и слуха				
8.3.1			Слепоглухота			
8.3.1.1					Нарушение сенсорных функций; МКФ: B 210 - 229 (зрение), B 230 - 349 (слух)	Двусторонняя тугоухость III степени в сочетании с высокой степенью слабовидения (острота зрения лучше видящим глазом с максимально переносимой коррекцией 0,1 - 0,05)
8.3.1.2					Нарушение сенсорных функций; МКФ: B210 - 229 (зрение), B 230 - 349 (слух)	Высокая степень слабовидения (острота зрения (лучше видящим глазом с максимально переносимой коррекцией в пределах 0,1 - 0,05) в сочетании с глухотой
8.3.1.3					Нарушение сенсорных функций; МКФ: B210 - 229 (зрение), B 230 - 349 (слух)	Полная (тотальная) или практическая слепоглухота
8.3.1.4					Нарушение сенсорных функций; МКФ: B210 - 229 (зрение), B 230 - 349 (слух)	Полная (тотальная) или практическая слепота в сочетании с тугоухостью III - IV степени
9	Болезни системы			I00 - I99		

	кровообращения (класс IX) и патология с поражением преимущественно органов системы кровообращения, представленная в других классах					
Примечание к пункту 9. Количественная оценка степени выраженности стойких нарушений функций сердечно-сосудистой системы организма граждан в возрасте 18 л обусловленных болезнями системы кровообращения и патологией с поражением преимущественно органов системы кровообращения, основывает степени выраженности следующих клинико-функциональных проявлений: недостаточность кровообращения; гипертонический синдром, легочная степень нарушений сердечного ритма. Учитываются также и другие факторы патологического процесса: форма и тяжесть течения патологическ частота и тяжесть обострений, распространенность, включение органов-мишеней, наличие осложнений.						
9.1		Хронические ревматические болезни Другие болезни сердца		I05 - I09 I30 - I52		
9.1.1			Ревматические поражения митрального клапана Неревматические поражения аортального	I05 I06		

			клапана Неревматические поражения трехстворчатого клапана Сочетанное поражение митрального и аортального клапанов Другие ревматические болезни сердца Неревматические поражения митрального клапана Неревматические поражения аортального клапана Неревматические поражения трехстворчатого клапана Поражение клапана легочной артерии	I07 I08 I09 I34 I35 I36 I37		
9.1.1.1					Нарушение функций сердечно-сосудистой системы; МКФ: B 410 - 429	Ревматические и неревматические болезни клапана/клапанов сердца, клапана легочного ствола; ревматический миокардит, эндокардит и перикардит без

						признаков воспалительного процесса, с незначительными нарушениями функций сердечно-сосудистой системы (стенокардия I, II ФК, легкие нарушения сердечного ритма, снижение сердечного выброса) с ХСН 0 или I стадии
9.1.1.2					Нарушение функций сердечно-сосудистой системы; МКФ: B 410 - 429	Ревматические и неревматические болезни клапана/клапанов сердца; клапана легочного ствола; ревматический миокардит, эндокардит и перикардит активного течения, с умеренными нарушениями функций сердечно-сосудистой системы (стенокардия III ФК, легочная гипертензия 2-й степени, умеренные нарушения сердечного ритма, снижение сердечного выброса) с ХСН IIA стадии
9.1.1.3					Нарушение функций сердечно-сосудистой системы; МКФ: B 410 - 429	Ревматические и неревматические болезни клапана/клапанов сердца; клапана легочного ствола; ревматический миокардит, эндокардит и перикардит

						активного течения, с выраженными нарушениями функций сердечно-сосудистой системы (легочная гипертензия 3-й степени, стенокардия III ФК, тяжелые нарушения сердечного ритма, снижение ФВ левого желудочка менее 30%) с ХСН IIБ стадии
9.1.1.4					Нарушение функций сердечно-сосудистой системы; МКФ: B 410 - 429	Ревматические и неревматические болезни клапана/клапанов сердца; клапана легочного ствола; ревматический миокардит, эндокардит и перикардит активного течения, со значительно выраженными нарушениями функций сердечно-сосудистой системы (легочная гипертензия 3-й степени, стенокардия IV ФК, тяжелые нарушения сердечного ритма, снижение ФВ левого желудочка менее 30%) с ХСН III стадии
9.2		Болезни, характеризующиеся повышенным кровяным		I10 - I15		

		давлением				
9.2.1					Нарушение функций сердечно-сосудистой системы; МКФ: B 410 - 429	Артериальная гипертензия 1 - 3 степени, гипертоническая болезнь II стадии без нарушения функций органов-мишеней.
9.2.2					Нарушения функций сердечно-сосудистой системы, мочевыделительной функции, нарушение психических, сенсорных функций; МКФ: B 410 - 429, B 610 - 639, B 110 - 139, B 140 - 189, B 198, B 199, B 210 - 299	Артериальная гипертензия 1 - 3 степени, гипертоническая болезнь III стадии с умеренными нарушениями функций органов-мишеней
9.2.3					Нарушения функций сердечно-сосудистой системы, мочевыделительной функции, нарушение психических, сенсорных функций; МКФ: B 410 - 429, B 610 - 639, B 110 - 139, B 140 - 189, B 198, B 199, B 210 - 299	Артериальная гипертензия 1 - 3 степени, гипертоническая болезнь III стадии с выраженными нарушениями функций органов-мишеней
9.2.4					Нарушения функций	Артериальная гипертензия 1 -

					сердечно-сосудистой системы, мочевыделительной функции, нарушение психических, сенсорных функций; МКФ: B 410 - 429, B 610 - 639, B 110 - 139, B 140 - 189, B 198, B 199, B 210 - 299	3 степени, гипертоническая болезнь III стадии со значительно выраженными нарушениями функций органов-мишеней
9.3		Ишемическая болезнь сердца		I20 - I25		
9.3.1			Стенокардия	I20		
9.3.1.1					Нарушение функций сердечно-сосудистой системы; МКФ: B 410 - 429	Незначительные нарушения функции сердечно-сосудистой системы: стенокардия или безболевая ишемия миокарда I, II ФК (75 - 100 Вт); ХСН 0 или I стадии
9.3.1.2					Нарушение функций сердечно-сосудистой системы; МКФ: B 410 - 429	Умеренные нарушения функции сердечно-сосудистой системы: стенокардия или безболевая ишемия миокарда, ФК III (50 Вт) при наличии ХСН I, II А стадии
9.3.1.3					Нарушения функций сердечно-сосудистой системы,	Выраженные нарушения функции сердечно-сосудистой системы: стенокардия или

					мочевыделительной функции; МКФ: B 410 - 429, B 610 - 639	безболевая ишемия миокарда ФК III (50 Вт) при наличии ХСН IIБ стадии
9.3.1.4					Нарушения функций сердечно-сосудистой системы, мочевыделительной функции; МКФ: B 410 - 429, B 610 - 639	Значительно выраженные нарушения функции сердечно-сосудистой системы: стенокардия и безболевая ишемия ФК IV (25 Вт) при наличии ХСН IIБ или III стадии
9.4			Хроническая ишемическая болезнь сердца Предсердно-желудочковая (атриовентрикулярная) блокада и блокада левой ножки пучка (Гиса) Сердечная недостаточность Кардиомиопатия Пароксизмальная тахикардия Фибрилляция и трепетание предсердий Другие нарушения	I25 I44 I50 I42 I47 I48 I49		

			сердечного ритма Нарушения системы кровообращения после процедур, не классифицированные в других рубриках Наличие сердечных и сосудистых имплантатов и трансплантатов Последствия травмы внутригрудных органов Врожденные аномалии (пороки развития) системы кровообращения	I97 Z95 T91.4 Q20 - Q28		
9.4.1					Нарушение функций сердечно-сосудистой системы; МКФ: B 410 - 429	Незначительные нарушения функции сердечно-сосудистой системы: ХСН I стадии.
9.4.2					Нарушение функций сердечно-сосудистой системы; МКФ: B 410 - 429	Умеренные нарушения функции сердечно-сосудистой системы: ХСН IIA стадии
9.4.3					Нарушение функций сердечно-сосудистой системы; МКФ: B 410 - 429	Выраженные нарушения функции сердечно-сосудистой системы: ХСН IIБ стадии

9.4.4					Нарушение функций сердечно-сосудистой системы; МКФ: B 410 - 429	Значительно выраженные нарушения функции сердечно-сосудистой системы: ХСН III стадии
9.5			Наличие трансплантированного сердца Наличие трансплантированных сердца и легкого	Z94.1 Z94.3		
Первичное освидетельствование						
9.5.1					Нарушения психических функций, функций сердечно-сосудистой, дыхательной систем, системы крови и иммунной системы; МКФ: B 110 - 139, B 140 - 189, B 198, B 199, B 410 - 429, B 440 - 449, B 430 - 439	Состояние после трансплантации сердца или одновременно сердца и легкого в течение первых 2 лет
9.5.2 Повторное освидетельствование (после 2-х летнего наблюдения)						
9.5.2.1					Нарушения психических функций, функций сердечно-сосудистой, дыхательной систем, системы крови и иммунной системы;	По истечении 2-летнего срока при наличии осложнений с умеренными нарушениями функций организма

					МКФ: B 110 - 139, B 140 - 189, B 198, B 199, B 410 - 429, B 440 - 449, B 430 - 439	
9.5.2.2					Нарушения психических функций, функций сердечно-сосудистой, дыхательной систем, системы крови и иммунной системы; МКФ: B 110 - 139, B 140 - 189, B 198, B 199, B 410 - 429, B 440 - 449, B 430 - 439	По истечении 2-летнего срока при наличии осложнений с выраженными нарушениями функций организма
9.5.2.3					Нарушения психических функций, функций сердечно-сосудистой, дыхательной систем, системы крови и иммунной системы; МКФ: B 110 - 139, B 140 - 189, B 198, B 199, B 410 - 429, B 440 - 449, B 430 - 439	По истечении 2-летнего срока при наличии осложнений со значительно выраженными нарушениями функций организма
9.6			Первичная легочная гипертензия Другие уточненные формы легочно-сердечной недостаточности	I27.0 I27.8 I27.9		
9.6.1					Нарушение функций	Незначительные нарушения

					сердечно-сосудистой, дыхательной систем; МКФ: B 410 - 429, B 440 - 450	функций организма на фоне эффективной специфической терапии: легочная гипертензия ФК I
9.6.2					Нарушение функций сердечно-сосудистой, дыхательной систем; МКФ: B 410 - 429, B 440 - 450	Умеренные нарушения функций организма на фоне специфической терапии: легочная гипертензия ФК II
9.6.3					Нарушение функций сердечно-сосудистой, дыхательной системы; МКФ: B 410 - 429, B 440 - 450	Выраженные нарушения функций организма на фоне специфической терапии: легочная гипертензия ФК III
9.6.4					Нарушение функций сердечно-сосудистой, дыхательной системы; МКФ: B 410 - 429, B 440 - 450	Значительно выраженные нарушения функций организма на фоне специфической терапии: легочная гипертензия ФК IV
9.7		Болезни артерий, артериол и капилляров		I70 - I79		
9.7.1			Атеросклероз Другие болезни периферических сосудов (хроническая артериальная	I70 I73		

			недостаточность, облитерирующий артериит сосудов конечностей, а также состояния после реваскуляризации)			
9.7.1.1					Нарушения функций сердечно-сосудистой системы, нарушения нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций; МКФ: B 410 - 429, B 710 - 789	I, II А степень ишемии при наличии сегментарных окклюзий или стенозов (более 65%) артерий конечностей, без клинических проявлений. Лодыжечно-плечевой индекс (ЛПИ) - 0,75 и более. После хирургической реваскуляризации при полном восстановлении кровообращения (компенсации кровообращения)
9.7.1.2					Нарушения функций сердечно-сосудистой системы, нарушения нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций; МКФ: B 410 - 429, B 710 - 789	IIБ степень ишемии при наличии сегментарных окклюзий или стенозов артерий (свыше 65%), ЛПИ менее 0,75 - 0,25 После хирургической реваскуляризации с сохраняющимся дистальным блоком, с субкомпенсацией кровообращения

9.7.1.3					Нарушения функций сердечно-сосудистой, дыхательной систем; нарушения нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций; МКФ: B 410 - 429, B 440 - 449, B 710 - 789	III или IV степень ишемии, ЛПИ менее 0,25. После хирургической реваскуляризации с сохраняющимся дистальным блоком, с ограниченными трофическими нарушениями (язва, некроз), декомпенсацией кровообращения; Ампутационные культи бедра/голени одной конечности и IIБ, III степенью ишемии другой конечности; при наличии медицинских противопоказаний для протезирования; ишемия культи бедра; при сопутствующих заболеваниях с выраженными нарушениями функций организма (ХСН IIБ, III стадии, ДН III стадии)
9.7.1.4					Нарушения функций сердечно-сосудистой системы, нарушения нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций; МКФ: B 410 - 429, B 710 - 789	III или IV степень ишемии, включая двусторонние трофические нарушения, ЛПИ менее 0,25 при наличии противопоказаний для оперативных вмешательств. Ампутационные культи обеих бедер; пороки или болезни культей; при невозможности

						пользования протезами из-за сопутствующих заболеваний; ишемии культей
9.8			Аневризма и расслоение аорты Другие формы аневризмы	I71 I72		
9.8.1					Нарушение функций сердечно-сосудистой системы; МКФ: B 410 - 429	Незначительное локальное расширение сосуда ("малые аневризмы"); после имплантации стент-графтов с полной компенсацией кровообращения. Отсутствие или незначительные нарушения функций организма
9.8.2					Нарушение функций сердечно-сосудистой системы, нарушения нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций; МКФ: B 410 - 429, B 710 - 789	Наличие "большой" (более 5 см) аневризмы аорты и/или крупных артерий таза с клиническими проявлениями при наличии медицинских противопоказаний к хирургическому лечению. После резекции "больших" аневризм, протезирования аорты и крупных артерий таза или имплантации стент-графтов с субкомпенсацией кровообращения

9.8.3					Нарушения функций сердечно-сосудистой системы, нарушения нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций; МКФ: B 410 - 429, B 710 - 789	Крупные аневризмы брюшной аорты и/или крупных артерий таза при наличии медицинских противопоказаний к хирургическому лечению; После резекции "больших" аневризм, протезирования аорты и крупных артерий таза или имплантации стент-графтов с послеоперационными осложнениями и декомпенсацией кровообращения
9.9		Болезни вен, лимфатических сосудов и лимфатических узлов, не классифицированные в других рубриках, проявляющиеся хронической венозной недостаточностью		I80 - I88		
9.9.1					Нарушение функций сердечно-сосудистой системы;	Хронические заболевания вен, соответствующие 2 - 3 классу клинических проявлений

					МКФ: B 410 - 429	международной классификации хронических болезней вен
9.9.2					Нарушения функций сердечно-сосудистой системы, нарушения нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций; МКФ: B 410 - 429, B 710 - 789	Хронические заболевания вен с язвенным дефектом со значительными трофическими нарушениями на одной конечности или язвенный дефект без значительной продукции отделяемого секрета на обеих конечностях, соответствующих 4 - 5 классу клинических проявлений международной классификации хронических болезней вен Двустороннее поражение со значительными трофическими нарушениями, без язвенных дефектов, соответствующих 4 - 5 классу клинических проявлений международной классификации хронических болезней вен с умеренными нарушениями статодинамических функций
9.9.3					Нарушение функций сердечно-сосудистой системы, нарушения нейромышечных, скелетных	Хронические заболевания вен с язвенными дефектами со значительной продукцией отделяемого секрета и

					и связанных с движением (статодинамических) функций; МКФ: B 410 - 429, B 710 - 789	трофическими нарушениями на обеих нижних конечностях, соответствующих 4 - 6 классу клинических проявлений международной классификации хронических болезней вен с выраженными нарушениями статодинамических функций
9.10			Лимфоотек, не классифицированный в других рубриках (лимфедема)	I89.0		
9.10.1					Нарушение функций сердечно-сосудистой системы, нарушения нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций; МКФ: B 410 - 429, B 710 - 789, B 798, B 799	Лимфедема ХЛН I степени с увеличением объема конечности (больше чем на 3 см) с незначительными нарушениями функций организма
9.10.2					Нарушения функций сердечно-сосудистой системы, нарушения нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций;	Лимфедема с ХЛН II степени (увеличением объема на 4 - 6 см) обеих нижних конечностей или III степени (увеличение объема на 6 - 10 см) одной конечности со значительными трофическими

					МКФ: B 410 - 429, B 710 - 789, B 798, B 799	нарушениями, с умеренными нарушениями функций организма
9.10.3					Нарушения функций сердечно-сосудистой системы, нарушения нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций; МКФ: B 410 - 429, B 710 - 789, B 798, B 799	Лимфедема с ХЛВН III, IV степени обеих нижних конечностей со значительными трофическими нарушениями, значительной продукцией отделяемого секрета, с выраженными осложнениями и нарушениями функций организма
10	Болезни органов дыхания (класс X) и патология с поражением преимущественно органов дыхания, представленная в других классах болезней			J00 - J99		
10.1			Хронические болезни нижних дыхательных путей (исключая астму) Болезни легкого,	J40 - J47 J60 - J70		

			вызванные внешними агентами			
			Другие респираторные болезни, поражающие главным образом интерстициальную ткань	J80 - J84		
			Гнойные и некротические состояния нижних дыхательных путей	J85 - J86		
			Другие болезни органов дыхания	J95 - J99		
			Единственное легкое (врожденное, после пульмонэктомии)	Z92.4		
			Саркоидоз	D86		
			Врожденные аномалии (пороки развития) органов дыхания	Q 30 - Q 34		
Примечание к подпункту 10.1. Степень тяжести дыхательной недостаточности оценивается исходя из газометрических показателей - парциального давления кислорода кр сатурации крови кислородом (SaO_2): ДН I степени - PaO_2 79 - 60 мм.рт.ст, SaO_2 - 90 - 94%; ДН II степени - PaO_2 59 - 55 мм.рт.ст., SaO_2 - 89 - 85%; ДН PaO_2 < 55 мм.рт.ст., SaO_2 < 85%. Учитываются также и другие (клинические) факторы патологического процесса: форма и тяжесть течения, наличие и частота обострений, объем и эф базовой терапии, распространенность патологического процесса, включение органов-мишеней, необходимость подавления иммунитета, наличие осл						
10.1.1					Нарушение функции дыхательной системы;	Легкая или среднетяжелая форма течения заболевания,

					МКФ: B 440 - 449	последствия оперативных вмешательств, с бронхиальной обструкцией на фоне базисной терапии (GOLD 1: ОФВ1/ФЖЕЛ < 70%, ОФВ1 >= 80%) без хронической дыхательной недостаточности (ДН 0) либо с признаками ДН I степени
10.1.2					Нарушения функций дыхательной системы, сердечно-сосудистой системы, нарушение психических функций; МКФ: B 410 - 429, B 440 - 449, B 110 - 139, B 140 - 189, B 198, B 199	Среднетяжелая форма течения заболевания, последствия оперативных вмешательств, с бронхиальной обструкцией на фоне базисной терапии (GOLD 2: ОФВ1/ФЖЕЛ < 70%, 50% >= ОФВ1 < 80%), ДН II степени; преходящей или постоянной легочной гипертензией (ХСН 0 или ХСН 1 стадии)
10.1.3					Нарушения функций дыхательной системы, сердечно-сосудистой системы, нарушение психических функций; МКФ: B 410 - 429, B 440 - 449, B 110 - 139, B 140 - 189, B 198, B 199	Среднетяжелая и тяжелая форма течения заболевания, последствия оперативных вмешательств, с бронхиальной обструкцией на фоне базисной терапии (GOLD 3: ОФВ1/ФЖЕЛ < 70%, 30% >= ОФВ1 < 50%) с ДН II, III степени, ХСН IIA стадии

10.1.4					Нарушения функций дыхательной системы, сердечно-сосудистой системы, нарушение психических функций; МКФ: B 410 - 429, B 440 - 449; B 110 - 139, B 140 - 189, B 198, B 199	Тяжелая форма течения заболевания, последствия оперативных вмешательств с бронхиальной обструкцией (GOLD 4: ОФВ1/ФЖЕЛ < 70%, ОФВ1 < 30%), наличие осложнений, ДН III степени, ХСН IIБ, III стадии
10.2			Астма	J45		
10.2.1					Нарушение функции дыхательной системы; МКФ: B 410 - 429	Незначительные нарушения функции дыхательной системы: легкое или среднетяжелое течение заболевания (на фоне базисной терапии низкими или средними дозами ингаляционных кортикостероидов), ДН 0 или ДН I стадии
10.2.2					Нарушения функций дыхательной и сердечно-сосудистой систем; МКФ: B 410 - 429, B 440 - 449	Среднетяжелое течение заболевания (на фоне базисной терапии средними дозами ингаляционных кортикостероидов), ДН II степени с преходящей или постоянной легочной гипертензией (ХСН 0 или ХСН 1 стадии)
10.2.3					Нарушение функций	Тяжелое течение заболевания

					дыхательной, сердечно-сосудистой систем, нарушение психических функций; МКФ: B 410 - 429, B 440 - 449, B 110 - 139, B 140 - 189, B 198, B 199	(на фоне базисной терапии высокими дозами ингаляционных кортикостероидов) с ДН II, III степени, ХСН II А стадии
10.2.4					Нарушение функции дыхательной, сердечно-сосудистой систем, нарушение психических функций; МКФ: B 410 - 429, B 440 - 449, B 110 - 139, B 140 - 189, B 198, B 199	Тяжелое течение заболевания на фоне базисной терапии с ДН III степени, ХСН IIБ и III стадии
10.3			Наличие трансплантированного легкого	Z94.2		
10.3.1					Нарушение функций дыхательной, сердечно-сосудистой систем, системы крови и иммунной системы; МКФ: B 440 - 450, B 410 - 429, B 430 - 439	При первичном освидетельствовании после трансплантации легкого в течение первых 2 лет
10.3.2						При повторном освидетельствовании по истечении 2-летнего срока после трансплантации легких

						при наличии осложнений с умеренными нарушениями функций организма.
10.3.3						По истечении 2-летнего срока после трансплантации легких при наличии осложнений с выраженными нарушениями функций организма
10.3.4					Нарушения психических функций, функций сердечно-сосудистой системы, дыхательной системы, системы крови и иммунной системы; МКФ: B 110 - 139, B 140 - 189, B 198, B 199, B 410 - 429, B 440 - 449, B 430 - 439	По истечении 2-летнего срока после трансплантации легких при наличии осложнений со значительно выраженными нарушениями функций организма
10.4			Респираторные нарушения после медицинских процедур, не классифицированные в других рубриках	J95		
10.4.1					Нарушения функций дыхательной системы, языковых и речевых функций; МКФ: B 440 - 449, B 310 - 340, B 398, B 399	Наличие функционирующей постоянной трахеостомы, сохранная либо малоразборчивая речь. ДН 0 или ДН I степени

10.4.2					Нарушения функций дыхательной системы, языковых и речевых функций; МКФ: B 440 - 449, B 310 - 340, B 398, B 399	Наличие функционирующей постоянной трахеостомы с выраженными нарушениями языковых и речевых функций, вплоть до потери экспрессивной речи, наличием ДН II или ДН III степени и других осложнений
11	Болезни органов пищеварения (класс XI) и патология с поражением преимущественно органов пищеварения, представленная в других классах болезней			K00 - K93		
Примечание к пункту 11. Количественная оценка степени выраженности стойких нарушений функций пищеварительной системы организма граждан в возрасте 18 л обусловленных заболеваниями, последствиями травм или дефектами, основывается на оценке формы и тяжести заболевания, наличия и частоты распространенности патологического процесса, включения органов-мишеней, наличия осложнений, а также на данных лабораторных и инстр методов исследования.						
11.1		Болезни полости рта, слюнных желез и челюстей		K00 - K14		

		Другие врожденные аномалии (пороки развития) органов пищеварения		Q38 - 45		
11.1.1			Челюстно-лицевые аномалии (включая аномалии прикуса) Расщелина губы и неба (заячья губа и волчья пасть)	K07 Q35 - Q37		
11.1.1.1					Нарушения функций пищеварительной системы, языковых и речевых функций; МКФ: B 510 - 539, B 310 - 340, B 398, B 399	Последствия комплексного лечения челюстно-лицевых аномалий, врожденной расщелины губы, мягкого и твердого неба в виде незначительных нарушений языковых речевых функций и функций пищеварительной системы
11.1.1.2					Нарушения функций пищеварительной системы, языковых и речевых функций; МКФ: B 510 - 539, B 310 - 340, B 398, B 399	Утрата части нижней или верхней челюсти, контрактура челюсти, с нарушением структуры носа, придаточной пазухи (пазух); последствия перенесенных оперативных вмешательств по поводу врожденной расщелины губы, мягкого и твердого неба с

						умеренными нарушениями нарушений языковых речевых функций и функций пищеварительной системы
11.2		Болезни пищевода, желудка и двенадцатиперстной кишки Другие болезни органов пищеварения Другие врожденные аномалии органов пищеварения		K20 - K31 K90 - 93 Q38 - 45		
11.2.1			Врожденные аномалии (пороки развития) пищевода Приобретенное отсутствие других отделов пищеварительного тракта (пищевода или его части) Наличие другого уточненного функционального	Q39 Z90.4 Z96.8		

			имплантата (пищевода, замена пищевода) Непроходимость пищевода	K22		
11.2.1.1					Нарушение функций пищеварительной системы; МКФ: B 510 - 539	Незначительное нарушение функций пищеварительной системы после реконструктивных операций на пищеводе
11.2.1.2					Нарушения функций пищеварительной, эндокринной системы и метаболизма, системы крови и иммунной системы; МКФ: B 510 - 539, B 540 - 559, B 430 - 439	Умеренное нарушение функций организма после реконструктивных операций на пищеводе
11.2.1.3					Нарушения функций пищеварительной, эндокринной системы и метаболизма, системы крови и иммунной системы; МКФ: B 510 - 539, B 540 - 559, B 430 - 439	Выраженное нарушение функции пищеварительной системы после реконструктивных операций на пищеводе
11.2.2			Другие врожденные аномалии (пороки развития) верхней части пищеварительного тракта	Q40		

			Врожденные отсутствие, атрезия и стеноз тонкого и толстого кишечника Приобретенное отсутствие части желудка Приобретенное отсутствие других отделов пищеварительного тракта Синдромы оперированного желудка Состояние, связанное с наложением кишечного анастомоза	Q41 - Q42 Z90,3 Z90.4 K91.1 Z98.0		
11.2.2.1					Нарушение функций пищеварительной системы; МКФ: B 510 - 539	Наличие легкого синдрома оперированного желудка или кишечника (демпинг-синдром, синдром приводящей петли, короткой кишки и другие синдромы) без потери массы тела, незначительные нарушения внешнесекреторной функции поджелудочной железы - 100 - 200 мкг\г, незначительные нарушения - уровень компенсации (гликированный гемоглобин HbA1c < 6,5%;

						гликемия натощак 4 - 8 ммоль\л)
11.2.2.2					Нарушения функций пищеварительной, эндокринной системы и метаболизма, системы крови и иммунной системы; МКФ: B 510 - 539, B 540 - 559, B 430 - 439	Наличие средней тяжести синдрома оперированного желудка или кишечника (демпинг-синдром, синдром приводящей петли, короткой кишки и другие синдромы) с мальдигестией и мальабсорбцией, умеренными нарушениями метаболизма, наличие экзокринной недостаточности по фекальной эластазе (от 100 до 200 мкг/г) на фоне заместительной терапии, умеренные нарушения внешнесекреторной функции поджелудочной железы 60 - 100 мкг\г; умеренные нарушения эндокринной недостаточности (HbA1c < 7,5 - 9% гликемия более 8 ммоль\л) с учетом нутритивного статуса.
11.2.2.3					Нарушения функций пищеварительной, эндокринной системы и метаболизма, системы крови и иммунной системы;	Наличие тяжелого синдрома оперированного желудка или кишечника (демпинг-синдром, синдром приводящей петли, короткой кишки и другие

					МКФ: B 510 - 539, B 540 - 559, B 430 - 439	синдромы) с выраженной мальдигестией, мальабсорбцией и нарушениями метаболизма, наличие экзокринной недостаточности по фекальной эластазе (менее 100 мкг/г) на фоне заместительной терапии; выраженные нарушения внешнесекреторной функции поджелудочной железы - менее 50 мкг\г; выраженные нарушения HbA1c более 9%; гликемия более 9 ммоль\л) с учетом нутритивного статуса
11.3		Неинфекционный энтерит и колит		K50 - K52		
11.3.1			Болезнь Крона (регионарный энтерит) Язвенный колит Другие неинфекционные гастроэнтериты и колиты	K50 K51 K52		
11.3.1.1					Нарушение функции пищеварительной системы; МКФ: B 510 - 539	Хроническое течение заболевания (рецидив воспалительного процесса до 2 раз в год), клиниколабораторная и/или

						эндоскопическая ремиссия (1 год и более) с отсутствием клинических симптомов заболевания, лабораторных и эндоскопических признаков воспалительной активности, либо с минимальной активностью процесса, в том числе на фоне постоянного приема противовоспалительной терапии, отсутствие или незначительно выраженные внекишечные проявления
11.3.1.2					Нарушения функций пищеварительной системы, системы крови и иммунной системы; МКФ: B 510 - 539, B 430 - 439	Рецидивирующее течение (обострения 2 - 3 раза в год); хроническое непрерывное течение заболевания (левосторонний колит, терминальный илеит, в том числе в сочетании с поражением толстой кишки) клиниколабораторная и/или эндоскопическая умеренная активность заболевания на фоне проведения базисной терапии, с умеренными нарушениями функций пищеварительной системы; наличием кишечных осложнений (стриктуры,

						межкишечные и прямокишечные свищи, ректовагинальные свищи), внекишечных проявлений умеренной тяжести, состояние после хирургического лечения с формированием стомы или тонкокишечного резервуара
11.3.1.3					Нарушения функций пищеварительной, сердечно-сосудистой системы; системы крови и иммунной системы, эндокринной системы и метаболизма; нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций, нарушения психических функций; МКФ: B 510 - 539, B 410 - 429, B 430 - 439, B 710 - 789, B 110 - 139, B 140 - 189, B 198, B 199, B 540 - 559	Рецидивирующее течение (обострения 4 - 5 раз год); хроническое непрерывное течение заболевания с поражением всего кишечника (панколит, распространенный илеит) клинико-лабораторная и/или эндоскопическая выраженная активность процесса на фоне проведения базисной терапии; свищевая, стенозирующая формы заболевания, а также наличие инфильтрата, ведущие к выраженным нарушениям функций пищеварительной системы; наличием стойких локальных и внекишечных проявлений средней тяжести, необходимость проведения постоянной цитостатической и/или биологической терапии, терапии селективными

						иммунодепрессантами
11.3.1.4					Нарушения функций пищеварительной, сердечно-сосудистой системы, системы крови и иммунной системы, нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций, нарушения психических функций; эндокринной системы и метаболизма; МКФ: B 510 - 539, B 410 - 429, B 430 - 439, B 710 - 789, B 110 - 139, B 140 - 189, B 198, B 199, B 540 - 559	Терминальная стадия заболевания с тотальным поражением кишечника, значительно выраженными нарушениями пищеварения (мальабсорбция и малдигестия тяжелой степени, кахексия), других органов и систем организма при неэффективности базисной терапии, малигнизации, последствиях массивной резекции кишечника
11.4		Другие болезни кишечника		K55 - K63		
11.4.1			Кишечные сращения (спайки) с непроходимостью Брюшинные спайки	K56.5 K66.0		
11.4.1.1					Нарушение функции пищеварительной системы; МКФ: B 510 - 539	Спаечная болезнь с редкими (1 - 4 раза в год) приступами кишечной непроходимости, купирующимися

						консервативно (в амбулаторных условиях)
11.4.1.2					Нарушения функций пищеварительной, эндокринной системы и метаболизма, системы крови и иммунной системы МКФ: B 510 - 539, B 540 - 559, B 430 - 439	Спаечная болезнь с приступами кишечной непроходимости 5 и более раз в год, купирующимися консервативными методами терапии в условиях стационара или требующие оперативного вмешательства
11.4.1.3					Нарушения функций пищеварительной, эндокринной системы и метаболизма, системы крови и иммунной системы; МКФ: B 510 - 539, B 540 - 559, B 430 - 439	Непрерывно рецидивирующее прогрессирующее течение спаечной болезни, требующее стационарного лечения, не поддающиеся консервативной терапии и требующие оперативного вмешательства
11.5		Болезни печени Другие врожденные аномалии органов пищеварения		K70 - K77 B15 - B19 Q38 - Q45		
11.5.1			Вирусный гепатит	B15 - B19		
11.5.1.1					Нарушения функций пищеварительной системы,	Хронический гепатит с лабораторными показателями

					системы крови и иммунной системы; МКФ: B 510 - 539, B 430 - 439	цитолиза, холестаза, мезенхимального воспаления и печеночной недостаточности 1 - 2 степени; с отсутствием или незначительными клиническими проявлениями. Отсутствие фиброза либо незначительные признаки фиброза (F0 или F1 по шкале METAVIR)
11.5.1.2					Нарушения функций пищеварительной системы, системы крови и иммунной системы; МКФ: B 510 - 539, B 430 - 439	Прогрессирование хронического гепатита с лабораторными показателями цитолиза, холестаза, мезенхимального воспаления и печеночной недостаточности 3 степени; с умеренными клиническими проявлениями на фоне базисной терапии. Умеренные или выраженные признаки фиброза (F2 или F3 по шкале METAVIR)
11.5.2			Алкогольный фиброз и склероз печени. Алкогольный цирроз печени. Токсическое поражение	K70.2 K70.3 K71.1		

			печени с фиброзом и циррозом печени Фиброз и цирроз печени Врожденный цирроз печени	 K74 Q44		
11.5.2.1					Нарушения функций пищеварительной, эндокринной системы и метаболизма, сердечно-сосудистой системы, системы крови и иммунной системы, нарушения психических функций; МКФ: 510 - 539, B 540 - 559, B 410 - 429, B 430 - 439, B 110 - 139, B 140 - 189	Цирроз печени (A0, F4 по шкале METAVIR) компенсированный неактивный (класс A по Чайлд-Пью). Отсутствие или незначительные нарушения функций организма
11.5.2.2					Нарушения функций пищеварительной, эндокринной системы и метаболизма, сердечно-сосудистой системы, системы крови и иммунной системы, нарушения психических функций; МКФ: 510 - 539, B 540 - 559, B 410 - 429, B 430 - 439, B 110 - 139, B 140 - 189	Цирроз печени (A1-2, F4 по шкале METAVIR) компенсированный (класс A по Чайлд-Пью) с умеренными нарушениями функций организма

11.5.2.3					Нарушения функций пищеварительной, эндокринной системы и метаболизма, сердечно-сосудистой системы, системы крови и иммунной системы, нарушения психических функций; МКФ: 510 - 539, B 540 - 559, B 410 - 429, B 430 - 439, B 110 - 139, B 140 - 189	Цирроз печени (A1-3, F4 по шкале METAVIR) субкомпенсированный (класс B по Чайлд-Пью) с выраженными нарушениями функций организма
11.5.2.4					Нарушения функций пищеварительной, эндокринной системы и метаболизма, сердечно-сосудистой системы, системы крови и иммунной системы, нарушения психических функций; МКФ: 510 - 539, B 540 - 559, B 410 - 429, B 430 - 439, B 110 - 139, B 140 - 189	Цирроз печени (A1-3, F4 по шкале METAVIR) декомпенсированный (класс C по Чайлд-Пью) со значительно выраженными нарушениями функций организма
11.5.3			Наличие трансплантированной печени			
11.5.3.1					Нарушение функции системы крови и иммунной	При первичном освидетельствовании после

					системы, сердечно-сосудистой, дыхательной, эндокринной систем и метаболизма, пищеварительной системы, мочевыделительной функции; психических функций; МКФ: B 430 - 439, B 410 - 429, B 440 - 450, B 540 - 559, B 510 - 539, B 610 - 639, B 110 - 139, B 140 - 189	трансплантации печени в течение первых 2 лет
11.5.3.2					Нарушение функции системы крови и иммунной системы, сердечно-сосудистой, дыхательной, эндокринной систем и метаболизма, пищеварительной системы, мочевыделительной функции; психических функций; МКФ: B 430 - 439, B 410 - 429, B 440 - 450, B 540 - 559, B 510 - 539, B 610 - 639, B 110 - 139, B 140 - 189	При повторном освидетельствовании по истечении 2-летнего срока после трансплантации печени при наличии осложнений с умеренными нарушениями функций организма
11.5.3.3					Нарушение функции системы крови и иммунной системы, сердечно-сосудистой,	По истечении 2-летнего срока после трансплантации печени при наличии осложнений с выраженными нарушениями

					дыхательной, эндокринной систем и метаболизма, пищеварительной системы, мочевыделительной функции; психических функций; МКФ: B 430 - 439, B 410 - 429, B 440 - 450, B 540 - 559, B 510 - 539, B 610 - 639, B 110 - 139, B 140 - 189	функций организма
11.5.3.4					Нарушение функции системы крови и иммунной системы, сердечно-сосудистой, дыхательной, эндокринной систем и метаболизма, пищеварительной системы, мочевыделительной функции; психических функций; МКФ: B 430 - 439, B 410 - 429, B 440 - 450, B 540 - 559, B 510 - 539, B 610 - 639, B 110 - 139, B 140 - 189	По истечении 2-летнего срока после трансплантации печени при наличии осложнений со значительно выраженными нарушениями функций организма
11.6		Болезни желчного пузыря, желчевыводящих путей и поджелудочной железы		K80 - K87		

11.6.1			Хронический панкреатит алкогольной этиологии. Другие хронические панкреатиты	K86.0 K86.1		
11.6.1.1					Нарушение функции пищеварительной системы; МКФ: B 510 - 539	Отсутствие или незначительные нарушения функции пищеварительной системы
11.6.1.2					Нарушения функций пищеварительной, эндокринной систем и метаболизма; МКФ: B 510 - 539, B 540 - 559	Умеренные нарушения экзо- и эндокринной функции поджелудочной железы
11.6.1.3					Нарушения функций пищеварительной, эндокринной систем и метаболизма; МКФ: B 510 - 539, B 540 - 559	Выраженные нарушения экзо- и эндокринной функции поджелудочной железы
12	Болезни кожи и подкожной клетчатки (класс XII)			L00 - L99		

Примечание к пункту 12.
Количественная оценка степени выраженности стойких нарушений функций кожи и подкожной клетчатки, обусловленных заболеваниями, последс
или дефектами, основывается преимущественно на оценке степени выраженности нарушения функции кожи. Учитываются также и дру

патологического процесса: форма и тяжесть течения, активность процесса, наличие и частота обострений, распространенность патологическ необходимость подавления иммунитета, наличие осложнений с поражением органов и систем организма.						
12.1		Буллезные нарушения		L10 - L14		
12.1.1			Пузырчатка (пемфигус) Пемфигоид	L10 L12		
12.1.1.1					Нарушения функции кожи и связанных с ней систем, функций системы крови и иммунной системы; МКФ: B 810 - 849, B 430 - 439	Единичные высыпания на коже и слизистых оболочках с незначительными нарушениями функций организма
12.1.1.2					Нарушения функции кожи и связанных с ней систем, функций системы крови и иммунной системы; МКФ: B 810 - 849, B 430 - 439	Распространенное поражение кожи (более 2 анатомических областей) и/или слизистых оболочек, в том числе внутренних органов, с умеренными нарушениями функций организма, резистентность к проводимой системной терапии
12.2		Дерматит и экзема		L20 - L30		
12.2.1			Аллергический контактный дерматит	L23		
12.2.1.1					Нарушение функции кожи и связанных с ней систем;	Ограниченный дерматит, обострения до 2 раз в год на

					МКФ: B 810 - 849	фоне проводимого лечения
12.2.1.2					Нарушение функции кожи и связанных с ней систем; МКФ: B 810 - 849	Распространенный дерматит, обострения более 2 раз в год
12.2.2			Атопический дерматит	L20		
12.2.2.1					Нарушение функции кожи и связанных с ней систем; МКФ: B 810 - 849	Ограниченная или распространенная форма заболевания с площадью поражения кожи до 50%, обострения до 2 раз в год на фоне проводимого лечения
12.2.2.2					Нарушение функции кожи и связанных с ней систем; МКФ: B 810 - 849	Распространенная форма с площадью поражения кожи 50% и более, обострения 3 и более раза в год, склонность к торпидному течению, резистентность к проводимой терапии
12.3		Папулосквамозные нарушения		L40 - L45		
12.3.1			Псориаз	L40		
Примечание к подпункту 12.3.1. Количественная оценка нарушений функций организма при артропатическом псориазе подробно описана в пункте 13.1						
12.3.1.1					Нарушение функции кожи и связанных с ней систем; МКФ: B 810 - 849	Псориаз с площадью поражения до 50% с незначительным нарушением

						функций организма
12.3.1.2					Нарушение функции кожи и связанных с ней систем; МКФ: B 810 - 849	Частые (более 2 раз в год) обострения или непрерывно рецидивирующее течение заболевания при площади поражения кожи более 50%, резистентность к проводимой терапии. Частые (более 2 раз в год) обострения или непрерывно рецидивирующее течение ладонно-подошвенного псориаза; резистентность к проводимой терапии
12.4		Болезни придатков кожи		L60 - L75		
12.4.1			Алопеция тотальная	L63.0		
12.4.1.1					Нарушение функции кожи и связанных с ней систем; МКФ: B 810 - 849	Тотальное облысение, с отсутствием бровей и ресниц
12.5		Другие болезни кожи и подкожной клетчатки		L80 - L99		
12.5.1			Локализованная склеродермия (morphea)	L94.0		

			Линейная (полосовидная) склеродермия туловища и/или конечностей Прогрессирующая гемиатрофия лица Парри-Ромберга - глубокая линейная склеродермия	L94.1 L94.1		
12.5.1.1					Нарушение функции кожи и связанных с ней систем; МКФ: B 810 - 849	Поверхностные формы склеродермии без нарушений или с незначительными нарушениями кожи и связанных с ней систем
12.5.1.2					Нарушение функции кожи и связанных с ней систем; МКФ: B 810 - 849	Глубокая форма склеродермии, при вовлечении в процесс кожи и подкожной клетчатки, фасций, мышц, костей с образованием рубцов (вплоть до укорочения конечности и образования контрактур), сопровождающиеся умеренными нарушениями функций организма (в зависимости от локализации
12.6		Врожденные аномалии и пороки развития кожи		Q80 - Q89		

12.6.1			Врожденный буллезный эпидермолиз	Q81		
12.6.1.1					Нарушение функции кожи и связанных с ней систем; МКФ: B 810 - 849	Ограниченные формы
12.6.1.2					Нарушения функций кожи и связанных с ней систем, нарушение нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций, сенсорных функций, функций пищеварительной системы; МКФ: B 810 - 849, B 710 - 789, B 210 - 279, B 510 - 539	Поражения кожи (в том числе активных поверхностей - кистей, стоп), слизистых оболочек внутренних органов, приводящие к умеренным нарушениям функций организма
12.6.1.3					Нарушения функций кожи и связанных с ней систем; нарушение нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций; сенсорных функций, нарушение функций пищеварительной системы, сердечно-сосудистой системы, мочевыделительной	Поражения кожи, слизистых оболочек внутренних органов приводящие к выраженным нарушениям функций организма

					функции; МКФ: B 810 - 849, B 710 - 789, B 210 - 279, B 510 - 539; B 410 - 429, B 610 - 639	
13	Болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани (класс XIII)			M00 - M99		
Примечание к пункту 13. Количественная оценка степени выраженности стойких нарушений функций костно-мышечной системы и соединительной ткани основывается прей на оценке степени выраженности нарушений функций органов и систем организма, степени выраженности нарушений функции суставов (налич контрактуры, деформаций суставов), позвоночника (степень ограничения подвижности позвоночника); с учетом рентгенологических изменений позвоночнике, рекомендованных валидированных методов оценки клинико-лабораторных показателей активности заболевания; характеристи степени тяжести заболевания. Необходимо учитывать также постоянную потребность (объем и виды) в противовоспалительной и иммуносупресси (сочетание препаратов нескольких фармакотерапевтических групп), на фоне которой достигается и сохраняется состояние ремиссии заболевания.						
13.1		Воспалительные полиартропатии Артрозы		M05 - M14 M15 - M19		
13.1.1			Серопозитивный ревматоидный артрит Синдром Фелти Ревматоидный артрит с вовлечением других органов и систем	M05 M05.0 M05.3		

			Другие серопозитивные ревматоидные артриты Серопозитивные ревматоидные артриты неуточненные Другие ревматоидные артриты Серонегативный ревматоидный артрит Болезнь Стилла, резвившаяся у взрослых Другие уточненные ревматоидные артриты Юношеский артрит с системным началом	M05.8 M05.9 M06 M06.0 M06.1 M06.8 M08.2		
13.1.1.1					Нарушения нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций, сенсорных функций, функций пищеварительной, дыхательной, сердечно-сосудистой системы, системы крови и иммунной системы,	Отсутствие или незначительное нарушение функции организма: ФК I; рентгенологическая стадия I; отсутствие или I степень активности заболевания; отсутствие системных проявлений заболевания; отсутствие осложнений заболевания и/или проводимой терапии

					эндокринной системы и метаболизма, мочевыделительной функции, функций кожи и связанных с ней систем; МКФ: B 710 - 789, B 798, B 799, B 210 - 299, B 510 - 539, B 440 - 469, B 410 - 429, B 430 - 439, B 540 - 559, B 610 - 639, B 810 - 849	
13.1.1.2					Нарушения нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций, сенсорных функций, функций пищеварительной, дыхательной, сердечно-сосудистой системы, системы крови и иммунной системы, эндокринной системы и метаболизма, мочевыделительной функции; функций кожи и связанных с ней систем; МКФ: B 710 - 789, B 798, B 799, B 210 - 299, B 510 - 539, B 440 - 469, B 410 - 429, B 430 - 439, B 540 - 559, B 610 - 639, B 810 - 849	Умеренное нарушение функции организма: ФК II; рентгенологическая стадия II; II степень активности заболевания; отсутствие системных проявлений заболевания; наличие осложнений заболевания и/или проводимой терапии, приводящей к умеренно выраженным нарушениям функций организма

13.1.1.3					Нарушения нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций, сенсорных функций, функций пищеварительной, дыхательной, сердечно-сосудистой системы, системы крови и иммунной системы, эндокринной системы и метаболизма, мочевыделительной функции; функций кожи и связанных с ней систем; МКФ: B 710 - 789, B 798, B 799, B 210 - 299, B 510 - 539, B 440 - 469, B 410 - 429, B 430 - 439, B 540 - 559, B 610 - 639, B 810 - 849	Выраженное нарушение функции организма: ФК II - III; рентгенологическая стадия II - IV; II - III степень активности заболевания; наличие системных проявлений заболевания; наличие осложнений заболевания и/или проводимой терапии, приводящей к выраженным нарушениям функций организма
13.1.1.4					Нарушения нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций, сенсорных функций, функций пищеварительной, дыхательной, сердечно-сосудистой системы, системы крови и	Значительно выраженные нарушения функции организма: ФК IV (обоих тазобедренных, или более двух крупных суставов в функционально невыгодном состоянии); рентгенологическая стадия III - IV; вне зависимости от активности заболевания на

					иммунной системы, эндокринной системы и метаболизма, мочевыделительной функции; функций кожи и связанных с ней систем; МКФ: B 710 - 789, B 798, B 799, B 210 - 299, B 510 - 539, B 440 - 469, B 410 - 429, B 430 - 439, B 540 - 559, B 610 - 639, B 810 - 849	фоне терапии; наличие системных проявлений заболевания; наличие осложнений заболевания и/или проводимой терапии, приводящей к значительно выраженным нарушениям функций организма
13.1.2			Псориатические и энтеропатические артропатии	M07.0 - M07.3		
13.1.2.1					Нарушения нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций, сенсорных функций, функций пищеварительной, дыхательной, сердечно-сосудистой системы, системы крови и иммунной системы, эндокринной системы и метаболизма, мочевыделительной функции; функций кожи и связанных с ней систем;	Отсутствие или незначительное нарушение функции организма, отсутствие или незначительное нарушение функции суставов и/или энтезисов и/или позвоночника; отсутствие или низкая активность заболевания; отсутствие осложнений заболевания и/или проводимой терапии

					МКФ: B 710 - 789, B 798, B 799, B 210 - 299, B 510 - 539, B 440 - 469, B 410 - 429, B 430 - 439, B 540 - 559, B 610 - 639, B 810 - 849	
13.1.2.2					Нарушения нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций, сенсорных функций, функций пищеварительной, дыхательной, сердечно-сосудистой системы, системы крови и иммунной системы, эндокринной системы и метаболизма, мочевыделительной функции; функций кожи и связанных с ней систем; МКФ: B 710 - 789, B 798, B 799, B 210 - 299, B 510 - 539, B 440 - 469, B 410 - 429, B 430 - 439, B 540 - 559, B 610 - 639, B 810 - 849	Умеренное нарушение функции суставов и/или энтезисов и/или позвоночника; Умеренная активность заболевания; наличие осложнений заболевания и/или проводимой терапии, приводящей к умеренным нарушениям функций организма
13.1.2.3					Нарушения нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических)	Выраженное нарушение функции суставов и/или энтезисов и/или позвоночника;

					функций, сенсорных функций, функций пищеварительной, дыхательной, сердечно-сосудистой системы, системы крови и иммунной системы, эндокринной системы и метаболизма, мочевыделительной функции; функций кожи и связанных с ней систем; МКФ: B 710 - 789, B 798, B 799, B 210 - 299, B 510 - 539, B 440 - 469, B 410 - 429, B 430 - 439, B 540 - 559, B 610 - 639, B 810 - 849	умеренная или высокая активность заболевания; наличие осложнений заболевания и/или проводимой терапии, приводящей к выраженным нарушениям функций организма
13.1.2.4					Нарушения нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций, сенсорных функций, функций пищеварительной, дыхательной, сердечно-сосудистой системы, системы крови и иммунной системы, эндокринной системы и метаболизма, мочевыделительной	Значительно выраженное нарушение функции суставов и/или энтезисов и/или позвоночника; вне зависимости от активности заболевания на фоне терапии; множественные эрозии суставов (более 5) остеонекрозов крупных суставов, при наличии осложнений заболевания и/или проводимой терапии, приводящей к значительно выраженным нарушениям

					функции; функций кожи и связанных с ней систем; МКФ: B 710 - 789, B 798, B 799, B 210 - 299, B 510 - 539, B 440 - 469, B 410 - 429, B 430 - 439, B 540 - 559, B 610 - 639, B 810 - 849	функций организма. Отсутствие ответа на терапию
13.1.3			Подагра Болезнь отложения кристаллов пирофосфата кальция дигидрата	M10 M11		
13.1.3.1					Нарушения нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций, сенсорных функций, функций пищеварительной, дыхательной, сердечно-сосудистой системы, системы крови и иммунной системы, эндокринной системы и метаболизма, мочевыделительной функции; функций кожи и связанных с ней систем; МКФ: B 710 - 789, B 798, B 799, B 210 - 299, B 510 -	Отсутствие или незначительное нарушение функции суставов; отсутствие тофусов; отсутствие осложнений заболевания и/или проводимой терапии

					539, B 440 - 469, B 410 - 429, B 430 - 439, B 540 - 559, B 610 - 639, B 810 - 849	
13.1.3.2.					Нарушения нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций, сенсорных функций, функций пищеварительной, дыхательной, сердечно-сосудистой системы, системы крови и иммунной системы, эндокринной системы и метаболизма, мочевыделительной функции; функций кожи и связанных с ней систем; МКФ: B 710 - 789, B 798, B 799, B 210 - 299, B 510 - 539, B 440 - 469, B 410 - 429, B 430 - 439, B 540 - 559, B 610 - 639, B 810 - 849	Умеренное нарушение функции суставов; Хроническое течение артрита; тофусная форма (подкожные тофусы); наличие осложнений заболевания и/или проводимой медикаментозной терапии, приводящей к умеренным нарушениям функций организма
13.1.3.3					Нарушения нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций, сенсорных функций, функций	Выраженное нарушение функции суставов; хроническое течение артрита; тофусная форма (подкожные и внутрикостные тофусы); наличие осложнений

					пищеварительной, дыхательной, сердечно-сосудистой системы, системы крови и иммунной системы, эндокринной системы и метаболизма, мочевыделительной функции; функций кожи и связанных с ней систем; МКФ: B 710 - 789, B 798, B 799, B 210 - 299, B 510 - 539, B 440 - 469, B 410 - 429, B 430 - 439, B 540 - 559, B 610 - 639, B 810 - 849	заболевания и/или проводимой терапии, приводящей к выраженным нарушениям функций организма
13.1.3.4					Нарушения нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций, сенсорных функций, функций пищеварительной, дыхательной, сердечно-сосудистой системы, системы крови и иммунной системы, эндокринной системы и метаболизма, мочевыделительной функции; функций кожи и связанных с ней систем;	Значительно выраженное нарушение функции суставов; Хроническое течение артрита; тофусная форма (множественные внутрикостные тофусы, с поражением крупных суставов); наличие осложнений заболевания и/или проводимой терапии, приводящей к значительно выраженным нарушениям функций организма

					МКФ: B 710 - 789, B 798, B 799, B 210 - 299, B 510 - 539, B 440 - 469, B 410 - 429, B 430 - 439, B 540 - 559, B 610 - 639, B 810 - 849	
13.1.4			Артрозы	M15 - M19		
13.1.4.1					Нарушения нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций, сенсорных функций, функций пищеварительной, дыхательной, сердечно-сосудистой системы, системы крови и иммунной системы, эндокринной системы и метаболизма, мочевыделительной функции; функций кожи и связанных с ней систем; МКФ: B 710 - 789, B 798, B 799, B 210 - 299, B 510 - 539, B 440 - 469, B 410 - 429, B 430 - 439, B 540 - 559, B 610 - 639, B 810 - 849	Нарушение функции суставов; НФС 1; рентгенологическая стадия I - II; отсутствие осложнений заболевания и/или проводимой терапии
13.1.4.2					Нарушения нейромышечных, скелетных	Умеренное нарушение функции суставов; НФС II;

					и связанных с движением (статодинамических) функций, сенсорных функций, функций пищеварительной, дыхательной, сердечно-сосудистой системы, системы крови и иммунной системы, эндокринной системы и метаболизма, мочевыделительной функции; функций кожи и связанных с ней систем; МКФ: B 710 - 789, B 798, B 799, B 210 - 299, B 510 - 539, B 440 - 469, B 410 - 429, B 430 - 439, B 540 - 559, B 610 - 639 B 810 - 849	рентгенологическая стадия II - III; наличие осложнений заболевания и/или от проводимой терапии, приводящей к умеренным нарушениям функций организма
13.1.4.3					Нарушения нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций, сенсорных функций, функций пищеварительной, дыхательной, сердечно-сосудистой системы, системы крови и иммунной системы, эндокринной системы и	Выраженное нарушение функции суставов; НФС III; Генерализованная форма заболевания; рентгенологическая стадия III - IV; наличие осложнений заболевания и/или от проводимой терапии, приводящей к выраженным нарушениям функций организма

					метаболизма, мочевыделительной функции; функций кожи и связанных с ней систем; МКФ: B 710 - 789, B 798, B 799, B 210 - 299, B 510 - 539, B 440 - 469, B 410 - 429, B 430 - 439, B 540 - 559, B 610 - 639, B 810 - 849	
13.1.4.4					Нарушения нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций, сенсорных функций, функций пищеварительной, дыхательной, сердечно-сосудистой системы, системы крови и иммунной системы, эндокринной системы и метаболизма, мочевыделительной функции; функций кожи и связанных с ней систем; МКФ: B 710 - 789, B 798, B 799, B 210 - 299, B 510 - 539, B 440 - 469, B 410 - 429, B 430 - 439, B 540 - 559, B 610 - 639, B 810 - 849	Значительно выраженное нарушение функции суставов; НФС - IV; генерализованная форма заболевания; рентгенологическая стадия III - IV; наличие осложнений заболевания и/или от проводимой терапии, приводящей к значительно выраженным нарушениям функций организма

13.2.		Системные поражения соединительной ткани		M30 - M36		
13.2.1			Системная красная волчанка	M32		
			Дерматополимиозит	M33		
			Болезнь Бехчета	M35.2		
			Системные васкулиты	M30		
			Гранулематоз Вегенера	M31.4		
			Гигантоклеточный артериит с ревматической полимиалгией.	M31.5		
			Сухой синдром (Шегрена)	M35.0		
			Диффузный эозинофильный фасциит	M35.4		
			Рецидивирующий панникулит Вебера-Крисчена	M35.6		
			Другие уточненные системные поражения соединительной ткани	M35.8		

13.2.1.1					Нарушения нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций, сенсорных функций, функций пищеварительной, дыхательной, сердечно-сосудистой системы, системы крови и иммунной системы, эндокринной системы и метаболизма, мочевыделительной функции; функций кожи и связанных с ней систем; МКФ: B 710 - 789, B 798, B 799, B 210 - 299, B 510 - 539, B 440 - 469, B 410 - 429, B 430 - 439, B 540 - 559, B 610 - 639, B 810 - 849	Ремиссия или низкая активность заболевания без нарастания активности заболевания; отсутствие повреждения органов и систем организма вследствие заболевания; отсутствие осложнений заболевания и/или проводимой терапии
13.2.1.2					Нарушения нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций, сенсорных функций, функций пищеварительной, дыхательной, сердечно-сосудистой системы, системы крови и	Умеренная активность заболевания; прогрессирование заболевания; склонность к генерализации; с вовлечением в процесс внутренних органов и систем организма, приводящей к умеренным нарушениям функций организма

					иммунной системы, эндокринной системы и метаболизма, мочевыделительной функции; функций кожи и связанных с ней систем; МКФ: B 710 - 789, B 798, B 799, B 210 - 299, B 510 - 539, B 440 - 469, B 410 - 429, B 430 - 439, B 540 - 559, B 610 - 639, B 810 - 849	
13.2.1.3					Нарушения нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций, сенсорных функций, функций пищеварительной, дыхательной, сердечно-сосудистой системы, системы крови и иммунной системы, эндокринной системы и метаболизма, мочевыделительной функции; функций кожи и связанных с ней систем; МКФ: B 710 - 789, B 798, B 799, B 210 - 299, B 510 - 539, B 440 - 469, B 410 - 429, B 430 - 439, B 540 -	Высокая активность заболевания; быстрое прогрессирование заболевания; склонность к генерализации; вовлечение в процесс органов и систем организма; наличие осложнений заболевания и/или проводимой терапии, приводящей к выраженным нарушениям функций организма

					559, B 610 - 639, B 810 - 849	
13.2.1.4					Нарушения нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций, сенсорных функций, функций пищеварительной, дыхательной, сердечно-сосудистой системы, системы крови и иммунной системы, эндокринной системы и метаболизма, мочевыделительной функции; функций кожи и связанных с ней систем; МКФ: B 710 - 789, B 798, B 799, B 210 - 299, B 510 - 539, B 440 - 469, B 410 - 429, B 430 - 439, B 540 - 559, B 610 - 639, B 810 - 849	Высокая активность заболевания; быстрое прогрессирование заболевания; склонность к генерализации; наличие повреждения органов и систем вследствие заболевания; наличие жизнеугрожающих осложнений заболевания и/или проводимой терапии, приводящей к значительно выраженным нарушениям функций организма
13.2.2			Системная красная волчанка	M32		
13.2.2.1					Нарушения нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций, сенсорных	Низкая активность заболевания; отсутствие признаков повреждения органов и систем организма вследствие

					функций, функций пищеварительной, дыхательной, сердечно-сосудистой системы, системы крови и иммунной системы, эндокринной системы и метаболизма, мочевыделительной функции; функций кожи и связанных с ней систем; МКФ: B 710 - 789, B 798, B 799, B 210 - 299, B 510 - 539, B 440 - 469, B 410 - 429, B 430 - 439, B 540 - 559, B 610 - 639, B 810 - 849	заболевания; отсутствие осложнений заболевания и/или проводимой терапии
13.2.2.2					Нарушения нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций, сенсорных функций, функций пищеварительной, дыхательной, сердечно-сосудистой системы, системы крови и иммунной системы, эндокринной системы и метаболизма, мочевыделительной функции; функций кожи и	Средняя активность заболевания; наличие повреждения органов и систем организма вследствие заболевания, наличие осложнений заболевания и/или проводимой терапии, приводящей к умеренным нарушениям функций организма

					связанных с ней систем; МКФ: B 710 - 789, B 798, B 799, B 210 - 299, B 510 - 539, B 440 - 469, B 410 - 429, B 430 - 439, B 540 - 559, B 610 - 639, B 810 - 849	
13.2.2.3					Нарушения нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций, сенсорных функций, функций пищеварительной, дыхательной, сердечно-сосудистой системы, системы крови и иммунной системы, эндокринной системы и метаболизма, мочевыделительной функции; функций кожи и связанных с ней систем; МКФ: B 710 - 789, B 798, B 799, B 210 - 299, B 510 - 539, B 440 - 469, B 410 - 429, B 430 - 439, B 540 - 559, B 610 - 639, B 810 - 849	Высокая активность заболевания; наличие повреждения органов и систем вследствие заболевания, наличие осложнений заболевания и/или проводимой терапии, приводящей к выраженным нарушениям функций организма
13.2.2.4					Нарушения нейромышечных, скелетных и связанных с движением	Прогрессирующее течение заболевания; Высокая активность заболевания,

					(статодинамических) функций, сенсорных функций, функций пищеварительной, дыхательной, сердечно-сосудистой системы, системы крови и иммунной системы, эндокринной системы и метаболизма, мочевыделительной функции; функций кожи и связанных с ней систем; МКФ: B 710 - 789, B 798, B 799, B 210 - 299, B 510 - 539, B 440 - 469, B 410 - 429, B 430 - 439, B 540 - 559, B 610 - 639, B 810 - 849	наличие полиорганных нарушений органов и систем организма вследствие заболевания; наличие осложнений заболевания и/или проводимой терапии, приводящей к значительно выраженным нарушениям функций организма
13.2.3			Дерматополимиозит Юношеский дерматомиозит Другие дерматомиозиты Полимиозит Дерматополимиозит неуточненный	M33 M33.0 M33.1 M33.2 M33.9		
13.2.3.1					Нарушения нейромышечных, скелетных	Незначительная степень нарушения функции

					и связанных с движением (статодинамических) функций, сенсорных функций, функций пищеварительной, дыхательной, сердечно-сосудистой системы, системы крови и иммунной системы, эндокринной системы и метаболизма, мочевыделительной функции; функций кожи и связанных с ней систем; МКФ: B 710 - 789, B 798, B 799, B 210 - 299, B 510 - 539, B 440 - 469, B 410 - 429, B 430 - 439, B 540 - 559, B 610 - 639, B 810 - 849	пораженных органов и систем организма, вызванных заболеванием, активность процесса I степени
13.2.3.2					Нарушения нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций, сенсорных функций, функций пищеварительной, дыхательной, сердечно-сосудистой системы, системы крови и иммунной системы, эндокринной системы и	Умеренная активность процесса, с поражением органов и систем организма, наличие осложнений заболевания и/или проводимой терапии, приводящей к умеренным нарушениям функций организма

					метаболизма, мочевыделительной функции; функций кожи и связанных с ней систем; МКФ: B 710 - 789, B 798, B 799, B 210 - 299, B 510 - 539, B 440 - 469, B 410 - 429, B 430 - 439, B 540 - 559, B 610 - 639, B 810 - 849	
13.2.3.3					Нарушения нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций, сенсорных функций, функций пищеварительной, дыхательной, сердечно-сосудистой системы, системы крови и иммунной системы, эндокринной системы и метаболизма, мочевыделительной функции; функций кожи и связанных с ней систем; МКФ: B 710 - 789, B 798, B 799, B 210 - 299, B 510 - 539, B 440 - 469, B 410 - 429, B 430 - 439, B 540 - 559, B 610 - 639, B 810 - 849	Высокая активность процесса, с поражением органов и систем организма, наличие осложнений заболевания и/или проводимой терапии, приводящей к выраженным нарушениям функций организма

13.2.3.4					Нарушения нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций, сенсорных функций, функций пищеварительной, дыхательной, сердечно-сосудистой системы, системы крови и иммунной системы, эндокринной системы и метаболизма, мочевыделительной функции; функций кожи и связанных с ней систем; МКФ: B 710 - 789, B 798, B 799, B 210 - 299, B 510 - 539, B 440 - 469, B 410 - 429, B 430 - 439, B 540 - 559, B 610 - 639, B 810 - 849	Нарушения функции пораженных органов и систем организма, независимо от активности заболевания, наличие осложнений заболевания и/или проводимой терапии, приводящей к значительно выраженным нарушениям функций организма
13.2.4			Системный склероз, склеродермия Прогрессирующий системный склероз Синдром CREST Системный склероз, вызванный лекарственными	M34 M34.0 M34.1 M34.2		

			средствами и химическими соединениями			
			Другие формы системного склероза	M34.8		
			Системный склероз неуточненный	M34.9		
			Другие системные поражения соединительной ткани	M35		
			Другие перекрестные синдромы	M35.1		
			Диффузный (эозинофильный) фасциит	M35.4		
13.2.4.1					Нарушения нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций, сенсорных функций, функций пищеварительной, дыхательной, сердечно-сосудистой системы, системы крови и иммунной системы, эндокринной системы и	Очень ранняя стадия заболевания; Отсутствие активности; незначительное поражение кожи; синдром Рейно без дигитальных трофических нарушений; отсутствие поражения внутренних органов; отсутствие осложнений заболевания и/или

					метаболизма, мочевыделительной функции; функций кожи и связанных с ней систем; МКФ: B 710 - 789, B 798, B 799, B 210 - 299, B 510 - 539, B 440 - 469, B 410 - 429, B 430 - 439, B 540 - 559, B 610 - 639, B 810 - 849	проводимой терапии
13.2.4.2					Нарушения нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций, сенсорных функций, функций пищеварительной, дыхательной, сердечно-сосудистой системы, системы крови и иммунной системы, эндокринной системы и метаболизма, мочевыделительной функции; функций кожи и связанных с ней систем; МКФ: B 710 - 789, B 798, B 799, B 210 - 299, B 510 - 539, B 440 - 469, B 410 - 429, B 430 - 439, B 540 - 559, B 610 - 639, B 810 - 849	Начальная стадия заболевания; низкая активность заболевания, с повреждением органов и систем организма, приводящим к умеренным нарушениям функций организма; отсутствие осложнений заболевания и/или проводимой терапии

13.2.4.3					Нарушения нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций, сенсорных функций, функций пищеварительной, дыхательной, сердечно-сосудистой системы, системы крови и иммунной системы, эндокринной системы и метаболизма, мочевыделительной функции; функций кожи и связанных с ней систем; МКФ: B 710 - 789, B 798, B 799, B 210 - 299, B 510 - 539, B 440 - 469, B 410 - 429, B 430 - 439, B 540 - 559, B 610 - 639, B 810 - 849	Стадия развернутых клинических проявлений заболевания; умеренная активность заболевания, с повреждением органов и систем организма, наличие осложнений заболевания и/или проводимой терапии, приводящие к выраженным нарушениям функций организма
13.2.4.4						Терминальная стадия вне зависимости от активности заболевания, с повреждением органов и систем организма, наличие осложнений заболевания и/или проводимой терапии, приводящие к значительно выраженным нарушениям функций организма

13.2.5			Спондилопатии Анкилозирующий спондилит Другие воспалительные спондилопатии.	M45 - M48 M45 M46		

КонсультантПлюс: примечание.
В официальном тексте документа, видимо, допущена опечатка: имеется в виду код МКБ-10 M46.8, а не M48.6.

			Другие уточненные воспалительные спондилопатии	M48.6		
13.2.5.1					Нарушения нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций; МКФ: B 710 - 789, B 798, B 799	Незначительное нарушение функции организма; незначительное нарушение функции позвоночника и/или суставов; отсутствие или низкая степень активности заболевания; ФК I; отсутствие внескелетных проявлений заболевания; отсутствие осложнений заболевания и/или проводимой терапии
13.2.5.2					Нарушения нейромышечных, скелетных и связанных с движением	Умеренное нарушение функции позвоночника и/или суставов, при сохраняющейся

					(статодинамических) функций, сенсорных функций, функций пищеварительной, дыхательной, сердечно-сосудистой системы, системы крови и иммунной системы, эндокринной системы и метаболизма, мочевыделительной функции; функций кожи и связанных с ней систем; МКФ: B 710 - 789, B 798, B 799, B 210 - 299, B 510 - 539, B 440 - 469, B 410 - 429, B 430 - 439, B 540 - 559, B 610 - 639, B 810 - 849	умеренной или высокой степени активности заболевания; ФК II; наличие внескелетных проявлений заболевания с умеренными нарушениями функций организма; отсутствие осложнений заболевания и/или проводимой терапии
13.2.5.3					Нарушения нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций, сенсорных функций, функций пищеварительной, дыхательной, сердечно-сосудистой системы, системы крови и иммунной системы, эндокринной системы и метаболизма,	Выраженное нарушение функции позвоночника и/или суставов, при сохраняющейся умеренной или высокой активности заболевания; ФК III; наличие внескелетных проявлений заболевания; наличие осложнений заболевания и/или проводимой терапии; приводящие к выраженным нарушением функций организма

					мочевыделительной функции; функций кожи и связанных с ней систем; МКФ: B 710 - 789, B 798, B 799, B 210 - 299, B 510 - 539, B 440 - 469, B 410 - 429, B 430 - 439, B 540 - 559, B 610 - 639, B 810 - 849	
13.2.5.4					Нарушения нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций, сенсорных функций, функций пищеварительной, дыхательной, сердечно-сосудистой системы, системы крови и иммунной системы, эндокринной системы и метаболизма, мочевыделительной функции; функций кожи и связанных с ней систем; МКФ: B 710 - 789, B 798, B 799, B 210 - 299, B 510 - 539, B 440 - 469, B 410 - 429, B 430 - 439, B 540 - 559, B 610 - 639, B 810 - 849	Значительно выраженные нарушения функции организма, значительно выраженные нарушения функции позвоночника/суставов; ФК IV; наличие внескелетных проявлений заболевания; наличие осложнений заболевания и/или проводимой терапии, приводящие к значительно выраженным нарушением функций организма
13.3		Дорсопатии		M40 - M54		

Примечание к подпункту 13.3.
Количественная оценка степени выраженности стойких нарушений статодинамической функции организма граждан в возрасте 18 лет и старше, об
дорсопатиями основывается на оценке клинико-функциональных проявлений заболевания и данных рентгенологического обследования степени
(сколиоз, кифосколиоз), ограничения подвижности позвоночника, нарушения функции других органов и систем организма (костн
сердечно-сосудистой, дыхательной и других систем), выраженности вторичного дегенеративно-дистрофического поражения позвоночны
неврологической симптоматики. Учитываются также результаты хирургической коррекции, ее эффективность, осложнения, сопутствующие заболева

13.3.1			Деформирующие дорсопатии Сколиоз Остеохондроз позвоночника. Другие деформирующие дорсопатии Поражение межпозвоночных дисков шейного отдела	M40 - M43 M41 M42 M43 M50 - M54		
13.3.1.1					Нарушения нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций; МКФ: B 710 - 729, B 750 - 789	Сколиоз и кифосколиоз II - III степени с незначительными ограничениями подвижности позвоночника. Отсутствие нарушений функций внутренних органов
13.3.1.2					Нарушения нейромышечных, скелетных и связанных с движением	Сколиоз и кифосколиоз III - IV степени с умеренным ограничением подвижности

					(статодинамических) функций, нарушения функций сердечно-сосудистой, дыхательной системы, пищеварительной системы; мочевыделительной функции; МКФ: B 710 - 729, B 750 - 789, B 410 - 429, B 440 - 449, B 510 - 539, B 610 - 639	позвоночника, деформацией грудной клетки, при наличии осложнений с умеренными нарушениями функций организма. Состояние после реконструктивных операций с протяженной фиксацией не менее двух отделов позвоночника
13.3.1.3					Нарушения нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций, нарушения функций сердечно-сосудистой, дыхательной системы, пищеварительной системы; мочевыделительной функции; МКФ: B 710 - 789, B 410 - 429, B 440 - 449, B 510 - 539, B 610 - 639	Сколиоз и кифосколиоз IV степени с выраженным ограничением подвижности позвоночника, с грубой деформацией грудной клетки, при наличии выраженных нарушений функций внутренних органов
13.4		Остеопатии и хондропатии Нарушение плотности кости		M80 - M94 M80 - M85		

13.4.1			Остеопороз с патологическим переломом Остеопороз без патологического перелома	M80 M81		
13.4.1.1					Нарушения нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций, функций эндокринной системы и метаболизма; МКФ: B 710 - 729, B 750 - 789, B 540 - 559	Отсутствие переломов длинных трубчатых костей. Отсутствие деформаций или имеют место незначительные (менее 7 - 10°) деформации оси конечности/или позвоночника, без нарушения или с незначительным нарушением их функций. Z-критерий соответствует остеопении или остеопорозу. Лабораторные показатели фосфорно-кальциевого обмена с незначительными отклонениями. Rg-признаки остеопороза отсутствуют
13.4.1.2					Нарушения нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций, функций эндокринной системы и	Патологические переломы длинных трубчатых костей 1 раз в 2 - 3 года с длительным сроком консолидации, деформацией оси конечности более 10°, но менее 20°;

					метаболизма; МКФ: B 710 - 729, B 750 - 789, B 540 - 559	вторичная деформация оси позвоночника (сколиоз II и III степени), Z-критерий соответствует тяжелому остеопорозу. Лабораторные показатели фосфорно-кальциевого обмена - умеренные изменения. Выявляются начальные Rg-признаки остеопороза
13.4.1.3					Нарушения нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций, функций эндокринной системы и метаболизма; МКФ: B 710 - 729, B 750 - 789, B 540 - 559	Патологические переломы длинных трубчатых костей более 1 раза в год, спонтанные переломы. Длительные сроки консолидации. Выраженная (20° и более) деформация оси конечности, возникновение ложных суставов, вторичная деформация оси позвоночника с умеренным нарушением их функций. Z-критерий соответствует тяжелому остеопорозу (очень высокий риск переломов). Лабораторные показатели фосфорно-кальциевого обмена - умеренные, выраженные и значительно выраженные изменения

13.4.1.4					Нарушения нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций, функций эндокринной системы и метаболизма; МКФ: B 710 - 729, B 750 - 789, B 540 - 559	Возникновение спонтанного перелома длинных трубчатых костей при незначительных двигательных и физических нагрузках, включая вес собственного тела. Невозможность вертикализации из-за высокого риска возникновения спонтанного перелома
13.4.2			Остеомиелит (хронический)	M86		
13.4.2.1					Нарушения нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических), системы крови и иммунной системы, функций кожи и связанных с ней систем; МКФ: B 710 - 789, B 430 - 439, B 810 - 849	Редкие обострения (1 раз в год и реже), непродолжительные (менее 3 недель)
13.4.2.2					Нарушения нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических), системы крови и иммунной системы, функций кожи и связанных с ней систем;	Обострения свищевой формы остеомиелита средней частоты (до 2 раз в год), средней продолжительности (не менее 4 недель)

					МКФ: B 710 - 789; B 430 - 439; B 810 - 849	
13.4.2.3					Нарушения нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций, нарушения функций сердечно-сосудистой, дыхательной системы, пищеварительной системы, нарушение мочевыделительной функции, функций кожи и связанных с ней систем; МКФ: B 710 - 789, B 410 - 429, B 440 - 449, B 510 - 539, B 610 - B 639, B 810 - 849	Рецидивирующий остеомиелит: обострения частые (3 - 4 раза в год), длительные (более 4 недель). Формирование умеренных или выраженных контрактур в смежных суставах. Наличие осложнений
13.4.3			Остеонекроз	M87		
13.4.3.1					Нарушения нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций; МКФ: B 710 - 789	Односторонний некроз головки бедра в III - IV, рентгенологической стадии с НФС III степени в пораженном суставе (исход в деформирующий артроз)
13.4.3.2					Нарушения нейромышечных, скелетных и связанных с движением	Односторонний и двусторонний некроз головки бедра во II

					(статодинамических) функций; МКФ: B 710 - 789	рентгенологической стадии (остеонекроза и остеолизиса) на период иммобилизации
13.5			Эндопротезы			
13.5.1					Нарушения нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций; МКФ: B 710 - 789	Состояние после одностороннего и двустороннего эндопротезирования тазобедренных и коленных суставов; без осложнений эндопротезирования
13.5.2					Нарушения нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций; МКФ: B 710 - 789	Осложнения эндопротезирования с умеренными нарушениями функции организма
13.5.3					Нарушения нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций; МКФ - B 710 - 789	Осложнения эндопротезирования с выраженными нарушениями функции организма
14	Болезни мочеполовой системы (класс XIV) и патология с					

	поражением преимущественно органов мочеполовой системы, представленная в других классах болезней					
Примечание к пункту 14. Количественная оценка степени выраженности стойких нарушений мочевыделительной функции организма граждан в возрасте 18 лет и старше, об заболеваниями, последствиями травм или дефектами, основывается преимущественно на оценке степени выраженности нарушения функ соответствии с классификацией хронической болезни почек (далее - ХБП). В основе стратификации стадий ХБП лежит уровень СКФ. Учитыва другие факторы патологического процесса: форма и тяжесть течения заболевания, наличие и частота обострений, распространенность патологическ включение органов-мишеней, необходимость подавления иммунитета, наличие осложнений (вторичный пиелонефрит, мочекаменная болезнь и проч						
14.1		Гломерулярные болезни Тубулоинтерстициальные болезни почек Почечная недостаточность Мочекаменная болезнь Другие болезни почки и мочеточника		N00 - N08 N10 - N16 N17 - N19 N20 - N23 N25 - N29		

		Другие болезни мочевой системы Помощь, включающая гемодиализ Приобретенное отсутствие почки Агенезия и другие редукционные дефекты почки Интерстициальный цистит (хронический)		N30 - 39 Z49 Z90.5 Q60 N30.1 N30.2		
14.1.1					Нарушение мочевыделительной функции; МКФ: B 610 - B 639	ХБП 1 стадии, СКФ более 90 мл/мин/1,73 м^2; ХБП 2 стадии, СКФ в пределах 89 - 60 мл/мин/1,73 м ХБП 3А стадии, СКФ 59 - 45 мл/мин/1,73 м^2
14.1.2					Нарушения мочевыделительной функции, функций системы крови и иммунной системы;	ХБП 3Б стадии, СКФ 44 - 30 мл/мин/1,73 м^2. Нефротический/нефритический синдромы при

					МКФ: B 610 - 639, B 430 - 439	неэффективности лечения с умеренно выраженными нарушениями функций организма
14.1.3					Нарушения мочевыделительной функции, функций системы крови и иммунной системы; сердечно-сосудистой системы, дыхательной, эндокринной систем и метаболизма; МКФ: B 610 - 639, B 430 - 439, B 540 - 559, B 410 - 429; B 440 - 449	ХБП 4 стадии, СКФ 29 - 15 мл/мин/1,73 м^2, подготовка к диализу. ХБП 5 стадии (СКФ ниже 15 мл/мин/1,73 м^2) при отсутствии осложнений диализа
14.1.4					Нарушения мочевыделительной функции, функций системы крови и иммунной системы; сердечно-сосудистой системы, дыхательной, эндокринной систем и метаболизма; МКФ: B 610 - 639, B 430 - 439, B 540 - 559, B 410 - 429; B 440 - 449	ХБП 5 стадии, СКФ ниже 15 мл/мин/1,73 м^2, при наличии осложнений со значительно выраженными нарушениями функций организма
14.2			Наличие трансплантированной почки	Z94.0		

14.2.1					Нарушение мочевыделительной системы, нарушения психических функций, функций сердечно-сосудистой системы, системы крови и иммунной системы; эндокринной системы и метаболизма; МКФ: B 610 - 639, B 110 - 139, B 140 - 189, B 198, B 199, B 410 - 429, B 430 - 439, B 540 - 559	При первичном освидетельствовании - состояние после трансплантации почки
14.2.2					Нарушения мочевыделительной функции, нарушения психических функций, функций сердечно-сосудистой системы, системы крови и иммунной системы, эндокринной системы и метаболизма; МКФ: B 610 - 639, B 110 - 139, B 140 - 189, B 198, B 199, B 410 - 429, B 430 - 439, B 540 - 559	По истечении 2-летнего срока после трансплантации почки
14.2.3					Нарушения мочевыделительной	По истечении 2-летнего срока после трансплантации почки

					системы, нарушения психических функций, функций сердечно-сосудистой системы, системы крови и иммунной системы; эндокринной системы и метаболизма; МКФ: B 610 - 639, B 110 - 139, B 140 - 189, B 198, B 199, B 410 - 429, B 430 - 439, B 540 - 559	при наличии осложнений с выраженными нарушениями функций организма
14.2.4					Нарушения мочевыделительной системы, нарушения психических функций, функций сердечно-сосудистой системы, системы крови и иммунной системы; эндокринной системы и метаболизма; МКФ: B 610 - 639, B 110 - 139, B 140 - 189, B 198, B 199, B 410 - 429, B 430 - 439, B 540 - 559	По истечении 2-летнего срока после трансплантации почки при наличии осложнений со значительно выраженными нарушениями функций организма
14.3			Приобретенное отсутствие почки.	Z90.5		
			Агенезия и другие	Q60		

			редукционные дефекты почки			
14.3.1					Нарушения мочевыделительной функции, функций системы крови и иммунной системы; МКФ: B 610 - 639, B 430 - 439	Отсутствие нарушений или незначительные нарушения мочевыделительной функции единственной почки (проявления ХБП 1, 2 стадии)
14.3.2					Нарушения мочевыделительной функции, функций системы крови и иммунной системы МКФ: B 610 - 639, B 430 - 439	Умеренные нарушения мочевыделительной функции единственной почки (проявления ХБП 3 стадии)
14.3.3					Нарушения мочевыделительной функции, функций системы крови и иммунной системы; МКФ: B 610 - 639, B 430 - 439	Выраженные нарушения мочевыделительной функции единственной почки (проявления ХБП 4 стадии)
14.3.4					Нарушения мочевыделительной функции, функций системы крови и иммунной системы; МКФ: B 610 - 639, B 430 - 439	Значительно выраженные нарушения мочевыделительной функции единственной почки (проявления ХБП 5 стадии)
14.4			Врожденные аномалии (пороки развития)	Q50 - Q56		

			половых органов. Агенезия и аплазия матки. Врожденное отсутствие влагалища	 Q51.0 Q52.0		
14.4.1					Нарушение мочевыделительной функции; МКФ: B 610 - 639; B 640 - 679	Агенезия и аплазия матки, врожденное отсутствие влагалища, без пластической операции, после достижения 14 - летнего возраста
15	Травмы, отравления и некоторые другие последствия воздействия внешних причин (класс XIX), а также отдельные состояния, возникающие в перинатальном периоде (Болезни класса XVI)					
15.1		Термические и химические ожоги		T26 - T28		

		глаза и других внутренних органов				
15.1.1			Термический ожог пищевода Химический ожог пищевода	T28.1 T28.6		
15.1.1.1					Нарушения функции пищеварительной, эндокринной систем и метаболизма; МКФ: B 510 - 539, B 540 - 559	Последствия ожога пищевода с рубцовым сужением пищевода II степени после проведенного лечения с затруднением прохождения только твердой пищи, без потери массы тела
15.1.1.2					Нарушения функции пищеварительной, эндокринной систем и метаболизма; МКФ: B 510 - 539, B 540 - 559	Последствия ожога пищевода с рубцовым сужением пищевода III степени (субкомпенсация) с необходимостью планового бужирования. Наличие искусственного пищевода с умеренным нарушением функций пищеварительной системы
15.1.1.3					Нарушения функции пищеварительной, дыхательной, эндокринной систем и метаболизма	Последствия ожога пищевода с рубцовым сужением пищевода III степени и выше (декомпенсация) с

					МКФ: B 510 - 539, B 540 - 559, B 440 - 449	нарушением приема пищи (зондовое питание, наличие гастростомы и питание через нее); наличие осложнений (свищи) с выраженными нарушениями функций организма
15.1.1.4					Нарушения функции пищеварительной, дыхательной, эндокринной систем и метаболизма МКФ: B 510 - 539, B 540 - 559, B 440 - 449	Декомпенсация пищеварения (кахексия); неустранимые тяжелые последствия болезни; неэффективность многоэтапных реконструктивно-восстановительных хирургических вмешательств
15.1.2		Последствия термических и химических ожогов и отморожений		T95		
15.1.2.1			Последствия термических и химических ожогов и отморожений Последствия термического и химического ожога и отморожения головы и шеи	T95 T95.0		

			Последствия термического и химического ожога и отморожения туловища Последствия термического и химического ожога и отморожения верхней конечности Последствия термического и химического ожога и отморожения нижней конечности	T95.1 T95.2 T95.3		
15.1.2.2					Нарушения нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций, функции кожи и связанных с ней систем; МКФ: B 710 - 789, B 798, B 799, B 210 - 299, B 410 - 429, B 440 - 450, B 510 - 539, B 610 - 639, B 810 - 849	Последствия термических поражений III степени на ограниченных участках туловища и конечностей с вовлечением одного-двух смежных суставов ("стягивающие рубцы") и формированием умеренной контрактуры в функционально выгодном положении
15.1.2.3					Нарушения нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций, нарушения	Последствия термических поражений III степени с вовлечением одного-двух смежных суставов ("стягивающие рубцы") и

					сенсорных функций, функций сердечно-сосудистой, дыхательной, пищеварительной системы, мочевыделительной функции, функции кожи и связанных с ней систем; МКФ: B 710 - 789, B 798, B 799, B 210 - 299, B 410 - 429, B 440 - 450, B 510 - 539, B 610 - 639, B 810 - 849	формированием выраженной контрактуры в функционально невыгодном положении. Наличие осложнений с умеренными нарушениями функций организма
15.1.2.4					Нарушения нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций, нарушения сенсорных функций, функций сердечно-сосудистой, дыхательной, пищеварительной системы, мочевыделительной функции, функции кожи и связанных с ней систем; МКФ: B 710 - 789, B 798, B 799, B 210 - 299, B 410 - 429, B 440 - 450, B 510 - 539, B 610 - 639, B 810 - 849	Последствия термических поражений III степени с вовлечением 2 и более суставов ("стягивающие рубцы") и формированием резко выраженных контрактур и/или анкилозов в функционально невыгодном положении. Наличие осложнений с выраженными нарушениями функций организма
15.1.2.5					Нарушения	Последствия

					нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций, нарушения сенсорных функций, функций сердечно-сосудистой, дыхательной, пищеварительной системы, мочевыделительной функции, функции кожи и связанных с ней систем; МКФ: B 710 - 789, B 798, B 799, B 210 - 299, B 410 - 429, B 440 - 450, B 510 - 539, B 610 - 639, B 810 - 849	распространенных термических поражений III степени и виде множественных порочных установок крупных суставов и ригидных деформаций скелета. Наличие осложнений со значительно выраженными нарушениями функций организма
15.1.3		Последствия травм головы		T90		
15.1.3.1			Последствия открытого ранения головы Последствия перелома черепа и костей лица	T90.1 T90.2		
15.1.3.1.1					Нарушения нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций; МКФ: B 710 - 789, B 798, B 799	Дефект костей черепа размером 3 x 3 см и менее с пластикой и без нее

15.1.3.1.2					Нарушения нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций; МКФ: B 710 - 789, B 798, B 799	Дефект костей черепа размером более 3 x 3 см при наличии пульсации ТМО в области дефекта
15.1.3.1.3					Нарушения нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций; МКФ: B 710 - 789, B 798, B 799	Значительный дефект костей черепа размером 10 x 10 см и более
15.1.4		Последствия травм шеи и туловища		T91		
15.1.4.1					Нарушения нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций; МКФ: B 710 - 789, B 798, B 799	Последствия неосложненных переломов позвоночника с незначительным или умеренным ограничением объема движений позвоночника, без неврологической симптоматики. Наличие стабильной металлоконструкции небольшой протяженности (в пределах одного отдела

						позвоночника)
15.1.4.2					Нарушения нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций, нарушения мочевыделительной функции, функций пищеварительной системы; МКФ: B 710 - 789, B 798, B 799, B 610 - 639, B 510 - 539	Последствия осложненных переломов позвоночника с наличием неврологической симптоматики, достигающей умеренной степени, нестабильность металлоконструкции любой протяженности после проведенного оперативного лечения
15.1.4.3					Нарушения нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций; функций пищеварительной системы, мочевыделительной функции; МКФ: B 710 - 789, B 798, B 799, B 510 - 539, B 610 - 639	Последствия осложненных переломов позвоночника с выраженной неврологической симптоматикой
15.1.4.4					Нарушения нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций, функций пищеварительной системы, мочевыделительной функции;	Последствия осложненных переломов позвоночника с полным анатомическим прерыванием спинного мозга, со значительно выраженной неврологической симптоматикой, нарушением функции тазовых органов

					МКФ: B 710 - 789, B 798, B 799, B 510 - 539, B 610 - 639	
15.1.5			Последствия травм верхней конечности Дефекты, укорачивающие верхнюю конечность	T92 Q71		
Последствия травм плечевого сустава						
15.1.5.1					Нарушения нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций; МКФ: B 710 - 789, B 798, B 799	Ограничение движения плечевого сустава, включая плечевой пояс (отведение и/или сгибание плеча от 90° до 120° с соответствующим ограничением отведения и ротационных движений). Нестабильность одного плечевого сустава, включая редкие вывихи плеча. Псевдоартроз плечевой кости стабильный. Анкилоз плечевого сустава в функционально выгодном положении (угол отведения 45°, при сгибании руки до 30 - 45°) при хорошо подвижном плечевом поясе
15.1.5.2					Нарушения нейромышечных, скелетных	Нестабильность плечевого сустава тяжелой степени,

					и связанных с движением (статодинамических) функций; МКФ: B 710 - 789, B 798, B 799	включая "болтающийся" сустав (тяжелый дефект проксимального отдела плеча). Псевдоартроз нестабильный плечевой кости. Культя верхней конечности на уровне плеча или в локтевом суставе
15.1.5.3					Нарушения нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций; МКФ: B 710 - 789, B 798, B 799	Культя плеча после вычленения с частью плечевого пояса
15.1.5.4					Нарушения нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций; МКФ: B 710 - 789, B 798, B 799	Двусторонние культи верхних конечностей на любом уровне (плечо, предплечье, кисть)
Последствия травм локтевого сустава						
15.1.5.5					Нарушения нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций;	Ограничение движения в локтевом суставе незначительная степень (разгибание/сгибание до 0 - 30 - 120° при неограниченной

					МКФ: B 710 - 789, B 798, B 799	ротации предплечья). Анкилоз локтевого сустава в функционально выгодном положении (сгибание 70° - 110°, пронация 0 - 10°). Анкилоз проксимального лучелоктевого сустава с установкой предплечья в функционально выгодном или невыгодном положении. Псевдоартроз костей предплечья стабильный (локтевой или лучевой кости, или обеих костей с тугоподвижностью)
15.1.5.6					Нарушения нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций; МКФ: B 710 - 789, B 798, B 799	Анкилоз обеих локтевых суставов в функционально невыгодном положении. Анкилоз проксимального лучелоктевого сустава с установкой предплечья в функционально невыгодном положении "Болтающийся" локтевой сустав. Культя верхней конечности на уровне предплечья или кисти
15.1.5.7					Нарушения нейромышечных, скелетных и связанных с движением	Анкилоз обоих локтевых суставов в функционально невыгодном положении

					(статодинамических) функций; МКФ: B 710 - 789, B 798, B 799	
15.1.5.8					Нарушения нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций; МКФ: B 710 - 789, B 798, B 799	Двусторонние культи верхних конечностей на любом уровне (плечо, предплечье, кисть)
Последствия травм лучезапястного сустава						
15.1.5.9					Нарушения нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций; МКФ: B 710 - 789, B 798, B 799	Ограничение подвижности кистевого сустава, незначительная/умеренная степень (разгибание/сгибание до 30 - 40°) одностороннее/двустороннее. Анкилоз одного кистевого сустава в функционально выгодном (разгибание 15°) или невыгодном положении
15.1.5.10					Нарушения нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций; МКФ: B 710 - 789, B 798, B 799	Ограничение подвижности в обоих кистевых суставах выраженной степени. Анкилоз обоих кистевых суставов в функционально невыгодном положении

Последствия травм пальцев кистей рук						
15.1.5.11					Нарушения нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций; МКФ: B 710 - 789, B 798, B 799	Отсутствие дистальной фаланги и части основной первого пальца кисти. Отсутствие первого пальца кисти, в том числе с первым лучом кисти. Отсутствие одного трехфалангового пальца кисти, в том числе с соответствующей пястной костью. Отсутствие двух или трех (исключая первый) трехфаланговых пальцев кисти. Отсутствие одного или двух пальцев (любых, включая I) на одной кисти
15.1.5.12					Нарушения нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций; МКФ: B 710 - 789, B 798, B 799	Отсутствие двух трехфаланговых пальцев кисти с отсутствием первого пальца. Отсутствие трех трехфаланговых пальцев кисти с отсутствием первого пальца. Отсутствие первых пальцев обеих кистей. Отсутствие всех пальцев

						одной кисти. Полное отсутствие всех трехфаланговых пальцев одной кисти
15.1.5.13					Нарушения нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций; МКФ: B 710 - 789, B 798, B 799	Отсутствие всех трехфаланговых пальцев с сохраненными II - V пястными костями на обеих кистях
15.1.5.14					Нарушения нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций; МКФ: B 710 - 789, B 798, B 799	Отсутствие всех пальцев обеих кистей
15.1.6			Последствия травм нижней конечности Дефекты, укорачивающие нижнюю конечность	T93 Q72		
Последствия травм тазобедренного сустава, культи на уровне бедра						
15.1.6.1					Нарушения нейромышечных, скелетных и связанных с движением	Ограничение движения в тазобедренных суставах: одностороннее

					(статодинамических) функций; МКФ: B 710 - 789, B 798, B 799	незначительной/умеренной степени или двустороннее незначительной степени
15.1.6.2					Нарушения нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций; МКФ: B 710 - 789, B 798, B 799	Ограничение движения в тазобедренных суставах: выраженной степени одного или умеренной степени в обоих, Культя одной нижней конечности, пригодная для типичного протезирования
15.1.6.3					Нарушения нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций; МКФ: B 710 - 789, B 798, B 799	Ограничение движения выраженной степени обоих тазобедренных суставов. Культя одной нижней конечности на любом уровне бедра при ампутационной культе другой нижней конечности на уровне голени. Двусторонние ампутационные культи на уровне нижней и средней трети бедер. Двусторонние ампутационные культи на уровне голеней и стоп
15.1.6.4					Нарушения нейромышечных, скелетных и связанных с движением	Анкилоз обоих тазобедренных суставов в функционально невыгодном положении со

					(статодинамических) функций; МКФ: B 710 - 789, B 798, B 799	значительно выраженным нарушением статодинамической функции. Культи обеих нижних конечностей на уровне верхней трети бедер
Последствия травм коленного сустава						
15.1.6.5					Нарушения нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций; МКФ: B 710 - 789, B 798, B 799	Ограничение движения в одном или обоих коленных суставах незначительной/умеренной степени. Анкилоз коленного сустава в функционально выгодном положении (положение сгибания от 10 - 15°)
15.1.6.6					Нарушения нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций МКФ: B 710 - 789, B 798, B 799	Анкилоз обоих коленных суставов в функционально невыгодном положении с умеренными нарушениями статодинамических функций. Культя одной нижней конечности на любом уровне голени при опороспособности и подвижности другой нижней конечности
15.1.6.7					Нарушения нейромышечных, скелетных и связанных с движением	Анкилоз обоих коленных суставов в функционально невыгодном положении с

					(статодинамических) функций; МКФ: B 710 - 789, B 798, B 799	выраженными нарушениями статодинамических функций. Культя одной нижней конечности на любом уровне голени при частичной потере опороспособности и подвижности другой нижней конечности. Культи обеих нижних конечностей на любом уровне голени
Последствия травм голеностопного сустава, пальцев ног, стоп, культи стоп						
15.1.6.8					Нарушения нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций; МКФ: B 710 - 789, B 798, 799	Анкилоз голеностопного сустава в функционально выгодном/невыгодном положении (сгибание/разгибание 0° - 5°) одно- или двустороннее. Анкилоз пальцев одной или обеих стоп в функционально выгодном положении или деформация пальцев одной или обеих стоп. Культя стопы односторонняя: по Лисфранку; в области плюсневых костей по Шарпу. Отсутствие всех пальцев обеих стоп
15.1.6.9					Нарушения	Культя стопы односторонняя:

					нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций; МКФ: B 710 - 789, B 798, B 799	по Пирогову; по Шопару. Культи обеих стоп: по Лисфранку, Шарпу II - III
15.1.6.10					Нарушения нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций; МКФ: B 710 - 789, B 798, B 799	Культя обеих стоп: по Пирогову
15.1.7			Последствия травм, захватывающих несколько областей тела	T94		
15.1.7.1					Нарушения нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций; МКФ: B 710 - 789, B 798, B 799	Отсутствие обеих верхних конечностей на любом уровне (кистей, предплечий, плеч). Отсутствие одной верхней конечности и отсутствие одной нижней конечности вне зависимости от стороны поражения. Культя одной верхней конечности на любом уровне плеча и культя одной нижней конечности на любом уровне бедра вне зависимости от

						стороны поражения. Культи обеих верхних и обеих нижних конечностей
15.1.8		Перелом пояснично-крестцового отдела позвоночника и костей таза (отдаленные последствия)		T94		
15.1.8.1					Нарушения нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций; функций пищеварительной системы, мочевыделительной функции; МКФ: B 710 - 789, B 798, B 799, B 510 - 539, B 610 - 639	Стабильное тазовое кольцо, дегенеративные изменения крестцово-подвздошных суставов с незначительными нарушениями функций организма
15.1.8.2					Нарушения нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций; функций пищеварительной системы, мочевыделительной функции; МКФ: B 710 - 789, B 798, B	Деформации тазового кольца, осложненные повреждением тазовых органов (уретры, мочевого пузыря, прямой кишки) с умеренными нарушениями функций организма

					799, B 510 - 539; B 610 - 639	
15.1.8.3					Нарушения нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций; функций пищеварительной системы, мочевыделительной функции; МКФ: B 710 - 789, B 798, B 799, B 510 - 539, B 610 - 639	Деформации тазового кольца, осложненные повреждением тазовых органов (уретры, мочевого пузыря, прямой кишки) с выраженными нарушениями функций организма

Приложение N 2
к классификациям и критериям,
используемым при осуществлении
медико-социальной экспертизы
федеральными государственными
учреждениями медико-социальной
экспертизы, утвержденным приказом
Министерства труда и социальной
защиты Российской Федерации
от 27 августа 2019 г. N 585н

КОЛИЧЕСТВЕННАЯ СИСТЕМА ОЦЕНКИ СТЕПЕНИ ВЫРАЖЕННОСТИ СТОЙКИХ НАРУШЕНИЙ ФУНКЦИЙ ОРГАНИЗМА РЕБЕНКА В ВОЗРАСТЕ ДО 18 ЛЕТ, ОБУСЛОВЛЕННЫХ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ, ПОСЛЕДСТВИЯМИ ТРАВМ ИЛИ ДЕФЕКТАМИ (В ПРОЦЕНТАХ, ПРИМЕНИТЕЛЬНО К КЛИНИКО-ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ ХАРАКТЕРИСТИКЕ СТОЙКИХ НАРУШЕНИЙ ФУНКЦИЙ ОРГАНИЗМА ЧЕЛОВЕКА)

Сокращения слов, используемых в настоящем приложении:

АХЭП - антихолинэстеразные препараты;

БЦЖ - вакцина против туберкулеза, приготовленная из штамма ослабленной живой туберкулезной палочки;

БЭН - белково-энергетическая недостаточность;

ВИЧ - вирус иммунодефицита человека;

ВК - врачебная комиссия;

ВРВ - варикозно расширенные вены;

ВРВП - варикозно расширенные вены пищевода;

ДН - дыхательная недостаточность;

ИФР - инсулиноподобный фактор роста;

ИМТ - индекс массы тела;

МБТ - микобактерии туберкулеза;

МКФ - Международная классификация функционирования, ограничений жизнедеятельности и здоровья;

МПКТ - минеральная плотность костной ткани;

МРТ - магнитно-резонансная томография;

НПВП - нестероидные противовоспалительные препараты;

НЯК - неспецифический язвенный колит;

ОНР - общее недоразвитие речи;

ПГ - портальная гипертензия;

ПИТРС - препараты, изменяющие течение рассеянного склероза;

ПНД - психоневрологический диспансер;

ПТФБ - посттромбофлебитическая болезнь;

СНР - системное недоразвитие речи;

СТГ - соматотропный гормон;

ТМО - твердая мозговая оболочка;

ФА - фенилаланин;

ФК - функциональный класс;

ФКУ - фенилкетонурия;

ХАН - хроническая артериальная недостаточность;

ХБП - хроническая болезнь почек;

ХВН - хроническая венозная недостаточность;

ХДН - хроническая дыхательная недостаточность;

ХЕ - хлебная единица;

ХСН - хроническая сердечная недостаточность;

ЦНС - центральная нервная система.

N п/п	Классы болезней (по МКБ-10)	Блоки болезней (по МКБ-10)	Наименования болезней, травм или дефектов и их последствия	Рубрика МКБ-10 (код)	Виды стойких расстройств функций организма ребенка в возрасте до 18 лет. Рубрика МКФ	Клинико-функциональная характеристика стойких нарушений функций организма ребенка в возрасте до 18 лет, обусловленных заболеваниями, последствиями травм или дефектами
1	Некоторые инфекционные и паразитарные болезни (класс I)			A00 - B99		
Примечание к пункту 1. Количественная оценка степени нарушений функции организма ребенка в возрасте до 18 лет (дыхательной, сердечно-сосудистой, других систем о туберкулезе различной локализации зависит от клинической формы заболевания, рентгенологической стадии, периода и фазы процесса, наличи выделения микобактерии туберкулеза (МБТ+ или МБТ- соответственно), течения заболевания (осложненного и неосложненного), характера и вида том числе от проводимой химиотерапии), а также от эффективности проводимого лечения и формирования резистентности к нему.						
1.1			Туберкулез органов дыхания, подтвержденный бактериологически и гистологически Туберкулез органов дыхания, не подтвержденный бактериологически или гистологически	A15 A16		

1.1.1					Нарушения функций дыхательной системы, сердечно-сосудистой системы; МКФ: B 440 - 449, B 410 - 429	Для детей в возрасте 0 - 1 лет: незначительные нарушени функции дыхательно системы при эффективно окончании основного курс лечения, в периоде потер активности (рубцевание обызвествление) бе признаков бактериовыделени (МБТ-), без остаточны изменений и осложнений. Отсутствие дыхательно недостаточности или ДН степени
1.1.2					Нарушения функций дыхательной системы, сердечно-сосудистой системы; МКФ: B 440 - 449, B 410 - 429	Для детей в возрасте 0 - 1 лет: умеренные нарушени функции дыхательно системы при отсутстви положительной клинико-рентгенологической динамики на фон химиотерапии; пр сохранении бактериовыделения (МБТ+) периоде потери активности и/или при наличи остаточных изменений посл излеченного туберкулез органов дыхания (локальны

						пневмофиброз, фиброзно-очаговые изменения). С ДН II степени преходящей или постоянно легочной гипертензией (ХСН 0 или ХСН 1 стадии). Наличие МБТ+ 6 и боле месяцев
1.1.3					Нарушения функций дыхательной системы, сердечно-сосудистой системы; МКФ: B 440 - 449, B 410 - 429	Для детей в возрасте 0 - 1 лет: выраженные нарушени функции дыхательно системы пр неэффективности химиотерапии; пр сохранении бактериовыделения (МБТ+) периоде потери активности и/или при наличи остаточных изменений посл излеченного туберкулез (пневмосклероз, цирроз бронхоэктазы) и осложнений. Наличие ДН II, III степени ХСН IIA стадии
1.1.4					Нарушения функций дыхательной системы, сердечно-сосудистой системы, пищеварительной системы;	Для детей в возрасте 0 - 1 лет: значительно выраженны нарушения функци организма вследствие наличи

					МКФ: B 440 - 449, B 410 - 429, B 510 - 539	полиорганных осложнени (амилоидоз, полисерозить кахексия и так далее). Наличие ДН III степени ХСН IIБ или III стадии
1.2			Туберкулез нервной системы Туберкулез других органов Милиарный (диссеминированный, генерализованный) туберкулез легких	A17 A18 A19		
1.2.1					Нарушения психических, языковых и речевых, сенсорных, нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций, нарушения функций сердечно-сосудистой, дыхательной, пищеварительной, эндокринной систем и метаболизма, мочевыделительной функции, функции кожи и связанных с ней систем;	Для детей в возрасте 0 - 1 лет: незначительные нарушени функций организм вследствие проявлени туберкулеза различно локализации в периоде потер активности (рубцевание обызвествление; МБТ-); пр эффективном окончани основного курса лечения Отсутствие дыхательно недостаточности или наличи ДН I степени

					МКФ: B 110 - 199, B 310 - 399, B 210 - 299, B 710 - 799, B 410 - 429, B 440 - 449, B 510 - 539, B 540 - 559, B 430 - 439, B 610 - 639, B 810 - 899	
1.2.2					Нарушения психических, языковых и речевых, сенсорных, нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций, нарушения функций сердечно-сосудистой, дыхательной, пищеварительной, эндокринной систем и метаболизма, мочевыделительной функции, функции кожи и связанных с ней систем; МКФ: B 110 - 199, B 310 - 399, B 210 - 299, B 710 - 799, B 410 - 429, B 440 - 449, B 510 - 539, B 540 - 559, B 430 - 439, B 610 - 639, B 810 - 899	Для детей в возрасте 0 - 1 лет: умеренные нарушени функций организм вследствие проявлени туберкулеза различно локализации (МБТ+ ил МБТ-) и /или осложнений. Наличие ДН II степени преходящая или постоянна легочная гипертензия (ХСН или ХСН 1 стадии)
1.2.3					Нарушения психических, языковых и речевых,	Для детей в возрасте 0 - 1 лет:

					сенсорных, нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций, нарушения функций сердечно-сосудистой, дыхательной, пищеварительной, эндокринной систем и метаболизма, мочевыделительной функции, функции кожи и связанных с ней систем; МКФ: B 110 - 199, B 310 - 399, B 210 - 299, B 710 - 799, B 410 - 429, B 440 - 449, B 510 - 539, B 540 - 559, B 430 - 439, B 610 - 639, B 810 - 899	выраженные нарушени функций организм вследствие проявлени туберкулеза различно локализации (МБТ+ ил МБТ-) и/или осложнений. Проявления множественно или широкой лекарственно устойчивости микобактериям туберкулеза. Наличие ДН II, III степени ХСН IIA стадии
1.2.4					Нарушения психических, языковых и речевых, сенсорных, нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций, нарушения функций сердечно-сосудистой, дыхательной, пищеварительной,	Для детей в возрасте 0 - 1 лет: значительно выраженны нарушения функци организма вследстви проявлений туберкулез различной локализации полиорганными осложнениями (амилоидо полисерозиты, кахексия прочее); Неэффективност

					эндокринной систем и метаболизма, мочевыделительной функции, функции кожи и связанных с ней систем; МКФ: B 110 - 199, B 310 - 399, B 210 - 299, B 710 - 799, B 410 - 429, B 440 - 449, B 510 - 539, B 540 - 559, B 430 - 439, B 610 - 639, B 810 - 899	или резистентность к терапии Наличие ДН III степени ХСН IIБ или III стадии
1.3			Последствия туберкулеза	B90		
1.3.1					Нарушения психических, языковых и речевых, сенсорных, нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций, нарушения функций сердечно-сосудистой системы, дыхательной, пищеварительной, эндокринной систем и метаболизма, мочевыделительной функции, функции кожи и связанных с ней систем; МКФ: B 110 - 199, B 310 - 399, B 210 - 299, B 710 -	Для детей в возрасте 0 - 1 лет: незначительные нарушени функций организм вследствие отдаленны проявлений последстви излеченного туберкулез различной локализации неуточненного туберкулез (фиброзные, фиброзно-очаговые, буллезно-дистрофические изменения, плевропневмосклероз, пневмоцирроз, последстви хирургических вмешательст и прочее, МБТ-) пр отсутствии дыхательно

					799, B 410 - 429, B 440 - 449, B 510 - 539, B 540 - 559, B 430 - 439, B 610 - 639, B 810 - 899	недостаточности либ наличии ДН I стадии
1.3.2					Нарушения психических, языковых и речевых, сенсорных, нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций, нарушения функций сердечно-сосудистой системы, дыхательной, пищеварительной, эндокринной систем и метаболизма, мочевыделительной функции; функции кожи и связанных с ней систем; МКФ: B 110 - 199, B 310 - 399, B 210 - 299, B 710 - 799, B 410 - 429, B 440 - 449, B 510 - 539, B 540 - 559, B 430 - 439, B 610 - 639, B 810 - 899	Для детей в возрасте 0 - 1 лет: умеренные нарушени функций организм вследствие отдаленны проявлений последстви излеченного туберкулез различной локализации неуточненного туберкулез (фиброзные, фиброзно-очаговые, буллезно-дистрофические изменения, плевропневмосклероз, пневмоцирроз, последстви хирургических вмешательст и прочее, МБТ-). Наличие ДН II степени преходящая или постоянна легочная гипертензия (ХСН или ХСН 1 стадии)
1.3.3					Нарушения психических, языковых и речевых, сенсорных, нейромышечных, скелетных	Для детей в возрасте 0 - 1 лет: выраженные нарушени функций организм

					и связанных с движением (статодинамических) функций, нарушения функций сердечно-сосудистой системы, дыхательной, пищеварительной, эндокринной систем и метаболизма, мочевыделительной функции; функции кожи и связанных с ней систем; МКФ: B 110 - 199, B 310 - 399, B 210 - 299, B 710 - 799, B 410 - 429, B 440 - 449, B 510 - 539, B 540 - 559, B 430 - 439, B 610 - 639, B 810 - 899	вследствие отдаленны проявлений последстви излеченного туберкулез различной локализации неуточненного туберкулез (фиброзные, фиброзно-очаговые, распространенные буллезно-дистрофические изменения, плевропневмосклероз, пневмоцирроз, последстви хирургических вмешательст и прочее, МБТ-). Наличие ДН II III степени ХСН IIA стадии
1.3.4					Нарушения психических, языковых и речевых, сенсорных, нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций, нарушения функций сердечно-сосудистой системы, дыхательной, пищеварительной, эндокринной систем и метаболизма,	Для детей в возрасте 0 - 1 лет: значительно выраженны нарушения функци организма вследстви отдаленных проявлени последствий излеченног туберкулеза различно локализации и неуточненног туберкулеза (распространенные фиброзные, фиброзно-очаговые,

					мочевыделительной функции; функции кожи и связанных с ней систем; МКФ: B 110 - 199, B 310 - 399, B 210 - 299, B 710 - 799, B 410 - 429, B 440 - 449, B 510 - 539, B 540 - 559, B 430 - 439, B 610 - 639, B 810 - 899	буллезно-дистрофические изменения, значительно протяженности плевропневмосклероз, пневмоцирроз, последстви хирургических вмешательст и прочее, МБТ-). Наличие ДН III степени, ХС IIБ или III стадии
1.4		Осложнения после введения вакцины БЦЖ		Y58		
1.4.1			Ятрогенный туберкулезный остит (БЦЖ-остит)	Y58.0		
1.4.1.1					Нарушения нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций, функций системы крови и иммунной системы; МКФ: B 710 - 799, B 430 - 439	Для детей в возрасте 0 - 1 лет: после завершения лечения пр наличии незначительны нарушений функци организма
1.4.1.2					Нарушения нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций, функций системы крови и иммунной системы;	Для детей в возрасте 0 - 1 лет: после завершения лечения пр наличии умеренны нарушений функци организма;

					МКФ: B 710 - 799, B 430 - 439	0 - 7 лет: на перио длительного (более 6 месяцев лечения, включающег специфическую противотуберкулезную терапию двумя и боле препаратами
1.4.1.3					Нарушения нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций; функций системы крови и иммунной системы; МКФ: B 710 - 799, B 430 - 439	Для детей в возрасте 0 - 1 лет: после завершения лечения пр наличии выраженны нарушений функци организма
1.5			Болезнь, вызванная вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ) Бессимптомный инфекционный статус	B20 - B24 Z21		
1.5.1					Нарушения функции системы крови и иммунной системы; МКФ: B 430 - 439	Для детей в возрасте 0 - 1 лет: бессимптомный инфекционный статус вызванный вирусом иммунодефицита человека. ВИЧ-инфекция: стадия 3 (субклиническая);

						стадия 4А (вторичны заболеваний), фаза ремисси (спонтанная, после АРТ, н фоне АРТ). Отсутствие ил незначительные нарушени функций организма
1.5.2					Нарушение функции системы крови и иммунной системы, нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций, функций сердечно-сосудистой, дыхательной, эндокринной систем и метаболизма, пищеварительной системы, мочевыделительной функции, нарушения психических функций; МКФ: B 430 - 439, B 710 - 799, B 410 - 429, B 440 - 449, B 540 - 559, B 510 - 539, B 610 - 639, B 110 - 199	Для детей в возрасте 0 - 1 лет: ВИЧ-инфекция: стадия 4А (вторичных заболеваний) фаза прогрессирования. Умеренные нарушени функций организма
1.5.3					Нарушение функции системы крови и иммунной системы, нейромышечных, скелетных и связанных с движением	Для детей в возрасте 0 - 1 лет: ВИЧ-инфекция: стадия 4Б (вторичны заболеваний) независимо о

					(статодинамических) функций, функций сердечно-сосудистой, дыхательной, эндокринной систем и метаболизма, пищеварительной системы, мочевыделительной функции, нарушения психических функций; МКФ: B 430 - 439, B 710 - 799, B 410 - 429, B 440 - 449, B 540 - 559, B 510 - 539, B 610 - 639, B 110 - 199	фазы заболевания. Выраженные нарушени функций организма
1.5.4					Нарушение функции системы крови и иммунной системы, нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций, функций сердечно-сосудистой, дыхательной, эндокринной систем и метаболизма, пищеварительной системы, мочевыделительной функции, нарушения психических функций; МКФ: B 430 - 439, B 710 - 799, B 410 - 429, B 440 - 449, B 540 - 559, B 510 - 539, B 610 - 639, B 110 - 199	Для детей в возрасте 0 - 1 лет: ВИЧ-инфекция: стадия 4В (вторичны заболеваний) независимо о фазы заболевания; терминальная стадия. Значительно выраженны нарушения функци организма

2	Новообразования (класс II)			C00 - D48		

Примечание к пункту 2.
Количественная оценка степени выраженности стойких нарушений функций организма ребенка в возрасте до 18 лет при злокачественных нов
зависит от клинико-морфологических факторов прогноза; локализации и размера опухоли (до 2 см, от 2 до 5 см, 5 см и более); анатомической
(эндофитная, экзофитная, смешанная); темпа роста опухоли, степени прорастания стенки органа (степень инвазии); гистологического вариа
дифференцировки опухоли (высокодифференцированная, средней степени дифференцировки, низкодифференцированная, недифференцированна
распространенности поражения лимфатических узлов; наличия или отсутствия отдаленных метастазов (в лимфатические узлы или другие ор
опухолевого процесса (клиническая классификация по системе TNMG до лечения, классификация pTNM - по результатам хирургического вмеша
гистологического исследования). Количественная оценка нарушенных функций организма при опухолях эмбриональной и герминоген
лимфогранулематозе и других основывается как на классификации TNMG, так и на Международной системе стадирования, одобренной М
обществом детских онкологов (SIOP - International Society of Pediatric Oncology): INSS (1993) при нейробластоме; PRETEXT и POSTTEX
гепатобластоме; ABC (2001) при ретинобластоме; SIOP (1992) при нефробластоме; FIGO (1988) при герминогенной опухоли яичников;
герминогенных опухолей яичек; Ann-Arbor (1971) при лимфогранулематозе; PNHLSS(2015) - для неходжинских лимфом. Также необходимо учи
заболевания до и после оперативного вмешательства, до и после проведения неоадъювантной химиотерапии; оценку гистологического типа
количественной оценке степени выраженности нарушенных функций большое значение имеет наличие генетических маркеров, определяющих не
онкопрогноз: амплификация гена N-MYC и делеция короткого плеча первой хромосомы (нейробластома); мутация гена RB1 (ретинобластома);
WT1, WT2 и WT3 (нефробластома); наличие изохромосомы i в 12p (герминогенная опухоль) и прочее - по результатам молекулярно-генетического
Учитываются также общебиологические факторы (пол, возраст, соматический фон), вид и объем лечения (химиотерапия, гормонотерапия, хирургич
лучевая терапия, перфузия противоопухолевыми препаратами, различные комбинации видов лечения), наличие осложнений как самого забол
проводимого лечения.

2.1		Злокачественные новообразования		C00 - C97		
2.1.1					Нарушения психических, языковых и речевых, сенсорных функций, нарушения нейромышечных, скелетных и связанных с движением	Для детей в возрасте 0 - 1 лет: при первичном освидетельствовании с любым видом и формой злокачественного

					(статодинамических) функций, нарушения функций сердечно-сосудистой системы, дыхательной, пищеварительной, эндокринной систем и метаболизма, системы крови и иммунной системы, мочевыделительной функции, функции кожи и связанных с ней систем; МКФ: B 110 - 199, B 310 - 399, B 210 - 299, B 710 - 799, B 410 - 429, B 440 - 449, B 510 - 539, B 540 - 559, B 430 - 439, B 610 - 639, B 810 - 899	новообразования с учето классификации по систем TNMG (и/или п международной систем стадирования) на весь перио лечения при отсутстви осложнений и наличи положительного результата о проводимого лечения
2.1.2					Нарушения психических, языковых и речевых, сенсорных функций, нарушения нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций, нарушения функций сердечно-сосудистой системы, дыхательной, пищеварительной, эндокринной систем и	Для детей в возрасте 0 - 1 лет: при первично освидетельствовании с любы видом и формо злокачественного новообразования с учето классификации по систем TNMG (и/или п международной систем стадирования) на весь перио лечения при наличи осложнений; пр

					метаболизма, системы крови и иммунной системы, мочевыделительной функции, функции кожи и связанных с ней систем; МКФ: B 110 - 199, B 310 - 399, B 210 - 299, B 710 - 799, B 410 - 429, B 440 - 449, B 510 - 539, B 540 - 559, B 430 - 439, B 610 - 639, B 810 - 899	резистентности опухоли комбинированному лечени или его неэффективности
2.1.3					Нарушения психических, языковых и речевых, сенсорных функций, нарушения нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций, нарушения функций сердечно-сосудистой системы, дыхательной, пищеварительной, эндокринной систем и метаболизма, системы крови и иммунной системы, мочевыделительной функции, функции кожи и связанных с ней систем; МКФ: B 110 - 199, B 310 - 399, B 210 - 299, B 710 -	Для детей в возрасте 0 - 1 лет: после завершения лечения достижения стойкой ремисси (5 лет и более) благоприятным онкопрогнозом

					799, B 410 - 429, B 440 - 449, B 510 - 539, B 540 - 559, B 430 - 439, B 610 - 639, B 810 - 899	
2.1.4					Нарушения психических, языковых и речевых, сенсорных функций, нарушения нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций, нарушения функций сердечно-сосудистой системы, дыхательной, пищеварительной, эндокринной систем и метаболизма, системы крови и иммунной системы, мочевыделительной функции, функции кожи и связанных с ней систем; МКФ: B 110 - 199, B 310 - 399, B 210 - 299, B 710 - 799, B 410 - 429, B 440 - 449, B 510 - 539, B 540 - 559, B 430 - 439, B 610 - 639, B 810 - 899	Для детей в возрасте 0 - 1 лет: после завершения лечения пр наличии осложнений умеренными нарушениям функций организма
2.1.5					Нарушения психических, языковых и речевых,	Для детей в возрасте 0 - 1 лет:

					сенсорных функций, нарушения нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций, нарушения функций сердечно-сосудистой системы, дыхательной, пищеварительной, эндокринной систем и метаболизма, системы крови и иммунной системы, мочевыделительной функции, функции кожи и связанных с ней систем; МКФ: B 110 - 199, B 310 - 399, B 210 - 299, B 710 - 799, B 410 - 429, B 440 - 449, B 510 - 539, B 540 - 559, B 430 - 439, B 610 - 639, B 810 - 899	в период проведения лечени и после завершения его пр наличии осложнений выраженными нарушениям функций организма
2.1.6					Нарушения психических, языковых и речевых, сенсорных функций, нарушения нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций, нарушения функций	Для детей в возрасте 0 - 1 лет: в период проведения лечени и после завершения его пр наличии рецидива метастазов, продолженног роста опухоли посл радикального лечения других осложнений с

					сердечно-сосудистой системы, дыхательной, пищеварительной, эндокринной систем и метаболизма, системы крови и иммунной системы, мочевыделительной функции, функции кожи и связанных с ней систем; МКФ: B 110 - 199, B 310 - 399, B 210 - 299, B 710 - 799, B 410 - 429, B 440 - 449, B 510 - 539, B 540 - 559, B 430 - 439, B 610 - 639, B 810 - 899	значительно выраженным нарушениями функци организма
Примечание к подпунктам 2.1.3 - 2.1.6. При повторном освидетельствовании количественная оценка нарушенных функций организма ребенка в возрасте до 18 лет проводится с учетом проведенного лечения, наличия ремиссии или возникновения рецидивов, метастазов, осложнений, продолженного роста опухоли после радикал наличия противопоказаний к оперативному лечению и возможности проведения только паллиативного вмешательства, а также с учетом не проводимой терапии (химиотерапия, лучевая терапия и их комбинации).						
2.2			Доброкачественные новообразования	D00 - D48		
Примечание к подпункту 2.2. Количественная оценка стойких нарушений функций организма ребенка в возрасте до 18 лет при доброкачественных новообразованиях зависит от размера опухоли, темпа роста опухоли, гормональной активности, наличия рецидива или продолженного роста после удаления, степени влияния на органы (сдавление, смещение); возможности радикального удаления, результатов проведенной операции (осложнение, дефицит структур, наруш органа), гистологической структуры опухоли. Маркером неблагоприятного клинического и реабилитационного прогноза являются опухоли в локализации с быстрым ростом, вызывающие сдавление и дислокацию ствола мозга; неэффективность лечения (продолженный рост опухоли), хирургического лечения.						

2.2.1					Нарушения психических, языковых и речевых, сенсорных, нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций, функций сердечно-сосудистой, дыхательной, пищеварительной, эндокринной систем и метаболизма, системы крови и иммунной системы, мочевыделительной функции, функции кожи и связанных с ней систем; МКФ: B 110 - 199, B 310 - 399, B 210 - 299, B 710 - 799, B 410 - 429, B 440 - 449, B 510 - 539, B 540 - 559, B 430 - 439, B 610 - 639, B 810 - 899	Для детей в возрасте 0 - 1 лет: доброкачественные опухол различной локализации при небольших размерах ил отсутствии роста (медленно росте), опухоли без влияни на функцию смежны структур и/или органов гормонально неактивны опухоли; опухоли посл проведенного радикальног оперативного лечения пр отсутствии признако рецидива или продолженног роста опухоли
2.2.2					Нарушения психических, языковых и речевых, сенсорных, нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций, функций сердечно-сосудистой, дыхательной,	Для детей в возрасте 0 - 1 лет: доброкачественные опухол различной локализации при больших размерах опухоли влиянием на положение функцию смежных органов требующих оперативног лечения; при быстром рост

					пищеварительной, эндокринной систем и метаболизма, системы крови и иммунной системы, мочевыделительной функции, функции кожи и связанных с ней систем; МКФ: B 110 - 199, B 310 - 399, B 210 - 299, B 710 - 799, B 410 - 429, B 440 - 449, B 510 - 539, B 540 - 559, B 430 - 439, B 610 - 639, B 810 - 899	опухоли с появлением влияния на положение функцию смежных органов невозможности радикальног ее устранения (возможност лишь частичного удаления) гормонально активны опухоли, приводящие умеренным нарушения функций организма; посл проведенного оперативног лечения (радикального ил нерадикального) при наличи умеренных нарушени функций организма
2.2.3					Нарушения психических, языковых и речевых, сенсорных, нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций, функций сердечно-сосудистой, дыхательной, пищеварительной, эндокринной систем и метаболизма, системы крови и иммунной системы, мочевыделительной функции, функции кожи и связанных с ней систем;	Для детей в возрасте 0 - 1 лет: доброкачественные опухол различной локализаци (преимущественно головног и спинного мозга) при быстром росте опухоли выраженным влиянием н положение и функци смежных органов невозможности радикальног ее удаления; гормонально активны опухоли, приводящие выраженным нарушения функций организма; посл

					МКФ: B 110 - 199, B 310 - 399, B 210 - 299, B 710 - 799, B 410 - 429, B 440 - 449, B 510 - 539, B 540 - 559, B 430 - 439, B 610 - 639, B 810 - 899	проведенного оперативног лечения (радикального ил нерадикального) при наличи продолженного рост опухоли; при наличии выраженны нарушений функци организма
2.2.4			'		Нарушения психических, языковых и речевых, сенсорных, нарушения нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций, функций сердечно-сосудистой, дыхательной системы, пищеварительной, эндокринной систем и метаболизма, системы крови и иммунной системы, мочевыделительной функции; функции кожи и связанных с ней систем; МКФ: B 110 - 199, B 310 - 399, B 210 - 299, B 710 - 799, B 410 - 429, B 440 - 449, B 510 - 539, B 540 - 559, B 430 - 439, B 610 - 639, B 810 - 849, B 898 - 899	Для детей в возрасте 0 - 1 лет: значительно выраженны нарушения функци организма, невозможност радикального оперативног лечения или посл проведенного оперативног лечения

3	Болезни крови, кроветворных органов и отдельные нарушения, вовлекающие иммунный механизм (класс III), и патология других органов и систем организма, вовлекающая иммунный механизм, и представленная в других классах болезней			D50 - D89		
Примечание к пункту 3. Количественная оценка степени выраженности стойких нарушений функций организма ребенка в возрасте до 18 лет при болезнях крови, кроветвор отдельных нарушениях, вовлекающих иммунный механизм, зависит от вида и тяжести течения заболевания (по данным клинико-лабораторного частоты и тяжести кризов, наличия и вида кровоизлияний во внутренние органы, а также в полости крупных суставов (некритические или жизнеуг поражения органов-мишеней, вида, объема и эффективности проводимого лечения (в том числе от регулярного применения стимуляторов гемопоэз компонентов крови или трансплантации костного мозга), резистентности к проводимой терапии; наличия осложнений (в том числе от проводимо степени нарушения функции других органов и систем организма, прогноза заболевания.						
3.1		Другие болезни крови и кроветворных органов		D70 - D77		

3.1.1			Гипоспленизм (аспления послеоперационная, атрофия селезенки) Врожденные аномалии селезенки (аспления)	D73.0 Q89.0		
3.1.1.1					Нарушение функций системы крови и иммунной системы; МКФ: B 430 - 439	Для детей в возрасте 0 - 1 лет: незначительные нарушени функций организма пр отсутствии селезенки
3.1.1.2					Нарушение функций системы крови и иммунной системы; МКФ: B 430 - 439	Для детей в возрасте 0 - 1 лет: наличие рецидивирующи инфекционных заболеваний приводящих к осложнениям умеренными нарушениям функций организма
3.1.2			Агранулоцитоз	D70		
3.1.2.1					Нарушение функций системы крови и иммунной системы; МКФ: B 430 - 439	Для детей в возрасте 0 - 1 лет: при отсутствии осложнени после проведенног эффективного лечения достижения стойко длительной ремиссии
3.1.2.2					Нарушение функций системы крови и иммунной	Для детей в возрасте 0 - 1 лет:

					системы; МКФ: B 430 - 439	рецидивирующее течени заболевания, наличи инфекционных осложнений умеренными нарушениям функций организма на фон постоянной базисной терапии
3.1.2.3					Нарушение функций системы крови и иммунной системы; МКФ: B 430 - 439	Для детей в возрасте 0 - 1 лет: рецидивирующее течени заболевания, наличи инфекционных осложнений выраженными нарушениям функций организма на фон постоянной базисной терапии
3.1.2.4					Нарушение функций системы крови и иммунной системы; МКФ: B 430 - 439	Для детей в возрасте 0 - 1 лет: рецидивирующее тяжело течение заболевания, наличи инфекционных осложнений с значительно выраженным нарушениями функци организма на фон постоянной базисной терапии Необходимость трансплантации гемопоэтических стволовы клеток
3.2		Гемолитические анемии		D55 - D59		

		Серповидно-клеточные нарушения Другие апластические анемии Другие анемии		D57 D61 D64		
3.2.1					Нарушения функций системы крови и иммунной системы, функций сердечно-сосудистой, дыхательной, пищеварительной систем, мочевыделительной функции; МКФ: B 430 - 439, B 410 - 429, B 440 - 449, B 510 - 539, B 610 - 639	Для детей в возрасте 0 - 1 лет: нетяжелая степен апластической анеми (отсутствие необходимости регулярных трансфузия эритроцитарной массы и/ил тромбоконцентрата); легка форма гемолитическо анемии (гемолитически кризов нет или они редкие, интервалом в несколько лет); длительная ремиссия посл спленэктомии по повод гемолитической анемии; при серповидно-клеточны нарушениях - редкие (не чащ 2 раз в месяц) болевые кризы купируемые НПВП (общи режим)
3.2.2					Нарушения функций системы крови и иммунной системы, функций	Для детей в возрасте 0 - 1 лет: тяжелая степен

					сердечно-сосудистой, дыхательной, пищеварительной систем, мочевыделительной функции; МКФ: B 430 - 439, B 410 - 429, B 440 - 449, B 510 - 539, B 610 - 639	апластической анеми гемолитическая анеми средней тяжести (наличи гемолитических кризо средней частоты - 1 - 2 раза год) на фоне постоянно базисной терапии с развитие анемии, требующе заместительной терапии направленной н стабилизацию гемоглобина; при серповидно-клеточны нарушениях - часты (еженедельные) болевы кризы, купируемы ненаркотическими анальгетиками, требующи соблюдения домашнег режима или обращений з неотложной помощью
3.2.3					Нарушения функций системы крови и иммунной системы, сердечно-сосудистой, дыхательной, пищеварительной систем, мочевыделительной функции, нарушение психических функций; МКФ: B 430 - 439, B 410 - 429, B 440 - 449, B 510 -	Для детей в возрасте 0 - 1 лет: сверхтяжелая степен апластической анемии; тяжелая форм гемолитической анеми (частые гемолитически кризы - более 2 раз в год); наличие осложнени заболевания и проводимог постоянного базисног

					539, B 610 - 639, B 110 - 199	лечения; при серповидно-клеточны нарушениях - часты (еженедельные) болевы кризы, купируемы анальгетиками (включа наркотические) и/ил требующие госпитализации
3.3			Наличие другого трансплантированного органа или ткани (костного мозга)	Z94.8		
Первичное освидетельствование						
3.3.1					Нарушения функций системы крови и иммунной системы, сердечно-сосудистой, дыхательной, эндокринной систем и метаболизма, пищеварительной системы, мочевыделительной функции, нарушения психических функций; МКФ: B 430 - 439, B 410 - 429, B 440 - 449, B 540 - 559, B 510 - 539, B 610 - 639, B 110 - 199	Для детей в возрасте 0 - 1 лет: после трансплантаци костного мозга на срок 5 ле (период лечения)
Повторное освидетельствование (через 5 лет после трансплантации костного мозга)						

3.3.2					Нарушения функций системы крови и иммунной системы, сердечно-сосудистой, дыхательной, эндокринной систем и метаболизма, пищеварительной системы, мочевыделительной функции, нарушения психических функций; МКФ: B 430 - 439, B 410 - 429, B 440 - 449, B 540 - 559, B 510 - 539, B 610 - 639, B 110 - 199	Для детей в возрасте 0 - 1 лет: при наличии осложнений умеренными нарушениям функций организма
3.3.3					Нарушения функции системы крови и иммунной системы, сердечно-сосудистой, дыхательной, эндокринной систем и метаболизма, пищеварительной системы, мочевыделительной функции, нарушения психических функций; МКФ: B 430 - 439, B 410 - 429, B 440 - 449, B 540 - 559, B 510 - 539, B 610 - 639, B 110 - 199	Для детей в возрасте 0 - 1 лет: при наличии осложнений выраженными нарушениям функций организма
3.3.4					Нарушения функции системы крови и иммунной	Для детей в возрасте 0 - 1 лет:

					системы, сердечно-сосудистой, дыхательной, эндокринной систем и метаболизма, пищеварительной системы, мочевыделительной функции, нарушения психических функций; МКФ: B 430 - 439, B 410 - 429, B 440 - 449, B 540 - 559, B 510 - 539, B 610 - 639, B 110 - 199	при наличии осложнений с значительно выраженным нарушениями функци организма
3.4		Нарушения свертываемости крови, пурпура и другие геморрагические состояния		D65 - D69		
Примечание к подпункту 3.4. Количественная оценка степени выраженности стойких нарушений функций организма ребенка в возрасте до 18 лет, обусловленных ге коагулопатией, тромбоцитопатией и пурпурой, основывается на оценке тяжести заболевания, которая коррелирует с частотой и объемом заместите частотой и разновидностью кровотечений, а также с эффективностью проводимой терапии.						
3.4.1			Наследственный дефицит фактора VIII (гемофилия A) Наследственный дефицит фактора IX (гемофилия B)	D66 D67		

			Болезнь Виллебранда	D68.0		
			Наследственный дефицит фактора XI (гемофилия C)	D68.1		
			Наследственный дефицит фактора I (фибриногена); наследственный дефицит фактора II (гипопротромбинемия); наследственный дефицит фактора V (лабильного); наследственный дефицит фактора VII (стабильного); наследственный дефицит фактора X (Стюарта-Прауэра);	D68.2		
			наследственный дефицит фактора XII (Хагемана); наследственный дефицит фактора XIII (фибринстабилизирующего); дисфибриногенемия (врожденная), гипопроконвертинемия; Болезнь Оврена	D68.3		
			Геморрагические нарушения,	D68.3		

			обусловленные циркулирующими в крови антикоагулянтами Ингибиторы к факторам свертывания крови Приобретенный дефицит фактора свертывания Различные комбинации врожденного дефицита II, VII, IX и X факторов свертывания	D68.4		
3.4.1.1					Нарушения функций системы крови и иммунной системы; МКФ: B 430 - 439	Для детей в возрасте 0 - 1 лет: легкая форма заболевания пр отсутствии кровотечений либ с редкими (не более 1 раза год) кровотечениями требующими обращения медицинскую организацию не требующих заместительно терапии и/или н приводящими к развитию анемии; отсутствие кровоизлияний суставы и/ил мышцы/внутренние органы; нерегулярное использовани концентратов факторо свертывания крови и/ил

						препаратов крови профилактической целью (пр оперативных вмешательства или травмах). Для гемофилии А и В минимальная степен активности факторо свертывания VIII/IX 5% более
3.4.1.2					Нарушения функций системы крови и иммунной системы, нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций, сердечно-сосудистой, дыхательной, эндокринной систем и метаболизма, пищеварительной системы, мочевыделительной функции, нарушения психических функций; МКФ: B 430 - 439, B 710 - 789, B 410 - 429, B 440 - 449, B 540 - 559, B 510 - 539, B 610 - 639, B 110 - 199	Для детей в возрасте 0 - 1 лет: легкая и среднетяжелая форм заболевания с редкими (н более 3 раз в год кровотечениями, требующим заместительной терапии и/ил с развитием анеми кровоизлияния в суставы и/или мышцы/внутренни органы не более 1 раза в год. Для гемофилии А и В минимальная степен активности факторо свертывания VIII/IX от 2 д 5%
3.4.1.3					Нарушения функций системы крови и иммунной системы, нейромышечных,	Для детей в возрасте 0 - 1 лет: среднетяжелая и тяжела

					скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций, сердечно-сосудистой, дыхательной, эндокринной систем и метаболизма, пищеварительной системы, мочевыделительной функции, нарушения психических функций; МКФ: B 430 - 439, B 710 - 789, B 410 - 429, B 440 - 449, B 540 - 559, B 510 - 539, B 610 - 639, B 110 - 199	форма заболеваний с частым повторными (от 1 до 6 раз год) кровотечениями требующими заместительно терапии и госпитализации; кровоизлияния в суставы и/или мышцы/внутренни органы не более 2 - 3 раз год. Наличие гемофилическо артропатии 1 и более крупны суставов; наличие умеренной/выраженной контрактуры одного крупног сустава. Для гемофилии A и B минимальная степен активности факторо свертывания VIII/IX менее 1 2%. Регулярное использовани концентратов факторо свертывания крови и/ил препаратов крови профилактической целью
3.4.1.4					Нарушения функций системы крови и иммунной системы, нейромышечных, скелетных и связанных с движением	Для детей в возрасте 0 - 1 лет: тяжелые формы заболеваний частыми повторными (6 более раз в год

					(статодинамических) функций, сердечно-сосудистой, дыхательной, эндокринной систем и метаболизма, пищеварительной системы, мочевыделительной функции, нарушения психических функций; МКФ: B 430 - 439, B 710 - 789, B 410 - 429, B 440 - 449, B 540 - 559, B 510 - 539, B 610 - 639, B 110 - 199	кровотечениями, с склонностью к частым (боле 3 раз в год) тяжелы кровотечениям (в том числ спонтанным) на фон постоянной терапии кровоизлияния в суставы и/или мышцы более 3 раз год и/или кровоизлияния в внутренние органы более раз в год, и/или любой эпизо внутричерепного кровоизлияния и/ил повторные эпизоды почечны кровотечений. Для гемофилии A и B минимальная степен активности факторо свертывания VIII/IX мене 1%. Наличие ингибиторно гемофилии с титро ингибитора > 0,6 БЕ
3.4.2			Качественные дефекты тромбоцитов: тромбастения, болезнь Гланцманна, болезнь Бернара-Сулье, синдром Скотта, дефицит/дефект мобилизации пулов хранения тромбоцитов,	D69.1		

			дефект сигнальных путей тромбоцитов, другие формы. Другие первичные тромбоцитопении MYH9-ассоциированная тромбоцитопения, семейная тромбоцитопения с предрасположенностью к миелодисплазии, синдром "серых" тромбоцитов, средиземноморская макротромбоцитопения и другие	D69.4		
3.4.2.1					Нарушения функций системы крови и иммунной системы, нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций, функций сердечно-сосудистой, дыхательной, эндокринной систем и метаболизма, пищеварительной системы, мочевыделительной функции, нарушения психических функций;	Для детей в возрасте 0 - 1 лет: легкая форма заболевания пр отсутствии кровотечений либ с редкими (не более 1 раза год) кровотечениями требующими обращения медицинскую организацию не требующих заместительно терапии и/или н приводящими к развитию анемии; отсутствие кровоизлияний суставы и/ил

					МКФ: B 430 - 439; B 710 - 789, B 410 - 429, B 440 - 449, B 540 - 559, B 510 - 539, B 610 - 639, B 110 - 199	мышцы/внутренние органы; нерегулярное использовани концентратов факторо свертывания крови и/ил препаратов крови профилактической целью (пр оперативных вмешательства или травмах); для гемофилии A и B активность факторо свертывания VIII/IX более 5% (учитывается минимальна степень активности факторо свертывания VIII/IX)
3.4.2.2					Нарушения функций системы крови и иммунной системы, нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций, функций сердечно-сосудистой, дыхательной, эндокринной систем и метаболизма, пищеварительной системы, мочевыделительной функции, нарушения психических функций; МКФ: B 430 - 439; B 710 - 789, B 410 - 429, B 440 - 449, B 540 - 559, B 510 -	Для детей в возрасте 0 - 1 лет: легкая и среднетяжелая форм заболевания с редкими (н более 3 раз в год кровотечениями, требующи заместительной терапии и/ил с развитием анемии; кровоизлияния в суставы и/или мышцы/внутренни органы не более 1 раза в год для гемофилии A и B активность факторо свертывания VIII/IX от 2 д 5% (учитываетс минимальная степен активности факторо

					539, B 610 - 639, B 110 - 199	свертывания VIII/IX)
3.4.2.3					Нарушения функций системы крови и иммунной системы, нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций, функций сердечно-сосудистой, дыхательной, эндокринной систем и метаболизма, пищеварительной системы, мочевыделительной функции, нарушения психических функций; МКФ: B 430 - 439; B 710 - 789, B 410 - 429, B 440 - 449, B 540 - 559, B 510 - 539, B 610 - 639, B 110 - 199	Для детей в возрасте 0 - 1 лет: среднетяжелая и тяжела форма заболеваний повторными (более 1 до 6 ра в год) кровотечениями требующими заместительно терапии и/ил госпитализации; кровоизлияния в суставы и/или мышцы/внутренни органы не более 2 - 3 раз год; наличие хроническог синовиита и/или артропати одного крупного сустава; для гемофилии A и B активность факторо свертывания VIII/IX 1 - 2% (учитывается минимальна степень активности факторо свертывания VIII/IX); регулярное использовани концентратов факторо свертывания крови и/ил препаратов крови профилактической гемостатической целью
3.4.2.4					Нарушения функций	Для детей в возрасте 0 - 1

					системы крови и иммунной системы, нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций, функций сердечно-сосудистой, дыхательной, эндокринной систем и метаболизма, пищеварительной системы, мочевыделительной функции, нарушения психических функций; МКФ: B 430 - 439; B 710 - 789, B 410 - 429, B 440 - 449, B 540 - 559, B 510 - 539, B 610 - 639, B 110 - 199	лет: тяжелые формы заболеваний частыми повторными (6 более раз в год кровотечениями, с склонностью к частым (боле 3 раз в год) тяжелы кровотечениям (в том числ спонтанным); кровоизлияния в суставы и/или мышцы более 3 раз год и/или кровоизлияния в внутренние органы более раз в год, и/или любой эпизо внутричерепного кровоизлияния и/ил повторные эпизоды почечны кровотечений: признаки хроническог синовиита и/или артропати более чем одного крупног сустава; для гемофилии A и B активность факторо свертывания VIII/IX менее 1% (учитывается минимальна степень активности факторо свертывания VIII/IX); наличие ингибиторно гемофилии с титро ингибитора > 0,6 БЕ

3.4.3			Первичная тромбофилия дефицит Антитромбина носительство FV Leiden (аномалия фактора V-мутация Лейдена); мутация гена протромбина FII G20210A; недостаточность антитромбина, протеинов C и S Другая тромбофилия; синдром антикардиолипина, антифосфолипидный синдром, наличие волчаночного антикоагулянта	D68.5 D68.6		
3.4.3.1					Нарушения функций системы крови и иммунной системы, нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций, функций сердечно-сосудистой, дыхательной, эндокринной систем и метаболизма, пищеварительной системы, мочевыделительной	Для детей в возрасте 0 - 1 лет: легкая форма заболевания пр отсутствии тромбоза анамнезе, требующа первичной фармакологической антитромботической профилактики только ситуациях присоединившегося высоког тромботического риск

					функции, нарушения психических функций; МКФ: B 430 - 439; B 710 - 789, B 410 - 429, B 440 - 449, B 540 - 559, B 510 - 539, B 610 - 639, B 110 - 199	(тяжелый инфекционны процесс, крупны хирургические вмешательств и прочее)
3.4.3.2					Нарушения функций системы крови и иммунной системы, нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций, функций сердечно-сосудистой, дыхательной, эндокринной систем и метаболизма, пищеварительной системы, мочевыделительной функции, нарушения психических функций; МКФ: B 430 - 439; B 710 - 789, B 410 - 429, B 440 - 449, B 540 - 559, B 510 - 539, B 610 - 639, B 110 - 199	Для детей в возрасте 0 - 1 лет: среднетяжелая форм заболевания с однократны случаем спровоцированног тромбоза (не идиопатически тромбоз), не приводящая развитию ПТФБ, требующа курса вторично фармакологической профилактики
3.4.3.3					Нарушения функций системы крови и иммунной системы, нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических)	Для детей в возрасте 0 - 1 лет: тяжелая форма заболевания повторными спровоцированными тромбозами (не более 2-

					функций, функций сердечно-сосудистой, дыхательной, эндокринной систем и метаболизма, пищеварительной системы, мочевыделительной функции, нарушения психических функций; МКФ: B 430 - 439; B 710 - 789, B 410 - 429, B 440 - 449, B 540 - 559, B 510 - 539, B 610 - 639, B 110 - 199	случаев) или с 1 случаем н спровоцированного тромбоз (идиопатический вариант) требующая курса вторично профилактики. Дефицит протеин C/S/антитромбина от 12 д 50% у детей в возрасте старш 1 года
3.4.3.4					Нарушения функций системы крови и иммунной системы, нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций, функций сердечно-сосудистой, дыхательной, эндокринной систем и метаболизма, пищеварительной системы, мочевыделительной функции, нарушения психических функций; МКФ: B 430 - 439; B 710 - 789, B 410 - 429, B 440 - 449, B 540 - 559, B 510 - 539, B 610 - 639, B 110 - 199	Для детей в возрасте 0 - 1 лет: тяжелая и крайне тяжела форма заболевания с боле чем 2 случаям спровоцированного тромбоз (не идиопатический тромбоз и/или более чем с 1 случае идиопатического тромбоза и/или с 2 и более случаям тромбоза сосудов ЦНС внутренних органов тромбоэмболии легочно артерии вне зависимости о наличия/отсутствия видимо причины для тромбоза значительно выраженны нарушения функци организма.

						Дефицит протеина С/ антитромбина менее 12% детей в возрасте старше 1 год
3.4.4			Пурпура и другие геморрагические состояния Идиопатическая тромбоцитопеническая пурпура	D69 D69.3		
3.4.4.1					Нарушения функций системы крови и иммунной системы; МКФ: B 430 - 439	Для детей в возрасте 0 - 1 лет: легкая форма заболевани (снижение тромбоцитов от 3 000 до 50 000/мкл), лечени преимущественно амбулаторных условиях
3.4.4.2					Нарушения функций системы крови и иммунной системы; МКФ: B 430 - 439	Для детей в возрасте 0 - 1 лет: среднетяжелая форм заболевания (стойко снижение тромбоцитов от 2 000 до 30 000/мкл) необходимостью стационарного лечения применения гормональной цитостатической терапии терапии агонистам тромбопоэтиновых рецепторов (далее - ТПО

						и/или необходимость переливания компонентов крови реже 1 раза в месяц
3.4.4.3					Нарушения функций системы крови и иммунной системы, нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций, функций сердечно-сосудистой, дыхательной, эндокринной систем и метаболизма, пищеварительной системы, мочевыделительной функции, нарушения психических функций; МКФ: B 430 - 439, B 710 - 789, B 410 - 429, B 440 - 449, B 540 - 559, B 510 - 539, B 610 - 639, B 110 - 199	Для детей в возрасте 0 - 1 лет: тяжелая форма заболевания (стойкое снижение тромбоцитов от 10 000 до 2 000/мкл) с необходимостью стационарного лечения применения гормональной цитостатической терапии терапии агонистами ТПО и/или необходимость переливания компонентов крови не реже 1 раза месяц наличие кровоизлияний в внутренние органы
3.4.4.4					Нарушение функции системы крови и иммунной системы; нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций, нарушения функций сердечно-сосудистой,	Для детей в возрасте 0 - 1 лет: тяжелая форма заболевания стойкое снижение тромбоцитов менее 1 000/мкл с необходимостью стационарного лечения применения гормональной цитостатической терапии ил

					дыхательной, эндокринной систем и метаболизма, пищеварительной системы, мочевыделительной функции, нарушения психических функций; МКФ: B 430 - 439, B 710 - 789, B 410 - 429, B 440 - 449, B 540 - 559, B 510 - 539, B 610 - 639, B 110 - 139, B 140 - 189, B 198, B 199	терапии агонистами ТПО длительно (до 6 месяцев и более) и/или необходимость переливания компонентов крови чаще 1 раза в 1 месяц; кровоизлияния во внутренние органы, спонтанные кровотечения, опасные для жизни
3.5		Отдельные нарушения, вовлекающие иммунный механизм		D80 - D89		
3.5.1			Иммунодефициты с преимущественной недостаточностью антител Комбинированные иммунодефициты Иммунодефициты, связанные с другими значительными дефектами Обычный вариабельный	D80 D81 D82 D83		

			иммунодефицит Другие иммунодефициты Дефект в системе комплемента	 D84 D84.1		
3.5.1.1					Нарушения функций системы крови и иммунной системы; МКФ: B 430 - 439	Для детей в возрасте 0 - 1 лет: без клинической симптоматики или с редким (до 3 - 4 раз в год) недлительными (10 - 14 дней) инфекционными заболеваниями различной этиологии, поддающимися базисной терапии, минимальные изменения данных лабораторно-иммунологического обследования (согласно заключению иммунолога). Отсутствие осложнений или осложнения незначительными нарушениями функции организма
3.5.1.2					Нарушения функций системы крови и иммунной системы, нарушения функций сердечно-сосудистой,	Для детей в возрасте 0 - 1 лет: наличие инфекционных осложнений с умеренными нарушениями функци

					дыхательной, пищеварительной систем, мочевыделительной функции, нарушения психических функций; МКФ: B 430 - 439, B 410 - 429, B 440 - 449, B 510 - 539, B 610 - 639, B 110 - 139, B 140 - 189, B 198, B 199	организма на фон постоянной базисной терапии
3.5.1.3					Нарушения функций системы крови и иммунной системы, нарушения функций сердечно-сосудистой, дыхательной, пищеварительной систем, мочевыделительной функции, нарушения психических функций; МКФ: B 430 - 439, B 410 - 429, B 440 - 449, B 510 - 539, B 610 - 639, B 110 - 139, B 140 - 189, B 198, B 199	Для детей в возрасте 0 - 1 лет: наличие инфекционны осложнений с выраженным нарушениями функци организма на фон постоянной базисной терапии
4	Болезни эндокринной системы, расстройства питания и			E00 - E90		

	нарушения обмена веществ (класс IV) и патология органов эндокринной системы, представленная в других классах					
Примечание к пункту 4. Количественная оценка степени выраженности стойких нарушений функций организма ребенка в возрасте до 18 лет при болезнях эндокри расстройствах питания и нарушениях обмена веществ зависит от характера и степени выраженности клинической симптоматики заболевани клинических и инструментальных методов исследования, а также возможности компенсации нарушенных функций с применением современных ме и реабилитации. Особенностью эндокринной патологии детского возраста является компенсация на фоне своевременно начатой заместительной те же время, склонность к хроническому прогредиентному течению эндокринопатий при отсутствии компенсации на фоне заместительной терапии стойкое нарушение функций организма, нарушение физического, полового и психомоторного развития ребенка уже на ранних сроках развития (до 3						
4.1		Болезни щитовидной железы		E00 - E07		
4.1.1			Врожденный гипотиреоз с диффузным зобом Врожденный гипотиреоз без зоба	E03.0 E03.1		
4.1.1.1					Нарушения психических, речевых и языковых, нейромышечных, скелетных и связанных с движением	Для детей в возрасте 0 - 1 лет: незначительные нарушени психических и други

					(статодинамических) функций, функций эндокринной системы и метаболизма, функций сердечно-сосудистой системы; МКФ: B 110 - 139, B 140 - 189, B 198, B 199, B 310 - 340, B 398, 399; B 710 - 789, B 798, B 799, B 540 - 559, B 410 - 429	функций организма на фон адекватной заместительно терапии: 0 - 3 года: незначительно отставание физического психомоторного и раннег речевого развития; 4 - 15 лет: IQ = 70 - 79 балло (детский, WPPSI или WISC); 16 - 17 лет: IQ = 65 - 69 балло (взрослый WAIS)
4.1.1.2					Нарушения психических, речевых и языковых, нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций, функций эндокринной системы и метаболизма, функций сердечно-сосудистой системы; МКФ: B 110 - 139, B 140 - 189, B 198, B 199, B 310 - 340, B 398, 399; B 710 - 789, B 798, B 799, B 540 - 559, B 410 - 429	Для детей в возрасте 0 - 1 лет: умеренные нарушени психических и други функций организма на фон адекватной заместительно терапии: 0 - 3 года: умеренно отставание физического психомоторного и раннег речевого развития; 4 - 15 лет: IQ = 55 - 69 балло (детский, WPPSI или WISC); 16 - 17 лет: IQ = 55 - 64 балло (взрослый WAIS)
4.1.1.3					Нарушения психических, речевых и языковых, нейромышечных, скелетных и связанных с движением	Для детей в возрасте 0 - 1 лет: выраженные нарушени психических и други

					(статодинамических) функций, функций эндокринной системы и метаболизма, функций сердечно-сосудистой системы; МКФ: B 110 - 139, B 140 - 189, B 198, B 199, B 310 - 340, B 398, 399; B 710 - 789, B 798, B 799, B 540 - 559, B 410 - 429	функций организма на фон адекватной заместительно терапии: 0 - 3 года: выраженно отставание физического психомоторного и раннег речевого развития 4 - 17 лет: IQ = 35 - 55 баллов
4.1.1.4					Нарушения психических, речевых и языковых, нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций, функций эндокринной системы и метаболизма, функций сердечно-сосудистой системы; МКФ: B 110 - 139, B 140 - 189, B 198, B 199, B 310 - 340, B 398, 399; B 710 - 789, B 798, B 799, B 540 - 559, B 410 - 429	Для детей в возрасте 0 - 1 лет: значительно выраженны нарушения психических других функций организма н фоне адекватно заместительной терапии: 0 - 3 года: значительн выраженное отставани физического, психомоторног и раннего речевого развития, 4 - 17 лет: IQ < 35 баллов
4.2		Сахарный диабет		E10 - E14		
Примечание к подпункту 4.2. Количественная оценка степени выраженности стойких нарушений функций организма ребенка в возрасте до 18 лет, обусловленных сахарным ди						

(далее - СД) в детском возрасте, учитывает длительность и характер течения заболевания в различные возрастные периоды, лабильность теч осложнений, а также способность самостоятельно осуществлять контроль за течением и терапией заболевания, то есть подсчет хлебных едини адекватности количества вводимого инсулина. технику введения инсулина, оценку потребности в инсулине короткого действия на 1 ХЕ в различное возможностью коррекции его дозы в зависимости от исходного уровня гликемии; обученность ребенка производить измерения уровня глюкоз глюкометра с последующим анализом зарегистрированных показателей (ведение дневника самоконтроля). Данные навыки оцениваются, исходя из уровня эмоционально-волевой зрелости, состояния когнитивных процессов и уровня интеллектуального ра (на основании заключения ВК медицинской организации с привлечением психолога, по показаниям - психиатра) и в среднем формируются при заболевания не менее 3 лет.						
4.2.1			Инсулинзависимый сахарный диабет	E10		
4.2.1.1					Нарушения функций эндокринной системы и метаболизма; МКФ: B 540 - 559	Для детей в возрасте 0 - 1 лет: при наличи сформированного устойчивого самоконтроля з течением заболевания осуществлением терапии пр компенсации сахарног диабета и/или пр незначительном нарушени функции со сторон органов-мишеней отсутствии осложнений
4.2.1.2					Нарушения психических, сенсорных, нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций, функций	Для детей в возрасте 0 - 1 лет: при первично освидетельствовании: впервы установленный диагноз; при повторно

					сердечно-сосудистой, эндокринной систем и метаболизма, мочевыделительной функции, функции кожи и связанных с ней систем; МКФ: B 110 - 199, B 210 - 299, B 710 - 799, B 410 - 429, B 540 - 559, B 610 - 639, B 810 - 899	освидетельствовании: достижение полной ил частичной эффективност проводимой терапи (адекватность инсулинотерапии, в том числ помповой), в возрастно периоде, в которо невозможен самостоятельны контроль за течение заболевания осуществлением инсулинотерапии
4.2.1.3					Нарушения психических, сенсорных, нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций, функций сердечно-сосудистой, эндокринной систем и метаболизма, мочевыделительной функции, функции кожи и связанных с ней систем; МКФ: B 110 - 199, B 210 - 299, B 710 - 799, B 410 - 429, B 540 - 559, B 610 - 639, B 810 - 899	Для детей в возрасте 15 - 1 лет: при первично освидетельствовании: впервы установленный диагноз; пр повторном освидетельствовании пр наличии одного ил нескольких показателей: - лабильного течения диабет (колебания гликемии пределах 10 ммоль/л и более течение 10 дней по данны глюкометра), в том числе н фоне помпово инсулинотерапии; наличие 1 и боле верифицированных

						осложнений при длительност заболевания 3 и более лет незначительными нарушениями функци организма; верифицированного осложнения (осложнений) умеренными нарушениям функций организма: при отсутстви сформированного устойчивого самоконтроля з течением заболевания осуществлением терапии пр длительности заболевания н менее 3 лет (по заключени ВК медицинско организации)
4.2.1.4					Нарушения психических, сенсорных, нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций, функций сердечно-сосудистой, эндокринной систем и метаболизма, мочевыделительной функции, функции кожи и связанных с ней систем; МКФ: B 110 - 199, B 210 -	Для детей в возрасте 0 - 1 лет: при повторно освидетельствовании пр наличии верифицированног осложнения (осложнений) выраженными нарушениям функций организма

					299, B 710 - 799, B 410 - 429, B 540 - 559, B 610 - 639, B 810 - 899	
4.3		Другие нарушения внутренней секреции поджелудочной железы		E16		
4.3.1			Другие формы гипогликемии (гиперинсулинизм)	E16.1		
4.3.1.1					Нарушение психических, речевых и языковых функций, нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций, функций эндокринной системы и метаболизма; МКФ: B 110 - 199, B 310 - 399, B 710 - 799, B 540 - 559	Для детей в возрасте 0 - 1 лет: редкие (2 - 3 раза в год) легки гипогликемии при отсутстви или наличии незначительны нарушений функци организма; 0 - 3 года: незначительно нарушения физическог психомоторного, раннег речевого развития; 4 - 17 лет: незначительны когнитивные нарушения
4.3.1.2					Нарушение психических, речевых и языковых функций, нейромышечных, скелетных и связанных с движением	Для детей в возрасте 0 - 1 лет: гипогликемии средне частоты (1 - 2 раза в месяц) развитием умеренны

					(статодинамических) функций, функций эндокринной системы и метаболизма; МКФ: B 110 - 199, B 310 - 399, B 710 - 799, B 540 - 559	нарушений функци организма; 0 - 3 года: умеренно нарушение физическог психомоторного, раннег речевого развития; 4 - 17 лет: умеренны когнитивные нарушения
4.3.1.3					Нарушение психических, речевых и языковых функций, нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций, функций эндокринной системы и метаболизма; МКФ: B 110 - 199, B 310 - 399, B 710 - 799, B 540 - 559	Для детей в возрасте 0 - 1 лет: частые тяжелые гипогликеми (более 2 раз в месяц требующие помощи други лиц, с развитием выраженны нарушений функци организма. 0 - 3 года: выраженно нарушения физическог психомоторного, раннег речевого развития; 4 - 17 лет: выраженны когнитивные нарушения
4.4		Нарушения других эндокринных желез		E20 - E35		
4.4.1			Гипопаратиреоз Гипопаратироидизм, возникший после медицинских процедур	E20 E89.2		

Примечание к подпункту 4.4.1.
Количественная оценка стойких нарушений функций организма ребенка в возрасте до 18 лет при гипопаратиреозе зависит от частоты и вида тетани сокращений скелетных мышц; дыхательных мышц и мышц желудочно-кишечного тракта), а также от степени выраженности изменений фосфор обмена при измерении показателей в условиях стационара (содержание кальция - общего и ионизированного, фосфора и паратгормона в сыворотке кальция и фосфора в моче).

4.4.1.1					Нарушения психических, речевых и языковых, сенсорных, нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций, функций эндокринной системы и метаболизма, мочевыделительной функции; МКФ: B 110 - 199, B 310 - 399, B 210 - 299, B 710 - 799, B 540 - 559, B 610 - 639	Для детей в возрасте 0 - 1 лет: незначительные нарушени функций организма на фон постоянной заместительно терапии при наличии редки тетаний преимуществен скелетных мышц, отсутстви или наличие незначительны изменений показателе фосфорно-кальциевого обмена (при измерении условиях стационара); 0 - 3 года: незначительно отставание физическог психомоторного, раннег речевого развития.
4.4.1.2					Нарушения психических, речевых и языковых, сенсорных, нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций, функций эндокринной системы и	Для детей в возрасте 0 - 1 лет: умеренные нарушени функций организма на фон постоянной заместительно терапии при наличии часты тетаний различных мышечны групп (скелетных

					метаболизма, мочевыделительной функции; МКФ: B 110 - 199, B 310 - 399, B 210 - 299, B 710 - 799, B 540 - 559, B 610 - 639	дыхательных, мышц ЖКТ и/или наличия умеренны изменений показателе фосфорно-кальциевого обмена (при измерении условиях стационара); 0 - 3 года: умеренно отставание физического психомоторного, раннег речевого развития
4.4.1.3					Нарушения психических, речевых и языковых, сенсорных, нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций, функций эндокринной системы и метаболизма, мочевыделительной функции; МКФ: B 110 - 199, B 310 - 399, B 210 - 299, B 710 - 799, B 540 - 559, B 610 - 639	Для детей в возрасте 0 - 1 лет: выраженные нарушени функций организма на фон постоянной заместительно терапии при наличии часты тетаний различных мышечны групп (скелетных дыхательных, мышц ЖКТ и/или наличия выраженных значительно выраженны изменений показателе фосфорно-кальциевого обмена (при измерении условиях стационара) наличие резистентности проводимой терапи активными метаболитам витамина D и их аналогами. 0 - 3 года: выраженно отставание физического

						психомоторного, раннег речевого развития
4.4.2			Гиперпаратиреоз и другие нарушения паращитовидных желез	E21		
Примечание к подпункту 4.4.2. Количественная оценка стойких нарушений функций организма ребенка в возрасте до 18 лет при гиперпаратиреозе зависит от наруш опорно-двигательного аппарата (остеопороз, остеодистрофия, деформация костей, патологические переломы), и висцеральных нарушений.						
4.4.2.1					Нарушения нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций, функций эндокринной системы и метаболизма, функций пищеварительной системы, мочевыделительной функции; МКФ: B 710 - 799, B 540 - 559, B 510 - 529, B 610 - 639	Для детей в возрасте 0 - 1 лет: незначительные нарушени функций организма пр отсутствии (или начальны проявлениях) клинико-лабораторных рентгенологических признаков гиперпаратиреоза: Z-критерий соответствуе остеопении или остеопороз (от -1,0 до -2,0) и/ил незначительные изменени показателей фосфорно-кальциевого обмена при отсутстви Rg-признаков гиперпаратиреоза; отсутствие переломо длинных трубчатых костей; отсутствие костны

						деформаций ил незначительные (в предела 10°) деформации ос конечности или позвоночник без нарушения или незначительным нарушение их функций; отсутствие ил незначительные нарушени мочевыделительной систем и/или функци пищеварительной системы
4.4.2.2					Нарушения нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций, функций эндокринной системы и метаболизма, функций пищеварительной системы, мочевыделительной функции; МКФ: B 710 - 799, B 540 - 559, B 510 - 529, B 610 - 639	Для детей в возрасте 0 - 1 лет: умеренные нарушени функций организма пр наличии клинико-лабораторных рентгенологических признаков гиперпаратиреоза Z-критерий соответствуе тяжелому остеопорозу - (о -2,0 и менее с переломами и/или наличие начальны Rg-признаков (кисты трубчатых костях субпериостальная резорбци концевых фаланг, снижени высоты тел позвонков) и/ил наличие умеренны изменений показателе

						фосфорно-кальциевого обмена; патологические переломы д 1 раза в год, требующи лечения (в том числ оперативного); деформация оси конечност более 10°, но менее 20° вторичная деформация ос позвоночника (сколиоз 2 и степень) с умеренны нарушением их функций; умеренные нарушени мочевыделительной систем (наличие нефролитиаза с ХБ до 3 стадии); эпизоди язвенных поражений верхни отделов ЖКТ
4.4.2.3					Нарушения нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций, функций эндокринной системы и метаболизма, функций пищеварительной системы, мочевыделительной функции; МКФ: B 710 - 799, B 540 - 559, B 510 - 529, B 610 - 639	Для детей в возрасте 0 - 1 лет: выраженные нарушени функций организма пр наличии клинико-лабораторных рентгенологических признаков гиперпаратиреоза Z-критерий соответствуе тяжелому остеопорозу - (о -2,0 и менее множественными переломами) и/или наличи

						отчетливых Rg-признако (кисты трубчатых костей костей таза, компрессионны переломы тел позвонков и/или наличие выраженны (или значительн выраженных) изменени показателей фосфорно-кальциевого обмена; частые спонтанны патологические перелом (более 1 раз в год), требующи лечения (в том числе оперативного); выраженная (20° и более деформация оси конечности возникновение ложны суставов, вторична деформация оси позвоночник с выраженным нарушением и функций; выраженные нарушени мочевыделительной систем (наличие нефролитиаза с ХБ 4 стадии); многократны эпизоды язвенных поражени верхних отделов ЖКТ
4.5			Гипопитуитаризм Преждевременное	E23.0 E22.8		

			половое развитие	E30.1		
			Низкорослость, не классифицированная в других рубриках	E34.3		
			Низкорослость ахондропластическая, гипохондропластическая	Q77.4		
			Спондилоэпифизарная дисплазия	Q77.7		
			Болезнь Олье (энхондроматоз)	Q78.4		
			Синдром Нунан	Q86.1		
			Синдром Рассела-Сильвера	Q87.1		
			Синдром Шерешевского-Тернера	Q96		
Примечание к подпункту 4.5. Оценка физического развития и степень его задержки у детей проводится в соответствии с количеством стандартных отклонений (SD соответствующего возраста и пола или по эпикризным срокам. Эпикризным сроком для возраста от 0 до 12 месяцев является 1 месяц, от 1 года до 2 от 2 до 3 лет - 6 месяцев, старше 3 лет - 1 год. После закрытия ростовых зон критерием установления категории "ребенок-инвалид" является оценк отклонений (SDS роста) для соответствующего возраста. При оценке низкорослости учитывается ее выраженность, а также нарушения функций ор организма в случае наследственных синдромов с низкорослостью.						
4.5.1					Нарушения психических, языковых и речевых, сенсорных	Для детей в возрасте 0 - 1 лет: незначительные нарушени

					нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций, функций пищеварительной, сердечно-сосудистой, эндокринной систем и метаболизма, мочевыделительной функции; МКФ: B 110 - 199, B 310 - 399, B 210 - 299, B 710 - 799, B 510 - 539, B 410 - 429, B 540 - 559, B 610 - 639	функций организма: задержк роста от 2 до 3 SDS или 1 - эпикризных срока д закрытия зон роста. После закрытия зон роста пр достижении социальн значимого роста
4.5.2					Нарушения психических, языковых и речевых, сенсорных нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций, функций пищеварительной, сердечно-сосудистой, эндокринной систем и метаболизма, мочевыделительной функции; МКФ: B 110 - 199, B 310 - 399, B 210 - 299, B 710 - 799, B 510 - 539, B 410 - 429, B 540 - 559, B 610 - 639	Для детей в возрасте 0 - 1 лет: умеренные нарушени функций организма: задержка роста от 4 до 5 SD или на 3 - 4 эпикризных срок при неэффективност заместительной терапии д закрытия зон роста. 14 - 17 лет: после закрыти зон роста социальн значимый рост не достигнут

4.5.3					Нарушения психических, языковых и речевых, сенсорных нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций, функций пищеварительной, сердечно-сосудистой, эндокринной систем и метаболизма, мочевыделительной функции; МКФ: B 110 - 199, B 310 - 399, B 210 - 299, B 710 - 799, B 510 - 539, B 410 - 429, B 540 - 559, B 610 - 639	Для детей в возрасте 0 - 1 лет: выраженные нарушени функций организма: задержка роста более 5 SD или 5 и более эпикризны сроков при неэффективност заместительной терапии д закрытия зон роста. 14 - 17 лет: после закрыти зон роста социальн значимый рост не достигнут
4.6		Гиперфункция гипофиза		E22		
4.6.1			Акромегалия и гипофизарный гигантизм	E22.0		
4.6.1.1					Нарушения психических, сенсорных, нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций, функций эндокринной системы и метаболизма, функций	Для детей в возрасте 0 - 1 лет: акромегалия (гипофизарны гигантизм) легкого течения незначительными нарушениями функци организма

					сердечно-сосудистой системы; МКФ: B 110 - 199, B 210 - 299, B 710 - 799, B 540 - 559, B 410 - 429	
4.6.1.2					Нарушения психических, сенсорных, нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций, функций эндокринной системы и метаболизма, функций сердечно-сосудистой системы; МКФ: B 110 - 199, B 210 - 299, B 710 - 799, B 540 - 559, B 410 - 429	Для детей в возрасте 0 - 1 лет: акромегалия (гипофизарны гигантизм) с умеренным нарушениями функци организма; пр неэффективности оперативного лечени (невозможность радикальног устранения) и сохранени после оперативного лечени повышенного уровн инсулиноподобного фактор роста 1 (ИФР); отсутстви снижения СТГ в ход диагностического теста
4.7			Центральный несахарный диабет Нефрогенный несахарный диабет	E23.2 N25.1		
4.7.1					Нарушения нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических)	Для детей в возрасте 0 - 1 лет: несахарный диабе (центральный ил

					функций, функций эндокринной системы и метаболизма, сердечно-сосудистой, пищеварительной систем, мочевыделительной функции, функции кожи и связанных с ней систем; МКФ: B 710 - 799, B 540 - 559, B 410 - 429, B 510 - 539, B 610 - 639, B 810 - 899	нефрогенный), компенсированный ил субкомпенсированный н фоне проводимой терапии; тубулопатии с костным деформациями: варусна деформация нижни конечностей незначительно степени (до 10°). 0 - 3 года: незначительна задержка физическог психомоторного, раннег речевого развития
4.7.2					Нарушения нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций, функций эндокринной системы и метаболизма, сердечно-сосудистой, пищеварительной систем, мочевыделительной функции, функции кожи и связанных с ней систем; МКФ: B 710 - 799, B 540 - 559, B 410 - 429, B 510 - 539, B 610 - 639, B 810 - 899	Для детей в возрасте 0 - 1 лет: умеренные нарушени функций организма пр декомпенсации несахарног диабета (центрального ил нефрогенного) на фон резистентности к терапии; тубулопатии с костным деформациями: деформаци (варусная, вальгусная нижних конечносте умеренной степени (более 10 но менее 20°)
4.7.3					Нарушения нейромышечных, скелетных	Для детей в возрасте 0 - 1 лет:

					и связанных с движением (статодинамических) функций, функций эндокринной системы и метаболизма, сердечно-сосудистой, пищеварительной систем, мочевыделительной функции, функции кожи и связанных с ней систем; МКФ: B 710 - 799, B 540 - 559, B 410 - 429, B 510 - 539, B 610 - 639, B 810 - 899	выраженные нарушени функций организма пр декомпенсации несахарног диабета (центрального ил нефрогенного) на фон резистентности к терапии; наличие осложнений тубулопатии с костным деформациями, требующим оперативного лечения (н период его проведения)
4.8			Синдром и болезнь Иценко-Кушинга вследствие аденомы гипофиза, надпочечников, при злокачественных опухолях различных органов, функциональный гиперкортицизм при различной эндокринной патологии, при приеме высоких доз глюкокортикоидов	E24		
Примечание к подпункту 4.8. Количественная оценка степени выраженности стойких нарушений функций организма ребенка в возрасте до 18 лет, обусловленных синдромо Иценко-Кушинга, зависит от фазы заболевания (активная, неактивная), степени тяжести формы заболевания (легкая, средней тяжести, тяжелая форм						

осложнений (миопатии, кардиомиопатия с проявлениями ХСН, стероидный диабет, остеопороз, аменорея, атрофия мышц, спонтанные пер нейроофтальмологические нарушения, гипертоническая первично-сморщенная почка, почечная недостаточность, органические поражения ЦНС нарушения), а также от наличия злокачественных опухолей гипофиза, надпочечников и резистентности к проводимой терапии.						
4.8.1					Нарушения функций эндокринной системы и метаболизма; МКФ: B 540 - 559	Для детей в возрасте 0 - 1 лет: легкая форма синдрома отсутствием ил незначительными нарушениями функци организма на фон проводимой терапии.
4.8.2					Нарушения психических, нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций, функций эндокринной системы и метаболизма, сердечно-сосудистой системы, мочевыделительной функции; МКФ: B 110 - 199, B 710 - 799, B 540 - 559, B 410 - 429, B 610 - 639	Для детей в возрасте 0 - 1 лет: гиперкортицизм средне тяжести синдрома бе осложнений, с умеренным нарушениями функци организма на фон проводимой терапии
4.8.3					Нарушения психических, нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических)	Для детей в возрасте 0 - 1 лет: тяжелая форма синдрома прогрессирующим течение

					функций, функций эндокринной системы и метаболизма, сердечно-сосудистой системы, мочевыделительной функции; МКФ: B 110 - 199, B 710 - 799, B 540 - 559, B 410 - 429, B 610 - 639	на фоне проводимой терапи с осложнениями, в том числ от оперативного и/ил лучевого лечения опухоле надпочечников или гипофиза наличие рецидив заболевания, приводящего выраженным нарушения функций организма
4.9			Врожденные адреногенитальные нарушения, связанные с дефицитом ферментов	E25.0		
Примечание к подпункту 4.9. Количественная оценка степени выраженности стойких нарушений функций организма ребенка в возрасте до 18 лет при врожденном адреногенитал зависит от формы заболевания (вирильная, сольтеряющая, гипертензивная форма), а также характера течения заболевания (риск развития жиз состояний).						
4.9.1					Нарушения функции эндокринной системы и метаболизма; МКФ: B 540 - 559	Для детей в возрасте 0 - 1 лет: вирильная форма
4.9.2					Нарушения функции эндокринной системы и метаболизма; МКФ: B 540 - 559	Для детей в возрасте 0 - 1 лет: сольтеряющая форма: пр отсутствии кризового течени (жизнеугрожающих состояний) на фон постоянной заместительно

						терапии
4.9.3					Нарушения функции эндокринной системы и метаболизма; МКФ: B 540 - 559	Для детей в возрасте 0 - 1 лет: сольтеряющая форма: пр наличии жизнеугрожающи состояний (кризов верифицированных условиях медицинско организации на фон постоянной заместительно терапии
4.9.4					Нарушения функции эндокринной системы и метаболизма; сердечно-сосудистой системы; МКФ: B 540 - 559, B 410 - 429	Для детей в возрасте 0 - 1 лет: гипертоническая форма
4.10			Гиперальдостеронизм-первичный	E26.0		
4.10.1					Нарушения функций эндокринной системы и метаболизма, сердечно-сосудистой системы; МКФ: B 540 - 559, B 410 - 429	Для детей в возрасте 0 - 1 лет: незначительные нарушени функций организма на фон проводимой терапии (в то числе хирургическог вмешательства)
4.10.2					Нарушения функций	Для детей в возрасте 0 - 1

					эндокринной системы и метаболизма, сердечно-сосудистой, дыхательной системы; МКФ: B 540 - 559, B 410 - 429, B 440 - 450	лет: умеренные нарушени функций организма пр неэффективности лечени (невозможность радикальног удаления, рецидивь продолженный рост опухоли резистентность медикаментозной терапии)
4.10.3					Нарушения функций эндокринной системы и метаболизма, сердечно-сосудистой, дыхательной системы; МКФ: B 540 - 559, B 410 - 429, B 440 - 450	Для детей в возрасте 0 - 1 лет: выраженные нарушени функций организма пр неэффективности лечени (невозможность радикальног удаления, повторно оперативное лечение продолженный рост опухоли резистентность медикаментозной терапии)
4.11			Первичная надпочечниковая недостаточность	E27.1		
4.11.1					Нарушения психических функций, функций эндокринной системы и метаболизма, сердечно-сосудистой, дыхательной системы;	Для детей в возрасте 0 - 1 лет: стабильное течени заболевания на фон заместительной глюкокортикоидной

					МКФ: B 110 - 199, B 540 - 559, B 410 - 429, B 440 - 450	минералокортикоидной терапии, отсутстви аддисонических кризов.
4.11.2					Нарушения психических функций, функций эндокринной системы и метаболизма, сердечно-сосудистой, дыхательной системы; МКФ: B 110 - 199, B 540 - 559, B 410 - 429, B 440 - 450	Для детей в возрасте 0 - 1 лет: наличие аддисонически кризов средней частоты (3 - раз в год), верифицированны в условиях стационара
4.11.3					Нарушения психических функций, функций эндокринной системы и метаболизма, сердечно-сосудистой, дыхательной системы; МКФ: B 110 - 199, B 540 - 559, B 410 - 429, B 440 - 450	Для детей в возрасте 0 - 1 лет: наличие часты аддисонических кризов (боле 5 раз в год верифицированных условиях стационара
4.12			Полигландулярная дисфункция Аутоимунная полигландулярная недостаточность Полигландулярная гиперфункция	E31 E31.0 E31.1		
Примечание к подпункту 4.12.						

Количественная оценка стойких нарушений функций организма ребенка в возрасте до 18 лет при полигландулярной дисфункции зависит от пр характера течения заболевания, от "компонентов" заболевания (количества и вида органов и/или систем организма, вовлеченных в патологически вида и степени нарушенных функций организма, сенсорных (снижение остроты зрения вплоть до слепоты), статодинамических (множественные п переломы, остеопороз, контрактуры суставов, анкилозы), функций пищеварительной системы (синдром мальабсорбции, язвенная болезнь), сердеч системы (ХСН различной стадии), эндокринной системы и метаболизма (гипогликемический синдром, сахарный диабет), мочевыделительной различной стадии), функции кожи и связанных с ней систем; а также от наличия осложнений со стороны каждого "компонента" заболевания и з проводимой терапии.						
4.12.1					Нарушения психических, языковых и речевых функций, сенсорных, нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций, функций пищеварительной, сердечно-сосудистой систем, системы крови и иммунной системы, эндокринной системы и метаболизма, мочевыделительной функции, функции кожи и связанных с ней систем; МКФ: B 110 - 199; B 310 - 399, B 210 - 299, B 710 - 799, B 510 - 539, B 410 - 429, B 430 - 439, B 540 - 559, B 610 - 639, B 810 - 899	Для детей в возрасте 0 - 1 лет: отсутствие клинико-функциональных проявлений заболевания н фоне проводимой терапии (том числе хирургическог лечения) или незначительны нарушения функци организма
4.12.2					Нарушения психических, языковых и речевых	Для детей в возрасте 0 - 1 лет:

					функций, сенсорных, нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций, функций пищеварительной, сердечно-сосудистой систем, системы крови и иммунной системы, эндокринной системы и метаболизма, мочевыделительной функции, функции кожи и связанных с ней систем; МКФ: B 110 - 199; B 310 - 399, B 210 - 299, B 710 - 799, B 510 - 539, B 410 - 429, B 430 - 439, B 540 - 559, B 610 - 639, B 810 - 899	умеренные нарушени функций организма пр неэффективности лечения (том числе хирургического)
4.12.3					Нарушения психических, языковых и речевых функций, сенсорных, нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций, функций пищеварительной, сердечно-сосудистой систем, системы крови и иммунной системы, эндокринной системы и	Для детей в возрасте 0 - 1 лет: выраженные нарушени функций организма пр неэффективности лечени и/или наличие осложнений с стороны органа и/ил системы, вовлеченной синдром

					метаболизма, мочевыделительной функции, функции кожи и связанных с ней систем; МКФ: B 110 - 199; B 310 - 399, B 210 - 299, B 710 - 799, B 510 - 539, B 410 - 429, B 430 - 439, B 540 - 559, B 610 - 639, B 810 - 899	
4.13			Морбидное ожирение	E66.0 E67.8		
4.13.1					Нарушения психических, нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций, функций пищеварительной системы, сердечно-сосудистой, дыхательной, эндокринной систем и метаболизма; МКФ: B 110 - 199, B 710 - 799, B 510 - 539, B 410 - 429, B 440 - 450, B 540 - 559	Для детей в возрасте 0 - 1 лет: ожирение без осложнени либо в сочетании незначительными нарушениями функци организма
4.13.2					Нарушения психических, нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций, функций пищеварительной системы,	Для детей в возрасте 0 - 1 лет: ожирение с ИМТ более 40, (или SDS ИМТ >= 4,0) сочетании с умеренным нарушениями функци

					сердечно-сосудистой, дыхательной, эндокринной систем и метаболизма; МКФ: B 110 - 199, B 710 - 799, B 510 - 539, B 410 - 429, B 440 - 450, B 540 - 559	организма
4.14		Нарушения обмена веществ		E70 - E90		
4.14.1			Классическая фенилкетонурия Другие виды гиперфенилаланинемии	E70.0 E70.1		
Примечание к подпункту 4.14.1 Количественная оценка стойких нарушений функций организма ребенка в возрасте до 18 лет, обусловленных фенилкетонурией (далее - ФКУ), о первую очередь, на оценке показателей нервно-психического, физического и речевого развития ребенка, а также учитывает форму, течение заболе возможность достижения безопасного допустимого уровня фенилаланина (далее - ФА) для каждого возрастного периода, учитывает формирован самостоятельно осуществлять контроль за течением и терапией заболевания (соблюдение основных принципов расчета лечебного питания, си контроль уровня фенилананина в сыворотке крови на допустимом безопасном уровне, осуществление самостоятельно диетотерапии). Данные н формироваться у ребенка к 14 годам.						
4.14.1.1			Легкая гиперфенилаланинемия (не ФКУ)	E70.1	Нарушения функций эндокринной системы и метаболизма; МКФ: B 540 - 559	Для детей в возрасте 0 - 1 лет: при уровне ФА в крови пределах от 2 до 6 мг/дл период диагностик заболевания до начал соблюдения диеты или посл верификации диагноза пр уровне ФА от 2 до 6 мг/дл бе

						соблюдения диеты последующем пр соответствующем возраст физическом, психомоторном речевом развитии
4.14.1.2			Фенилкетонурия легкая форма (6 - 10 мг/дл), среднетяжелая форма (10 - 20 мг/дл)	E70.0	Нарушения психических, языковых и речевых, нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций, функций эндокринной системы и метаболизма, пищеварительной системы; МКФ: B 110 - 199, B 310 - 399, B 710 - 799, B 540 - 559, B 510 - 539	Для детей в возрасте 0 - 1 лет: с момента верификаци диагноза до 14 лет при уровн ФА от 6 до 20 мг/дл (легкая среднетяжелая форма ФКУ при соблюдении диеты
4.14.1.3			Фенилкетонурия классическая форма (более 20 мг/дл) Другие виды гиперфенилаланинемии: птерин-зависимая (кофакторная, атипичная форма фенилкетонурии) - ФКУ II и III типа	E70.0 E70.1	Нарушения психических, языковых и речевых, нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций, функций эндокринной системы и метаболизма, пищеварительной системы; МКФ: B 110 - 199, B 310 - 399, B 710 - 799, B 540 - 559, B 510 - 539	Для детей в возрасте 0 - 1 лет: с момента верификаци диагноза до 14 лет при уровн ФА более 20 мг/дл классическая (тяжелая) форм ФКУ, птерин-зависима форма ФКУ

4.14.1.4			Фенилкетонурия среднетяжелая (10 - 20 мг/дл); классическая форма (более 20 мг/дл) Другие виды гиперфенилаланинемии: птерин-зависимая (кофакторная, атипичная форма фенилкетонурии) - ФКУ II и III типа	E70.0 E70.1	Нарушения психических, языковых и речевых, нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций, функций эндокринной системы и метаболизма, пищеварительной системы; МКФ: B 110 - 199, B 310 - 399, B 710 - 799, B 540 - 559, B 510 - 539	Для детей в возрасте 15 - 1 лет: сохранение уровня ФА от 1 до 20 мг/дл на фон диетотерапии при наличи умеренных нарушени функций организма умеренное когнитивно снижение, умеренные речевы нарушения, умеренно снижение интеллекта (15 лет IQ = 50 - 69 баллов (детский WPPSI или WISC); 16 - 17 лет IQ = 50 - 64 баллов (взрослы WAIS); умеренна неврологическая симптоматика (умеренна полинейропатия); наличи БЭН II степени
4.14.1.5			Фенилкетонурия Среднетяжелая форма (10 - 20 мг/дл); классическая форма (более 20 мг/дл) Другие виды гиперфенилаланинемии: птерин-зависимая (кофакторная, атипичная форма фенилкетонурии) - ФКУ II и III типа	E70.0 E70.1	Нарушения психических, языковых и речевых, нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций, функций эндокринной системы и метаболизма, пищеварительной системы; МКФ: B 110 - 199, B 310 - 399, B 710 - 799, B 540 - 559, B 510 - 539	Для детей в возрасте 15 - 1 лет: сохранение уровня ФА боле 20 мг/дл на фон диетотерапии при наличи выраженных нарушени функций организма выраженное снижени интеллекта (IQ = 35 - 49) выраженные речевы нарушения и/или выраженна неврологическая

						симптоматика (выраженна полинейропатия, мышечна дистония, парезы и прочее) наличие БЭН III степени
4.14.1.6			Фенилкетонурия классическая форма (более 20 мг/дл) Другие виды гиперфенилаланинемии: птерин-зависимая (кофакторная, атипичная форма фенилкетонурии) ФКУ II и III типа	E70.0 E70.1	Нарушения психических, языковых и речевых функций, нарушения нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций; функций эндокринной системы и метаболизма, пищеварительной системы; МКФ: B 110 - 199, B 310 - 399, B 710 - 799, B 540 - 559, B 510 - 539	Для детей в возрасте 0 - 1 лет: сохранение уровня ФА боле 20 мг/дл на фон диетотерапии при наличи значительно выраженны нарушений функци организма: значительн выраженное снижени интеллекта (IQ < 35) значительно выраженна неврологическая симптоматика (гиперкинезы пароксизмальные расстройства, мышечна дистония, парезы и прочее)
4.14.2		Нарушение обмена ароматических аминокислот Нарушение обмена аминокислот с разветвленной цепью и обмена жирных кислот: болезнь "кленового		E70 E71		

		сиропа" (лейциноз), изовалериановая, метилмалоновая пропионовая ацидемия и другие нарушения				
		Другие нарушения обмена аминокислот: цистиноз, цистинурия, синдром Фанкони (-де Тони) (-Дебре), болезнь Хартнупа, синдром Лоу, глютарикацидурия,		E72		
		гомоцистинурия и другие нарушения		E74		
		Другие нарушения обмена углеводов: галактоземия, фруктоземия и другие нарушения		E75		
		Нарушения обмена сфинголипидов и другие болезни накопления				

		липидов: болезнь Фабри, Тея-Сакса, Гоше, Краббе, Ниманна-Пика; синдром Фабера, метахроматическая лейкодистрофия;				
		недостаточность сульфатазы		E76		
		Нарушения обмена глюкозамино-гликанов мукополисахаридозы I, II, III, IV, VI, VII типов)		E77		
		Нарушение обмена гликопротеинов		E78		
		Нарушение обмена липопротеидов и другие дислипидемии		E79		
		Нарушения обмена пуринов и пиримидинов: синдром Леша-Нихена, ксантинурия		E80		

		Нарушения обмена порфирина и билирубина (синдром Криглера-Найяра, болезнь Байлера, синдром Люси-Дрисколла) Нарушение минерального обмена (болезнь Вильсона-Коновалова, гепато-лентикулярная дегенерация)		E83		
Примечание к подпункту 4.14.2 Количественная оценка степени выраженности стойких нарушений функций организма ребенка в возрасте до 18 лет при редких орфанных обусловленных нарушением обмена тирозина, аминокислот с разветвленной цепью, жирных кислот, сфинголипидов, глюкозаминогликанов, ос оценке показателей нервно-психического, физического и речевого развития ребенка, а также учитывает форму и тип течения заболевания (прогр кризовое), клинический полиморфизм симптоматики, возможность компенсации нарушенных функций организма патогенетическим лечением, пр заболевания. Для заболеваний, при которых показана диетотерапия, учитывается формирование способности самостоятельно осуществлять контроль за течени заболевания (соблюдение основных принципов расчета лечебного питания, систематический контроль уровня аминокислот или других м допустимом безопасном уровне, осуществление самостоятельно диетотерапии).						
4.14.2.1					Нарушения психических, языковых и речевых, сенсорных, нейромышечных, скелетных и связанных с движением	Для детей в возрасте 0 - 1 лет: кризовое или прогредиентно течение заболевания, н компенсируемое

					(статодинамических) функций, функций пищеварительной, сердечно-сосудистой, эндокринной систем и метаболизма, мочевыделительной функции; МКФ: B 110 - 199, B 310 - 399, B 210 - 299, B 710 - 799, B 510 - 539, B 410 - 429, B 540 - B 559, B 610 - 639	патогенетической терапией при наличии умеренны нарушений функци организма. 0 - 3 года: умеренная задержк физического, психомоторног и раннего речевого развития
4.14.2.2					Нарушения психических, языковых и речевых, сенсорных, нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций, функций пищеварительной, сердечно-сосудистой, эндокринной систем и метаболизма, мочевыделительной функции; МКФ: B 110 - 199, B 310 - 399, B 210 - 299, B 710 - 799, B 510 - 539, B 410 - 429, B 540 - B 559, B 610 - 639	Для детей в возрасте 0 - 1 лет: кризовое или прогредиентно течение заболевания неблагоприятным прогнозом не компенсируемо патогенетической терапией при наличии выраженны нарушений функци организма; 0 - 3 года: выраженна задержка физического психомоторного и раннег речевого развития

4.14.2.3					Нарушения психических, языковых и речевых, сенсорных, нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций, функций пищеварительной, сердечно-сосудистой, эндокринной систем и метаболизма, мочевыделительной функции; МКФ: B 110 - 199, B 310 - 399, B 210 - 299, B 710 - 799, B 510 - 539, B 410 - 429, B 540 - B 559, B 610 - 639	Для детей в возрасте 0 - 1 лет: кризовое или прогредиентно течение заболевания неблагоприятным прогнозом не компенсируемо патогенетической терапией при наличии значительн выраженных нарушени функций организма; 0 - 3 года: значительн выраженная задержк физического, психомоторног и раннего речевого развития
4.14.3			Кистозный фиброз (муковисцидоз) с легочными проявлениями Кистозный фиброз (муковисцидоз) с другими проявлениями (с комбинированными проявлениями) Кистозный Фиброз неуточненный	E84.0 E84.8 E84.9		
Примечание к подпункту 4.14.3						

Количественная оценка стойких нарушений функций организма ребенка в возрасте до 18 лет, обусловленных муковисцидозом, основывается на активности процесса, характера течения заболевания, вида генетических мутаций, степени выраженности проявлений со стороны пищеварительной сердечно-сосудистой эндокринной системы, других систем организма, вида микробного патогена дыхательного тракта, а также на наличии осложнен						
4.14.3.1					Нарушения функций дыхательной, пищеварительной, эндокринной систем и метаболизма; МКФ: B 440 - 449, B 510 - 539, B 540 - 559	Для детей в возрасте 0 - 1 лет: формы заболевания бе клинической симптоматик или легкое течени заболевания незначительными нарушениями функци дыхательной пищеварительной систем
4.14.3.2					Нарушения функций пищеварительной, дыхательной, сердечно-сосудистой систем, системы крови и иммунной системы, эндокринной системы и метаболизма; МКФ: B 510 - 539, B 440 - 449; B 410 - 429, B 430 - 439, B 540 - 559	Для детей в возрасте 0 - 1 лет: среднетяжелая форм заболевания с умеренным нарушениями функци организма, первичный ил интермитирующий высев: P aeruginosa, B. cepacia complex MRSA, Stenotrophomona maltophilia, Achromobacte spp., нетуберкулезным микобактериями, грибам рода Aspergillus и други микробных патогенов синдром потери соли хроническая панкреатическа недостаточность, острый

						рецидивирующий панкреатит мекониевый илеус ил синдром дистально интестинальной обструкции кровохарканье, цирроз печен без портальной гипертензии нарушенная толерантность глюкозе и диабет бе потребности в инсулине хронический панкреатит белково-энергетическая недостаточность 1 - 2 степени
4.14.3.3					Нарушения функций пищеварительной, дыхательной, сердечно-сосудистой систем, системы крови и иммунной системы, эндокринной системы и метаболизма, нарушение психических функций; МКФ: B 510 - 539, B 440 - 449, B 410 - 429, B 430 - 439, B 540 - 559, B 110 - 199	Для детей в возрасте 0 - 1 лет: тяжелая форма заболевания выраженными нарушениям функций организма; наличи тяжелых хронически инфекционных осложнений вызванных: P. aeruginosa, B cepacia complex, MRSA Stenotrophomonas maltophilia Achromobacter spp нетуберкулезными микобактерии, грибами род Aspergillus и другим микробными патогенами повторный синдром потер соли, мекониевый илеус ил синдром дистально интестинальной обструкции

						легочное кровотечение цирроз печени с портальной гипертензией, муковисцидоз-ассоциированный диабет с потребностью в инсулине, остеопороз белково-энергетическая недостаточность 2 - 3 степени - носители гастростомы панкреатическая недостаточность с высокой потребностью панкреатических ферментов (> 10 000 Ед/кг или 4 000 Ед/грамм жира), частые обострения хронического панкреатита, пневмоторакс
4.14.3.4					Нарушения функций пищеварительной, дыхательной, сердечно-сосудистой систем, системы крови и иммунной системы, эндокринной системы и метаболизма, нарушение психических функций; МКФ: B 510 - 539, B 440 - 449, B 410 - 429, B 430 - 439, B 540 - 559, B 110 - 199	Хроническая дыхательная недостаточность кислородозависимостью, $ОФВ_1$ < 30% от должного, пациенты находящиеся в листе ожидания на трансплантацию легких или печени
5	Психические			F00 - F99		

	расстройства и расстройства поведения (класс V)					
Примечание к пункту 5. Количественная оценка степени выраженности нарушений психических функций ребенка в возрасте до 18 лет, обусловленных психическими рас расстройствами поведения, основывается на типологии, степени выраженности, прогредиентности патопсихологической, психопатологической симптоматики в различные возрастные периоды с учетом возрастной динамики данных расстройств. Независимо от нозологической формы расстройства при оценке степени выраженности психических функций учитывается уровень реабилитационного потенциала организма ре наследственности, половозрастные особенности, состояние иных органов и систем организма), реабилитационного потенциала личн (интеллектуальный, мотивационный и эмоционально-волевой компонент в зависимости от возраста), а также состояние его ближайшей социа (семьи), характер получения образования (обучение по основным общеобразовательным стандартам или по адаптированной программе), проф маршрут (в возрасте старше 14 лет). Необходимой составляющей является уровень адаптации в основных сферах жизнедеятельности ребенка (семе социально-средовой, в ситуации обучения, профессиональной сфере и прочих).						
5.1		Нарушения психологического развития		F80 - F89		
5.1.1			Специфические расстройства речи и языка Специфические расстройства развития учебных навыков Смешанные специфические расстройства психологического развития (стойкая	F80 F81 F83		

			задержка развития) Заикание Симптомы, признаки, относящиеся к речи и голосу	 F98.5 R47 - R49		
Примечание к подпункту 5.1.1. Количественная оценка степени выраженности нарушений языковых и речевых функций у детей в возрасте 3 года и старше зависит от уровня (ст или системного недоразвития речи (ОНР и СНР соответственно), от вида речевого синдрома и степени выраженности нарушений устной реч дизартрия, дислалия, заикание, алалия, афазия) и/или письменной речи (дисграфия, дислексия, дискалькулия); нарушений голосообразования значение возраст начала проведения мероприятий по комплексной реабилитации и абилитации (хирургическая коррекция, медикаментоз логопедическая, дефектологическая и психологическая коррекция) и их эффективность. Заключение с указанием степени (уровня) общего и недоразвития речи, конкретного вида речевого синдрома и степени его выраженности предоставляет специалист-логопед медицинской организации. При определении количественной оценки степени выраженности языковых и речевых нарушений в возрасте до 3 лет необходимо учитывать темпо формирования речевых навыков, которая рассматривается как нестойкое нарушение языковых и речевых функций. Нарушения языковых и речев этом возрастном периоде не бывают изолированными, как правило, входят в структуру различных клинических синдромов, обусловленных пат психической и/или соматической сферы. На формирование речевых функций в данный возрастной период оказывают влияние объем и качество восстановительного лечения, в том числе педагогической и психологической коррекции.						
5.1.1.1					Нарушения психических, языковых и речевых функций, сенсорных функций; МКФ: B 110 - 139, B 140 - 189, B 198, B 199, B 310 - 340, B 398, B 399, B 210 - 299	Для детей в возрасте 3 - 1 лет: ОНР 3 и 4 уровня речевог развития, СНР легко степени, незначительны проявления речевы синдромов устной письменной речи незначительные нарушени психических и/или сенсорны функций

5.1.1.2					Нарушения психических, языковых и речевых функций, сенсорных функций; МКФ: B 110 - 139, B 140 - 189, B 198, B 199, B 310 - 340, B 398, B 399, B 210 - 299	Для детей в возрасте 3 - 1 лет: ОНР 2 уровня речевог развития, СНР средне степени, умеренны проявления речевы синдромов устной письменной речи; нарушения психических и/ил сенсорных функци (незначительные/умеренные)
5.1.1.3					Нарушения психических, языковых и речевых функций, сенсорных функций; МКФ: B 110 - 139, B 140 - 189, B 198, B 199, B 310 - 340, B 398, B 399, B 210 - 299	Для детей в возрасте 3 - 1 лет: ОНР 1 уровня речевог развития, СНР выраженно степени, выраженны проявления речевы синдромов устной письменной речи; нарушени психических и/или сенсорны функций (незначительные/умеренные/в ыраженные)
5.1.2			Общие расстройства психологического развития	F84		

Примечание к подпункту 5.1.2.
Количественная оценка степени выраженности нарушений функций организма ребенка в возрасте до 18 лет при расстройствах аутистиче основывается на оценке степени дефицита социальной коммуникации и социального взаимодействия; оценке "поведенческого сценария" (фобии и

методы защиты - моторные и речевые стереотипии, поведенческие ритуалы, сверхценные увлечения, патологические фантазии, "феномен т требование неизменности, повышенная или неадекватная реакция на сенсорные стимулы, постоянства). Дополнительными критериями оценки являе или наличие специфических речевых нарушений, интеллектуальной недостаточности, психопатологических проявлений (кататоничес пароксизмальные нарушения в структуре аутизма). В возрастном периоде от 0 до 3 лет количественная оценка степени выраженности функций организма должна учитывать степень нарушения ком навыков, темп психомоторного развития ребенка и формирования социальных и поведенческих навыков.						
5.1.2.1			Детский аутизм Атипичный аутизм Синдром Ретта Синдром Геллера	F84.0 F84.1 F84.2 F84.3		
5.1.2.1.1					Нарушения психических, языковых и речевых функций; МКФ: B 110 - 199, B 310 - 399.	Для детей в возрасте 0 - 1 лет: ребенок самостоятельн устанавливает контакт, н испытывает трудности организации общени (нервозность, робость быстрое истощение двигательная расторможенность). Нет активного избегани взгляда. "Поведенчески сценарий": сохранени постоянства среды за сче формирования штампов образцов правильног социального поведения защитные образовани

						(стереотипии, ритуалы минимальны, нося адекватный, компенсаторны характер и появляются ситуации тревоги. 0 - 3 года: навык формируются соответственн возрасту либо имеетс незначительная задержк (регресс) психомоторного речевого развития социальных навыков. 4 - 17 лет: функции речи н нарушены либо имеютс незначительные специфические нарушени речи (ОНР 3 или 4 уровн речевого развития/СНР легко степени). Интеллект не снижен либ снижен незначительно: 4 - 15 лет: IQ = 70 - 79 баллов 16 - 17 лет: IQ = 65 - 69 балло
5.1.2.1.2					Нарушения психических, языковых и речевых функций; МКФ: B 110 - 199, B 310 - 399	Для детей в возрасте 0 - 1 лет: ребенок самостоятельн устанавливает минимальны контакт с окружающими требуется постоянно побуждение. Во врем контакта - повышенны

						уровень нервозности и боязни Наличие кратковременного фиксированного визуального контакта. "Поведенческий сценарий" допускаются минимальны нарушения стереотип общения, формируя сложны виды аффективной защит (патологические увлечения компенсаторные фантази лишенные социально направленности). 0 - 3 года: не сформирован познавательная коммуникативная функци речи, имеет место нарушени (регресс) психического речевого развития и задержк формирования поведенчески и социальных навыков; 4 - 17 лет: нарушен коммуникативная функци речи, имеются умеренны специфические нарушени речи (ОНР 2/СНР легкой ил средней степени). Интеллект не снижен либ снижен от незначительной д умеренной степени (4 - 15 лет IQ = 50 - 69 баллов; 16 - 1 лет: IQ = 50 - 64 баллов)

5.1.2.1.3					Нарушения психических, языковых и речевых функций, функций пищеварительной системы, мочевыделительной функции; МКФ: B 110 - 199, B 310 - 399, B 510 - 539, B 610 - 639	Для детей в возрасте 0 - 1 лет: ребенок самостоятельно н устанавливает контакт окружающими, возможн лишь кратковременно привлечение внимания посл побуждения. Избегани визуального контакта "Поведенческий сценарий": н допускаются нарушени стереотипа окружающе среды, формируютс множественные стереотипии поведенческие ритуаль характерны выраженны фобии, обсессивно-компульсивные нарушения, регресс ране сформированных социальных учебных и речевых навыков. Возможно сочетание различными вариантам кататонического синдрома. 0 - 3 года: стойка выраженная задержк (регресс) психическог речевого развития социальных навыков. 4 - 17 лет: выраженны специфические нарушени речи (ОНР 1 уровня/СН

						тяжелой степени). Интеллект - выраженно снижение: IQ = 35 - 49 баллов
5.1.2.1.4					Нарушения психических, языковых и речевых функций, функций пищеварительной системы, мочевыделительной функции; МКФ: B 110 - 199, B 310 - 399, B 510 - 539, B 610 - 639	Для детей в возрасте 0 - 1 лет: контакт с ребенко невозможен, привлеч внимание не удается. Отсутствие визуальног контакта. Полное отсутстви вербального контакта "Поведенческий сценарий" при малейшем изменени постоянства окружающе среды - неуправляемо хаотичное двигательно возбуждение либо полно отрешение от окружающего многочисленные страхи стереотипии, проявлени кататонического синдрома. Методы аффективной защит (ритуалы) не развить Возможно наличи эпилептических припадков. 0 - 3 года: значительн выраженное нарушени психического, речевог развития и отсутстви элементарных социальных

						поведенческих навыков. Интеллект: значительн выраженное снижение (IQ 34 баллов)
5.2		Умственная отсталость (интеллектуальная недостаточность)		F70 - F79		

Примечание к подпункту 5.2.
Количественная оценка степени выраженности нарушений психических функций ребенка в возрасте до 18 лет при умственной отсталости у ребенк основывается на степени выраженности синдрома интеллектуальной недостаточности, наличии, клиническом варианте и степени выраженности нарушений, соматоневрологической патологии (пароксизмальные нарушения, параличи, парезы, патология зрения и слуха и другие нарушения) и социальном прогнозе на уровне адаптации ребенка в основных сферах жизнедеятельности.
В случае отсутствия в структуре умственной отсталости клинически значимых поведенческих нарушений, соматоневрологической патологии к оценка степени нарушенных психических функций производится по степени интеллектуальной недостаточности.
У детей в возрасте 3 года и старше степень интеллектуальной недостаточности оценивается по клиническим проявлениям и данным адаптированных теста Векслера: дети от 4 до 7 лет - тест WPPSI (Wechsler Preschool and Primary Scale of Intelligence); тест WISC (Wechsler Intelligence Scale for Childre нарушениями речи или слуха, с выраженной социально-педагогической запущенностью, с задержками навыков чтения и письма для тестирования де предпочтительнее использовать детский вариант теста Равена, для тестирования детей и подростков (от 7 до 15 лет 11 месяцев) и тест WAIS (Wechsl Intelligence Scale), предназначенный для тестирования взрослых (от 16 лет и старше). При невозможности оценки степени интеллектуального дефект Векслера в связи с особенностями клинической симптоматики и возраста ребенка оценка производится только клинически по результатам динамиче наблюдения (заключение ВК ПНД).
При наличии в структуре умственной отсталости системного недоразвития речи различной степени количественно оцениваются и нарушения языко функций.

5.2.1			Легкая умственная отсталость	F70		
5.2.1.1					Нарушения психических, языковых и речевых функций;	Для детей в возрасте 3 - 1 лет: легкая умственная отсталост

					МКФ: B 110 - 199, B 310 - 399.	при отсутстви сопутствующей симптоматики, либо сочетании с нарушениям поведения, соматоневрологической патологией, достигающим незначительной степени, чт не приводит к существенны нарушениям адаптации 3 - 7: IQ = 70 - 79 балло (детский WPPSI или WISC) 8 - 15: IQ = 70 - 79 балло (детский WISC); 16 - 17 лет: IQ = 65 - 69 балло (взрослый WAIS)
5.2.1.2					Нарушения психических, языковых и речевых функций; МКФ: B 110 - 199, B 310 - 399	Для детей в возрасте 3 - 1 лет: легкая умственная отсталост в сочетании с нарушениям поведения, соматоневрологической патологией, достигающим умеренной степени существенно затрудняющим адаптацию в основных сфера жизнедеятельности. 3 - 7 лет: IQ = 50 - 79 балло (детский, WPPSI или WISC); 8 - 15 лет: IQ = 50 - 79 балло (детский WISC);

						16 - 17 лет: IQ = 50 - 69 балло (взрослый WAIS)
5.2.1.3					Нарушения психических, языковых и речевых функций, функций пищеварительной системы, нарушения мочевыделительной функции; МКФ: B 110 - 199, B 310 - 399, B 510 - 539, B 610 - 639	Для детей в возрасте 3 - 1 лет: легкая умственная отсталост в сочетании с нарушениям поведения, соматоневрологической патологией, достигающим выраженной степени, чт приводит к частично дезадаптации в основны сферах жизнедеятельности. 3 - 7 лет: IQ = 50 - 79 балло (детский, WPPSI или WISC). 8 - 15 лет: IQ = 50 - 79 балло (детский WISC); 16 - 17 лет: IQ = 50 - 69 балло (взрослый WAIS). Нарушение контроля функци тазовых органов
5.2.2			Умеренная умственная отсталость	F71		
5.2.2.1					Нарушения психических, языковых и речевых функций, функций пищеварительной системы, нарушения мочевыделительной	Для детей в возрасте 3 - 1 лет: умеренная умственна отсталость (IQ = 35 - 4 баллов) при отсутствии или сочетании с нарушениям

					функции; МКФ: B 110 - 199, B 310 - 399, B 510 - 539, B 610 - 639	поведения, соматоневрологической патологией, достигающим выраженной степени, чт приводит к выраженно дезадаптации в основны сферах жизнедеятельности требующей частичного уход и надзора. Нарушение контроля функци тазовых органов
5.2.2.2					Нарушения психических, языковых и речевых функций, функций пищеварительной системы, нарушения мочевыделительной функции; МКФ: B 110 - 199, B 310 - 399, B 510 - 539, B 610 - 639	Для детей в возрасте 3 - 1 лет: умеренная умственна отсталость (IQ = 35 - 4 баллов) в сочетании с значительно выраженным психопатологическими состояниями в структур дефекта (некоррегируемы нарушения аффективно сферы, поведения, влечения грубая соматоневрологическая симптоматика, значительн выраженные пароксизмальны расстройства и прочи расстройства), приводящие полной дезадаптации основных сфера жизнедеятельности

						необходимостью постоянног ухода и надзора. Нарушение или отсутстви контроля функции тазовы органов
5.2.3			Тяжелая умственная отсталость	F72		
5.2.3.1					Нарушения психических, языковых и речевых функций, нарушения функций пищеварительной системы, нарушения мочевыделительной функции; МКФ: B 110 - 199, B 310 - 399, B 510 - 539, B 610 - 639	Для детей в возрасте 3 - 1 лет: тяжелая умственна отсталость (IQ = 20 - 3 балла), приводящая к полно дезадаптации в основны сферах жизнедеятельности необходимостью постоянног ухода и надзора. Нарушение или отсутстви контроля функции тазовы органов
5.2.4			Глубокая умственная отсталость	F73		
5.2.4.1					Нарушения психических, языковых и речевых функций, функций пищеварительной системы, нарушения мочевыделительной функции; МКФ: B 110 - 199, B 310 -	Для детей в возрасте 3 - 1 лет: глубокая умственна отсталость (IQ < 20 баллов) приводящая к полно дезадаптации в основны сферах жизнедеятельности необходимостью постоянног

					399, B 510 - 539, B 610 - 639	ухода и надзора. Отсутствие контроля функци тазовых органов
5.3		Шизофрения, шизотипические состояния и бредовые расстройства		F20 - F29		
Примечание к подпункту 5.3. Количественная оценка нарушений психических функций ребенка в возрасте до 18 лет при периодическом (рекуррентном) типе шизофрении зави начала заболевания, темпа течения и стадии процесса, выраженности и стойкости основного синдрома (синдромов) в приступе, длительности и част характера, динамики и степени выраженности дефицитарной симптоматики; выраженности аффективных нарушений, выраженности регресса, а формирования, стойкости, выраженности и качества ремиссии (дефекта), наличия критики к своему состоянию и окружающей действительности прогноза, уровня социальной адаптации в основных сферах жизнедеятельности (семейной, бытовой, социально-средовой, в ситуации обучения).						
5.3.1			Шизофрения, эпизодический ремиттирующий тип течения	F20		
			параноидная	F20.0		
			гебефреническая	F20.1		
			кататоническая	F20.2		
			недифференцированная	F20.3		
			постшизофреническая депрессия	F20.4		
			простой тип	F20.6		

			другой тип неуточненная шизоаффективное расстройство	F20.8 F20.9 F25		
5.3.1.1					Нарушения психических, языковых и речевых функций; МКФ: B 110 - 139, B 140 - 189, B 198, B 199, B 310 - 340, B 398, B 399	Для детей в возрасте 4 - 1 лет: обострения обще продолжительностью до месяцев в год; стойка ремиссия, наличи незначительной дефицитарной симптоматик без существенного влияния н социальную адаптацию обучение ребенка
5.3.1.2					Нарушения психических, языковых и речевых функций; МКФ: B 110 - 139, B 140 - 189, B 198, B 199, B 310 - 340, B 398, B 399	Для детей в возрасте 4 - 1 лет: обострения обще продолжительностью от 2 до месяцев в год; неполна ремиссия с резидуально симптоматикой; наличи умеренной дефицитарно симптоматики, существенн затрудняющие адаптацию основных сфера жизнедеятельности
5.3.1.3					Нарушения психических,	Для детей в возрасте 4 - 1

					языковых и речевых функций; МКФ: B 110 - 199, B 310 - 399	лет: затяжные или часты обострения обще продолжительностью от 4 более месяцев в год; неполна ремиссия с резидуально симптоматикой, резистентно к терапии; наличи выраженной дефицитарно симптоматики, приводящие дезадаптации в основны сферах жизнедеятельности
5.3.2			Шизофрения: эпизодический тип течения со стабильным дефектом, эпизодический тип течения с нарастающим дефектом: параноидная гебефреническая кататоническая недифференцированная постшизофреническая депрессия, остаточная (резидуальная)	F20.1 F20.2 F20.0 F20.1 F20.2 F20.3 F20.4 F20.5		

			простой тип	F20.6		
			другой тип	F20.8		
			неуточненная	F20.9		
Примечание к подпункту 5.3.2. Количественная оценка нарушений психических функций ребенка в возрасте до 18 лет при приступообразно-прогредиентной шизофрении завис начала заболевания, темпа течения и стадии процесса, выраженности и стойкости основного синдрома (синдромов), длительности и частоты прист динамики и степени выраженности дефицитарной (негативной) симптоматики, от выраженности регрессивных расстройств, этапа формирован выраженности и качества ремиссии (дефекта), от наличия интеллектуального снижения, степени выраженности процессуальных изменений личн синдромов, от наличия критики к своему состоянию и окружающей действительности; клинического прогноза; уровня социальной адаптации в ос жизнедеятельности (семейной, бытовой социально-средовой в ситуации обучения).						
5.3.2.1					Нарушения психических, языковых и речевых функций; МКФ: B 110 - 199, B 310 - 399	Для детей в возрасте 4 - 1 лет: обострения обще продолжительностью от 4 до месяцев в год; неполна ремиссия с умеренно дефицитарной симптоматикой; умеренным эндогенными изменениям личности; незначительное/умеренное снижение интеллекта: 4 - 15 лет: IQ = 50 - 69 балло - детский WISC; 16 - 17 лет: IQ = 50 - 6 (взрослый WAIS)
5.3.2.2					Нарушения психических, языковых и речевых	Для детей в возрасте 4 - 1 лет:

					функций, функций пищеварительной системы, нарушения мочевыделительной функции; МКФ: B 110 - 199, B 310 - 399, B 510 - 539, B 610 - 639	обострения продолжительностью о 6 до месяцев в год; неполна ремиссия с резидуально симптоматикой, резистентно к терапии, выраженна дефицитарная симптоматика выраженные эндогенны изменения личности умеренное или выраженно (IQ 35 - 49 баллов) снижени интеллекта; нарушени контроля функции тазовы органов
5.3.2.3					Нарушения психических, языковых и речевых функций, функций пищеварительной системы, нарушения мочевыделительной функции; МКФ: B 110 - 199, B 310 - 399, B 510 - 539, B 610 - 639	Для детей в возрасте 4 - 1 лет: обострения продолжительностью более месяцев в год, часты обострения с продуктивно симптоматикой (аффективной кататонической, гебефренной гебоидной, галлюцинаторно-бредовой, помрачением сознания) значительно выраженна дефицитарная симптоматика эндогенные изменени личности; значительн выраженное снижени интеллекта (IQ < 34 баллов)

						отсутствие контроля функци тазовых органов
5.3.3			Шизофрения, непрерывный тип течения: параноидная гебефреническая кататоническая недифференцированная остаточная простая другой тип неуточненная	F20 F20.0 F20.1 F20.2 F20.3 F20.5 F20.6 F20.8 F20.9		
Примечание к подпункту 5.3.3. Количественная оценка нарушений психических функций граждан в возрасте до 18 лет при непрерывно-прогредиентном типе течения зависит от в процесса, темпа течения шизофрении (медленно-, средне-, быстро-прогредиентного), ее формы, стадии процесса, выраженности и стойкости основ (синдромов) "позитивного" спектра, синдромов непсихотического регистра, характера, динамики и степени выраженности дефицитарной выраженности регрессивных расстройств, этапа формирования, стойкости, выраженности и качества ремиссии (дефекта) при шизофрении, нали интеллектуального снижения, степени выраженности эндогенных изменений личности (синдрома аутизма), наличия критики к своему состоянию действительности; прогноза заболевания, уровня социальной адаптации в основных сферах жизнедеятельности (семейной, бытовой, социаль ситуации обучения).						
5.3.3.1					Нарушения психических, языковых и речевых	Для детей в возрасте 4 - 1 лет:

					функций; МКФ: B 110 - 199, B 310 - 399	незначительная продуктивна и/или дефицитарна симптоматика, незначительные эндогенны изменения личности (синдро аутизма и другие синдромы) отсутствие снижения ил незначительное снижени интеллекта: 4 - 15 лет: IQ = 7 - 79 баллов (детский, WISC) 16 - 17 лет: IQ = 65 - 69 балло (взрослый WAIS) сохранением критики ситуации в целом, н оказывающие существенног влияния на социальну адаптацию и обучение
5.3.3.2					Нарушения психических, языковых и речевых функций; МКФ: B 110 - 199, B 310 - 399	Для детей в возрасте 4 - 1 лет: умеренная продуктивна и/или дефицитарна симптоматика, умеренны эндогенные изменени личности (синдром аутизма другие синдромы); незначительное ил умеренное снижени интеллекта: 4 - 15 лет: IQ = 50 - 69 балло (детский WISC); 16 - 17 ле IQ = 50 - 64 (взрослый WAIS)

						существенно затрудняющи адаптацию в основных сфера жизнедеятельности
5.3.3.3					Нарушения психических, языковых и речевых функций, функций пищеварительной системы, нарушения мочевыделительной функции; МКФ: B 110 - 199, B 310 - 399, B 510 - 539, B 610 - 639	Для детей в возрасте 4 - 1 лет: выраженная продуктивна и/или дефицитарна симптоматика; выраженны эндогенные изменени личности (синдром аутизма другие синдромы); умеренно или выраженное (IQ = 35 - 4 баллов) снижение интеллекта нарушение контроля функци тазовых органов, приводящи к дезадаптации в основны сферах жизнедеятельности
5.3.3.4					Нарушения психических, языковых и речевых функций, функций пищеварительной системы, мочевыделительной функции; МКФ: B 110 - 199, B 310 - 399, B 510 - 539, B 610 - 639	Для детей в возрасте 4 - 1 лет: значительно выраженна продуктивная симптоматик и/или дефицитарна симптоматика; значительн выраженные эндогенны изменения личности (синдро аутизма и другие синдромы значительно выраженно снижение интеллекта: IQ < 3 баллов; нарушение ил отсутствие контроля функци

						тазовых органов, приводящи к полной дезадаптации основных сфера жизнедеятельности необходимостью постоянног ухода и надзора
Примечание к подпунктам 5.3.3.1 - 5.3.3.4. Указанные стойкие нарушения функций организма характерны для непрерывно-прогредиентного типа течения шизофрении, средне-прогредиентног						
5.3.3.5					Нарушения психических, языковых и речевых функций, функций пищеварительной системы, мочевыделительной функции; МКФ: B 110 - 199, B 310 - 399, B 510 - 539, B 610 - 639	Для детей в возрасте 4 - 1 лет: выраженная продуктивна симптоматика (кататоническая, кататоно-гебефренная, галлюцинаторная, бредовая прочие виды симптоматики) плохо поддающаяся терапии выраженная симптоматик непсихотического регистр (неврозоподобные, психопатоподобные, аффективные расстройства) выраженная дефицитарна симптоматика; выраженны проявления синдром аутизма; выраженно снижение интеллекта (IQ = 3 - 49 баллов); нарушени контроля функции тазовы органов с быстры

						формированием стойког выраженного исходног состояния (дефекта) социальной дезадаптации
5.3.3.6					Нарушения психических, языковых и речевых функций, функций пищеварительной системы, мочевыделительной функции; МКФ: B 110 - 199, B 310 - 399, B 510 - 539, B 610 - 639	Для детей в возрасте 4 - 1 лет: выраженная продуктивна симптоматика (гебоидная кататоническая, кататоно-гебефренная, кататоно-галлюцинаторная, бредовая и так далее) резистентная к терапии значительно выраженна дефицитарная симптоматика значительно выраженны проявления синдром аутизма; значительн выраженное снижени интеллекта (IQ < 34 баллов) нарушение или отсутстви контроля функции тазовы органов с быстры формированием стойког значительно выраженног исходного состояни (шизофренического слабоумия)

Примечание к подпунктам 5.3.3.5 - 5.3.3.6.
Указанные стойкие нарушения функций организма характерны для непрерывно-прогредиентного типа течения шизофрении, быстро прогредиент

(злокачественного).						
5.3.4			Шизофрения, шизотипические состояния и бредовые расстройства	F21		
5.3.4.1					Нарушения психических, языковых и речевых функций; МКФ: B 110 - 199, B 310 - 399	Для детей в возрасте 4 - 1 лет: медленно прогредиентно течение со стойко незначительной симптоматикой непсихотического регистра, незначительной дефицитарной симптоматикой, незначительными эндогенными изменениям личности, отсутстви снижения или незначительно снижение интеллекта: 4 - 1 лет: IQ = 70 - 79 балло (детский, WPPSI или WISC) 16 - 17 лет: IQ = 65 - 69 балло (взрослый WAIS), н оказывающие существенног влияния на социальну адаптацию и обучени ребенка
5.3.4.2					Нарушения психических,	Для детей в возрасте 4 - 1

					языковых и речевых функций; МКФ: B 110 - 199, B 310 - 399	лет: медленно прогредиентно течение со стойкой умеренно симптоматикой непсихотического регистра умеренной дефицитарно симптоматикой, умеренным эндогенными изменениям личности; незначительное ил умеренное снижени интеллекта: 4 - 15 лет: IQ = 5 - 69 баллов (детский WPPS или WISC); 16 - 17 лет: IQ 50 - 64 (взрослый WAIS) существенно затрудняющим адаптацию в основных сфера жизнедеятельности
5.3.4.3					Нарушения психических, языковых и речевых функций, функций пищеварительной системы, мочевыделительной функции; МКФ: B 110 - 199, B 310 - 399, B 510 - 539, B 610 - 639	Для детей в возрасте 4 - 1 лет: медленно прогредиентно течение со стойко выраженной симптоматико непсихотического регистра выраженной дефицитарно симптоматикой, выраженными эндогенным изменениями личности умеренное или выраженно (IQ = 35 - 49 балла) снижени интеллекта; нарушени контроля функции тазовы

						органов, приводящие дезадаптации в основны сферах жизнедеятельности
5.3.4.4					Нарушения психических, языковых и речевых функций, функций пищеварительной системы, мочевыделительной функции; МКФ: B 110 - 199, B 310 - 399, B 510 - 539, B 610 - 639	Для детей в возрасте 4 - 1 лет: значительно выраженны психопатоподобные расстройства, сочетани психопатоподобных расстройств с гебоидны синдромом, значительн выраженная истеро-конверсионная симптоматика (истерически амавроз, истерически псевдопаралич нижни конечностей и прочие) ситуативно-неадекватным поведением, отсутствие критики некорректируемыми нарушениями патологически влечений; нарушение ил отсутствие контроля функци тазовых органов, приводящи к полной дезадаптации основных сфера жизнедеятельности необходимостью постоянног ухода и надзора

Примечание к подпунктам 5.3.4.1 - 5.3.4.4. Указанные стойкие нарушения функций организма характерны для непрерывно-прогредиентного типа течения шизофрении, медленно прогредиент (вялотекущая шизофрения).						
5.4			Расстройства настроения (аффективные расстройства)	F30 - F39		
Примечание к подпункту 5.4. Количественная оценка нарушений психических функций ребенка в возрасте до 18 лет при аффективных расстройствах (маниакальных, смешанных) зависит от вида симптоматики и интенсивности ее проявлений, частоты и длительности эпизодов, эффективности проводимого лече стойкости и длительности ремиссий, наличия критики к своему состоянию и окружающей действительности, клинической и социальной болезненного состояния, уровня социальной адаптации в основных сферах жизни ребенка (семейной, бытовой, социально-средовой, в ситуации обуч						
5.4.1					Нарушения психических, языковых и речевых функций; МКФ: B 110 - 139, B 140 - 189, B 198, B 199, B 310 - 340, B 398, B 399	Для детей в возрасте 0 - 1 лет: аффективные расстройств незначительные, купирующиеся фармакотерапией, со стойко ремиссией, существенно н сказывающиеся на адаптаци основных сфе жизнедеятельности
5.4.2					Нарушения психических, языковых и речевых функций; МКФ: B 110 - 199, B 310 - 399	Для детей в возрасте 0 - 1 лет: стойкие затяжные или часты аффективные расстройства умеренные, обще продолжительностью более месяцев в год, затрудняющи адаптацию в основных сфера

						жизнедеятельности
5.4.3					Нарушения психических, языковых и речевых функций; МКФ: B 110 - 199, B 310 - 399	Для детей в возрасте 0 - 1 лет: выраженные аффективны расстройства, затяжные ил частые, обще продолжительностью более 1 месяцев в год, приводящие дезадаптации в основны сферах жизнедеятельности
5.4.4					Нарушения психических, языковых и речевых функций; МКФ: B 110 - 199, B 310 - 399	Для детей в возрасте 0 - 1 лет: стойкие затяжные или часты значительно выраженны аффективные расстройств общей продолжительность более 10 месяцев в год, нуждаемостью в постоянно уходе и надзоре
5.5.			Невротические, связанные со стрессом и соматоформные расстройства	F40 - F48		

Примечание к подпункту 5.5.
Количественная оценка нарушений психических функций ребенка в возрасте до 18 лет при различных формах неврозов детского и подросткового во от вида, длительности и динамики невротических расстройств (реакция, состояние, затяжное состояние, невротическое или патохарактерологич личности), вида и выраженности невротического синдрома (в том числе синдромов регресса - мутизм, регресс навыков опрятности, мотор эффективности проводимой терапии, наличия критики к своему состоянию и ситуации; клинической и социальной компенсации болезненного сост защитных ритуалов, других методов аффективной защиты), а также уровня социальной адаптации в основных сферах жизнедеятельности (семей

социально-средовой, в ситуации обучение). К незначительным нарушениям психических функций относятся кратковременные невротические состояния (длительность до 1 года) либо стойкий синдром длительностью свыше 1 года с незначительной клинической симптоматикой; к умеренным нарушениям - затяжное невротическое состояни 5 - 6 лет) при наличии стойких умеренных клинических проявлений (неврастенической, фобической, тревожной, обсессивно-компульсивной, ипохондрической, регрессивной (задержка формирования экспрессивной речи, социальных навыков, навыков опрятности) симптоматики).						
5.5.1					Нарушения психических, языковых и речевых функций; МКФ: B 110 - 199, B 310 - 399	Для детей в возрасте 4 - 7 лет: незначительные соматовегетативные расстройства, обсесси (фобии, идеаторные моторные обсессии) элементами чуждости, формированием просты компенсаторных ритуало аффективные нарушени (адинамическая, тревожна депрессия и прочие) синдромы дереализации деперсонализации, симптом регресса
5.5.2					Нарушения психических, языковых и речевых функций; МКФ: B 110 - 199, B 310 - 399	Для детей в возрасте 8 - 1 лет: незначительные невротические состояни (истерические, неврастенические, фобо-обсессивные и прочие) возможно присоединени ипохондрического синдром без склонности к затяжном

						течению
5.5.3					Нарушения психических, языковых и речевых функций; МКФ: B 110 - 199, B 310 - 399	Для детей в возрасте 4 - 7 лет сложные обсессии элементами навязчивости чуждости, с формированием защитных формировани (ритуалов), аффективны нарушения (депрессия) синдромы дереализации деперсонализации, синдром регресса
5.5.4					Нарушения психических, языковых и речевых функций; МКФ: B 110 - 199, B 310 - 399	Для детей в возрасте 8 - 1 лет: стойкие умеренны невротические состояни (истерические, неврастенические, фобо-обсессивные, и прочие возможно присоединени ипохондрического синдром со склонностью к затяжном течению.
5.5.5					Нарушения психических, языковых и речевых функций; МКФ: B 110 - 199, B 310 - 399	Для детей в возрасте 4 - 1 лет: затяжное течение стойки выраженных невротически состояний (истерически неврастенические, фобо-обсессивные,

						сенесто-ипохондрические прочие состояния) возможным переходом патологическое развити личности
5.5.6					Нарушения психических, языковых и речевых функций; МКФ: B 110 - 199, B 310 - 399	Для детей в возрасте 8 - 1 лет: стойкое невротическое ил патохарактерологическое развитие личности формированием сверхценно идеи со значительн выраженной истероконверсионной симптоматикой (истерически амавроз, истерически псевдопаралич нижни конечностей и прочие вид симптоматики)
5.6			Органические, включая симптоматические, психические расстройства Эмоциональные расстройства поведения, начинающиеся обычно в детском и подростковом возрасте	F04 - F09 F90 - F98		
Примечание к подпункту 5.6						

Количественная оценка нарушений психических функций ребенка в возрасте до 18 лет при церебрально-органической патологии зависит от н принадлежности, стадии заболевания; вида и степени выраженности нарушений психических процессов (по органическому или астеничес психоорганический и астенический синдромы соответственно), наличия и степени выраженности синдромов личностного регистра (нев психопатоподобных расстройств) и сопутствующей симптоматики (психотической, аффективной, пароксизмальной и иных видов симптоматик степени снижения интеллекта, нарушений языковых и речевых функций, а также уровня социальной адаптации в основных сферах жизн (семейно-бытовой, социально-средовой, в ситуации обучения).						
5.6.1					Нарушения психических, языковых и речевых функций; МКФ: B 110 - 199, B 310 - 399	Для детей в возрасте 0 - 1 лет: незначительные когнитивны нарушения, незначительна или умеренная астеническа симптоматика, незначительный гипердинамический синдром синдром дефицита внимания гиперактивностью, незначительный психоорганический синдром незначительные расстройств личностного регистр (неврозоподобные, психопатоподобные прочие), незначительны аффективные и други стойкие незначительны расстройства непсихотического регистра не затрудняющие адаптацию основных сфера жизнедеятельности. Отсутствие нарушения ил

						незначительное нарушени языковых и речевых функций Отсутствие снижения ил незначительное снижени интеллекта: 3 - 15 лет: IQ = 7 - 79 баллов (детский WISC WPPSI); 16 - 17 лет: IQ = 65 69 баллов (взрослый WAIS)
5.6.2					Нарушения психических, языковых и речевых функций; МКФ: B 110 - 199, B 310 - 399	Для детей в возрасте 0 - 1 лет: умеренное снижени когнитивных процессов выраженная астеническа симптоматика, умеренны гипердинамический синдром синдром дефицита внимания гиперактивностью, умеренный психоорганический синдром умеренные расстройств личностного регистр (неврозоподобные, психопатоподобные прочие), умеренны аффективные и други стойкие умеренны расстройства непсихотического регистра стойкие умеренные синдром психотического регистр (синдром галлюциноз

						бредовые расстройства затрудняющие адаптацию основных сфера жизнедеятельности. Возможно сочетание незначительными/умеренным и нарушениями языковых речевых функций и/или незначительным/умеренным снижением интеллекта: 3 - 1 лет: IQ = 50 - 69 балло (детский WPPSI или WISC) 16 - 17 лет: IQ = 50 - 6 (взрослый WAIS)
5.6.3					Нарушения психических, языковых и речевых функций, функций пищеварительной системы, мочевыделительной функции; МКФ: B 110 - 199, B 310 - 399, B 510 - 539, B 610 - 639	Для детей в возрасте 0 - 1 лет: выраженное снижени когнитивных процессов выраженный гипердинамический синдром синдром дефицита внимания гиперактивностью, выраженный психоорганический синдром выраженные расстройств личностного регистр (неврозоподобные, психопатоподобные), стойки выраженные аффективные другие выраженны расстройства

						непсихотического регистра стойкие выраженны синдромы психотическог регистра (синдро галлюциноза, бредовы расстройства), приводящие дезадаптации в основны сферах жизнедеятельности. Возможно сочетание умеренными/выраженными нарушениями языковых речевых функций и/или умеренным/выраженным (IQ = 35 - 49 баллов) снижение интеллекта. Нарушение контроля функци тазовых органов
5.6.4					Нарушения психических, языковых и речевых функций, функций пищеварительной системы, мочевыделительной функции; МКФ: B 110 - 199, B 310 - 399, B 510 - 539, B 610 - 639	Для детей в возрасте 0 - 1 лет: значительно выраженно снижение когнитивны процессов и интеллекта (IQ 34); отсутствие контроля функци тазовых органов необходимость в постоянно уходе и надзоре.
5.7			Эпизодические и пароксизмальные расстройства	G40 - G47		

			Другие виды генерализованной эпилепсии и эпилептических синдромов Синдром Ландау-Клеффнера	G40.4 F80.3		

Примечание к подпункту 5.7.
Количественная оценка выраженности нарушений психических функций ребенка в возрасте до 18 лет при эпилепсии и эпилептических синдро возраста, в котором началось заболевание, причины возникновения патологии (идиопатический или симптоматический генез приступов) эпилептического очага, вида, частоты и тяжести эпилептических припадков; типа течения заболевания (прогредиентный, доброкачественный, рем прочие), объема и эффективности проводимой противоэпилептической терапии, наличия резистентности к ней, длительности межприступного пе эпилептических приступов оценивается на протяжении календарного года, обязательным условием является наличие противоэпилептиче Необходимо также учитывать наличие, структуру и степень выраженности симптоматики патопсихологического уровня реагирования, интелл когнитивного снижения, расстройств устной и письменной речи; наличие и степень выраженности нарушений развития психомоторных, речевы навыков.
Маркером неблагоприятного клинического и реабилитационного прогноза при эпилепсии и эпилептических синдромах детского возра злокачественные формы группы так называемых "эпилептических энцефалопатий" с ранним дебютом (на первом году жизни), включающих си Отахара, Драве, Айкарди, раннюю миоклоническую энцефалопатию, синдром Леннокса-Гасто, эпилептическую энцефалопатию с продолженной с активностью во сне. Для данной группы энцефалопатий характерно злокачественное прогредиентное течение, резистентность к противосудоро отсутствие прогресса психического, речевого и моторного развития ребенка на первом году жизни, формирование тяжелой и глубокой инт недостаточности

5.7.1.					Нарушения психических, языковых и речевых функций; МКФ: B 110 - 199, B 310 - 399	Для детей в возрасте 0 - года: незначительные пароксизмальные расстройства: легки припадки до 3 в день, тяжелы - 1 раз в месяц и реже

						сумеречное расстройств сознания, особые состояни сознания, амбулаторны автоматизм - 1 раз и реже в месяца; и/или незначительна стойкая задержк психомоторного, речевог развития и социальны навыков в структур основного заболевания
5.7.2					Нарушения психических, языковых и речевых функций; МКФ: B 110 - 199, B 310 - 399	Для детей в возрасте 4 - 1 лет: незначительные пароксизмальные расстройства: легки припадки до 3 в день, тяжелы - 1 раз в месяц и реже сумеречное расстройств сознания, особые состояни сознания, амбулаторны автоматизм - 1 раз и реже в месяца; и/или наличи незначительной патопсихологической симптоматики, незначительного нарушени устной и/или письменно речи; отсутствие снижени или незначительное снижени интеллекта: 4 - 17 лет: IQ = 70 - 79 балло

						(детский, WISC); 16 - 17 лет: IQ = 65 - 69 балло (взрослый WAIS)
5.7.3					Нарушения психических, языковых и речевых функций; МКФ: B 110 - 199, B 310 - 399	Для детей в возрасте 0 - года: легкие припадки (3 - 4 в день в сочетании со стойко умеренной задержко психомоторного, речевог развития и социальны навыков; тяжелые припадки - 2 раза месяц; выраженные дисфории - 1 ра и реже в месяц; сумеречны расстройства сознания ил особые состояния сознания - раз и реже в 1,5 месяца амбулаторный автоматизм 2 3 раза в месяц, дисфории 1 ра и реже в месяц эпилептический статус серийные припадки - 1 раз в месяца и/или проявлени стойкой умеренной задержк психомоторного, речевог развития и социальны навыков в структур основного заболевания
5.7.4					Нарушения психических,	Дня детей в возрасте 4 - 1

					языковых и речевых функций; МКФ: B 110 - 199, B 310 - 399	лет: легкие припадки (3 - 4 в день в сочетании с умеренным изменениями личности умеренной патопсихологической симптоматикой; тяжелые припадки - 2 раз месяц; выраженные дисфории - 1 ра и реже в месяц; сумеречны расстройства сознания ил особые состояния сознания - раз и реже в 1,5 месяца амбулаторный автоматизм 2 3 раза в месяц эпилептический статус серийные припадки - 1 раз в месяца; и/или умеренна патопсихологическая симптоматика (психопатоподобные расстройства, психоорганический синдром прочие); умеренны нарушения устной письменной речи; умеренно снижение интеллекта: 4 - 15 лет: IQ = 50 - 69 балло (детский, WISC); 16 - 17 лет: IQ = 50 - 64 балл (взрослый WAIS)

5.7.5					Нарушения психических, языковых и речевых, сенсорных, нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций, функций пищеварительной системы, мочевыделительной функции; МКФ: B 110 - 199, B 310 - 399, B 210 - 299, B 710 - 799, B 510 - 539; B 610 - 639	Для детей в возрасте 0 - года: легкие припадки 5 и более день в сочетании со стойко умеренной задержко психомоторного, речевог развития и социальны навыков; тяжелые припадки с частото 3 раза в месяц, сумеречны расстройства сознания ил особые состояния сознания - раз в месяц, выраженны дисфории - 2 - 3 раза в месяц амбулаторные автоматизмы раза в месяц и более эпилептический статус серийные припадки любо частоты (не контролируемо течение, резистентность терапии) и/или проявлени стойкой выраженно задержки (регресса психомоторного, речевог развития и социальны навыков в структур основного заболевания
5.7.6					Нарушения психических, языковых и речевых, сенсорных, нейромышечных, скелетных	Для детей в возрасте 4 - 1 лет: легкие припадки 5 и более ра в день в сочетании

					и связанных с движением (статодинамических) функций, функций пищеварительной системы, мочевыделительной функции; МКФ: B 110 - 199, B 310 - 399, B 210 - 299, B 710 - 799, B 510 - 539; B 610 - 639	выраженной патопсихологической симптоматикой, выраженными изменениям личности; выраженны снижением интеллекта (IQ = 35 - 49 баллов); тяжелые припадки с частото 3 раза в месяц эпилептический статус серийные припадки любо частоты, сумеречны расстройства сознания ил особые состояния сознания - раз в месяц, выраженны дисфории - 2 - 3 раза в месяц амбулаторные автоматизмы раза в месяц и более и/ил стойкая выраженна патопсихологическая симптоматика (психопатоподобные расстройства, психоорганический синдром прочие), выраженна симптоматика психотическог регистра; выраженно снижение интеллекта (IQ = 3 - 49 баллов); нарушение контроля функци тазовых органов

5.7.7					Нарушения психических, языковых и речевых, сенсорных, нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций, функций пищеварительной системы, мочевыделительной функции; МКФ: B 110 - 199, B 310 - 399, B 210 - 299, B 710 - 799, B 510 - 539, B 610 - 639	Для детей в возрасте 0 - года: синдромы групп "эпилептических энцефалопатий" (синдро Веста, Айкарди, Отахар Драве, ранняя миоклоническая энцефалопатия, синдро Леннокса-Гасто, эпилептическая энцефалопатия продолженной спайк-волновой активность во сне и прочие синдромы) ранним дебютом (на перво году жизни), прогредиентны течением, резистентностью противоэпилептической терапии, значительн выраженной задержко развития психомоторных речевых и социальны навыков в структур основного заболевания
5.7.8					Нарушения психических, языковых и речевых, сенсорных, нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических)	Для детей в возрасте 4 - 1 лет: тяжелые припадки - 4 и боле раз в месяц, 2 и боле сумеречных расстройств сознания или особы

					функций, нарушения функций пищеварительной системы, мочевыделительной функции; МКФ: B 110 - 199, B 310 - 399, B 210 - 299, B 710 - 799, B 510 - 539, B 610 - 639	состояния сознания, 4 и боле эпизодов выраженно дисфории, 1 и более эпистату в месяц; и/или значительн выраженная патопсихологическая симптоматика, симптоматик психотического регистра отсутствие речи, значительн выраженное снижени интеллекта (IQ < 34 баллов) отсутствие контроля функци тазовых органов
6	Болезни нервной системы (класс VI) и поражения нервной системы, представленные в других классах			G00 - G99		

Примечание к пункту 6.
Количественная оценка степени выраженности стойких нарушений функций организма ребенка в возрасте до 18 лет, обусловленная заболева системы, основывается преимущественно на оценке степени выраженности двигательных нарушений (параличи, парезы, атаксия, гиперкинезы), опору и передвижение, способность осуществлять простые и сложные виды движений, а также на оценке наличия и степени выраженности психич и языковых, сенсорных нарушений функций организма. Учитываются также и другие факторы патологического процесса: клиническая форма, течения заболевания, активность процесса, длительность и частота обострений, наличие и курабельность пароксизмальных состояний; распр

патологического процесса, наличие осложнений, факторы клинического и реабилитационного прогноза.						
6.1		Последствия травм, отравлений и других воздействий внешних причин		T90 - T98		
6.1.1			Последствия травм головы (последствия ушиба головного мозга) Последствия воспалительных заболеваний центральной нервной системы	T90 G09		
6.1.1.1					Нарушения психических, языковых, и речевых, сенсорных, нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций; МКФ: B 110 - 199, B 310 - 399, B 210 - 299, B 710 - 799	Для детей в возрасте 0 - 1 лет: незначительные нарушени статодинамических функций легкий гемипарез, легки парез, парапарез; легки атактический синдром другие легкие очаговы нарушения. Незначительные нарушени психических, языковых речевых, сенсорных функций 0 - 3 года: незначительна задержка психомоторного речевого развития в структур основного заболевания

6.1.1.2					Нарушения психических, языковых, и речевых, сенсорных, нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций; МКФ: B 110 - 199, B 310 - 399, B 210 - 299, B 710 - 799	Для детей в возрасте 0 - 1 лет: умеренные нарушени статодинамических функций легкий тетрапарез, умеренны гемипарез; умеренны парапарез; умеренны атактический синдром другие умеренные очаговы нарушения. Умеренные нарушени психических, языковых речевых, сенсорных функций 0 - 3 года: умеренная задержк психомоторного и речевог развития в структур основного заболевания
6.1.1.3					Нарушения психических, языковых и речевых, сенсорных, нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций, функций пищеварительной системы, мочевыделительной функции; МКФ: B 110 - 199, B 310 - 399, B 210 - 299, B 710 - 799, B 510 - 539, B 610 - 639	Для детей в возрасте 0 - 1 лет: выраженные нарушени статодинамических функций умеренный тетрапарез выраженный гемипарез выраженный парапарез выраженный парез выраженный атактически синдром и други выраженные очаговы нарушения. Выраженные нарушени психических, языковых

						речевых, сенсорных функций Нарушение контроля функци тазовых органов. 0 - 3 года: выраженна задержка психомоторного речевого развития в структур основного заболевания
6.1.1.4					Нарушения психических, языковых и речевых, сенсорных, нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций, функций пищеварительной системы, мочевыделительной функции; МКФ: B 110 - 199, B 310 - 399, B 210 - 299, B 710 - 799, B 510 - 539, B 610 - 639	Для детей в возрасте 0 - 1 лет: значительно выраженны нарушения статодинамической функции значительно выраженны парапарез (либо параплегия) значительно выраженны гемипарез (либо плегия) выраженный/значительно выраженный тетрапаре (тетраплегия); значительн выраженная статическая динамическая атакси (самостоятельное передвижение невозможно). Значительно выраженны нарушения психических языковых и речевых сенсорных функций. Отсутствие контроля функци тазовых органов. Вегетативное состояние

6.2		Наследственная атаксия		G11		
6.2.1			Врожденная непрогрессирующая атаксия Атаксия Фридрейха (ранняя мозжечковая атаксия) Мозжечковая атаксия с нарушением репарации ДНК Другая наследственная атаксия	G11.0 G11.01 G11.3 G11.8		
6.2.1.1					Нарушения психических, языковых и речевых, сенсорных, нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций, нарушения функций сердечно-сосудистой системы; МКФ: B 110 - 199, B 310 - 399, B 210 - 299, B 710 - 799, B 410 - 429	Для детей в возрасте 0 - 1 лет: незначительные нарушени координации и равновесия целевой моторики незначительные легки сенситивно-мозжечковые нарушения, выявляемы только при выполнени специальных тестов, н нарушающие адаптацию функционирование ребенка. Незначительные нарушени функций организма

6.2.1.2					Нарушения психических, языковых и речевых, сенсорных, нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций, нарушения функций сердечно-сосудистой системы; МКФ: B 110 - 199, B 310 - 399, B 210 - 299, B 710 - 799, B 410 - 429	Для детей в возрасте 0 - 1 лет: умеренные нарушени координации и равновеси целевой моторики; умеренны сенситивно-мозжечковые нарушения, выявляемые пр выполнении обычны движений, нарушающи опору и передвижени препятствующие формированию возрастны навыков. Умеренные нарушени функций организма
6.2.1.3					Нарушения психических, языковых и речевых, сенсорных функций; нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций; нарушения функций сердечно-сосудистой системы; МКФ: B 110 - 199, B 310 - 399, B 210 - 299, B 710 - 799, B 410 - 429	Для детей в возрасте 0 - 1 лет: выраженные нарушени координации и равновеси целевой моторики выраженные сенситивно-мозжечковые нарушения (значительн затрудняется передвижени выполнение обычны движений). Выраженные нарушени функций организма
6.2.1.4					Нарушения психических, языковых и речевых,	Для детей в возрасте 0 - 1 лет:

					сенсорных функций; нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций; нарушения функций сердечно-сосудистой системы; МКФ: B 110 - 199, B 310 - 399, B 210 - 299, B 710 - 799, B 410 - 429	значительно выраженны нарушения координации равновесия, целево моторики; значительн выраженные сенситивно-атактические нарушения. Значительно выраженны нарушения функци организма
6.2.2			Болезнь Штрюмпелля (наследственная спастическая параплегия) - изолированная и осложненная формы	G11.4		
6.2.2.1					Нарушения психических, языковых и речевых, сенсорных функций; нарушения нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций; МКФ: B 110 - 199, B 310 - 399, B 210 - 299, B 710 - 799	Для детей в возрасте 0 - 1 лет: легкий парез нижни конечностей (снижени мышечной силы до 4 баллов без ограничения объем активных движений нарушения опоры передвижения, бе деформаций стоп формирования контрактур. Незначительные нарушени функций организма

6.2.2.2					Нарушения психических, языковых и речевых, сенсорных функций; нарушения нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций; МКФ: B 110 - 199, B 310 - 399, B 210 - 299, B 710 - 799	Для детей в возрасте 0 - 1 лет: умеренный парез нижни конечностей (снижени мышечной силы до 3 баллов с умеренным нарушение способности к передвижению формирование деформаци стоп, контрактур в суставах. Умеренные нарушени функций организма
6.2.2.3					Нарушения психических, языковых и речевых, сенсорных, нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций; МКФ: B 110 - 199, B 310 - 399, B 210 - 299, B 710 - 799	Для детей в возрасте 0 - 1 лет: выраженный парез нижни конечностей (снижени мышечной силы до 2 баллов с выраженным нарушение способности к передвижению с формированием деформаци стоп, контрактур в суставах. Выраженные нарушени функций организма
6.3			Спинальные амиотрофии	G12		
6.3.1					Нарушения психических, языковых и речевых, сенсорных, нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических)	Для детей в возрасте 0 - года: периферический легки тетрапарез, умеренны парапарез и/или умеренны парез проксимального отдел

					функций; МКФ: B 110 - 199, B 310 - 399, B 210 - 299, B 710 - 799	обеих нижних конечносте (снижение мышечной силы д 3 баллов). Умеренные бульбарны расстройства. Деформации скелета (сколио кифосколиоз) с умеренным нарушениями функци дыхательной системы. Нарушение формировани двигательных возрастны навыков
6.3.2					Нарушения языковых и речевых, нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций, функций сердечно-сосудистой, дыхательной, пищеварительной систем, нарушения мочевыделительной функции; МКФ: B 310 - 399, B 710 - 799, B 410 - 429, B 440 - 450, B 510 - 539, B 610 - 639	Для детей в возрасте 4 - 1 лет: генерализация атрофическог процесса: выраженны нижний парапарез, умеренны верхний парапарез. Деформации скелета (сколио кифосколиоз) с выраженным нарушениями функци дыхательной сердечно-сосудистой систем. Выраженные бульбарны расстройства. Нарушение контроля функци тазовых органов
6.3.3					Нарушения языковых и речевых, нейромышечных, скелетных и связанных с	Для детей в возрасте 0 - 1 лет: генерализация атрофическог

					движением (статодинамических) функций, функций сердечно-сосудистой, дыхательной, пищеварительной систем, нарушения мочевыделительной функции; МКФ: B 310 - 399, B 710 - 799, B 410 - 429, B 440 - 450, B 510 - 539, B 610 - 639	процесса: значительн выраженный периферически тетрапарез. Тяжелы деформации скелета (сколио кифосколиоз), нарушени функций дыхательной сердечно-сосудистой систем достигающих значительн выраженной степени. Значительно выраженны бульбарные псевдобульбарные нарушения. Отсутствие контроля функци тазовых органов
6.4		Экстрапирамидные и другие двигательные нарушения		G20 - G26		
6.4.1			Дистония Идиопатическая семейная дистония Другие экстрапирамидные и двигательные нарушения. Экстрапирамидные и двигательные нарушения при болезнях,	G24 G24.1 G25 G26		

			классифицированных в других рубриках			
6.4.1.1					Нарушения психических функций, нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций; МКФ: B 110 - 199, B 710 - 799	Для детей в возрасте 0 - 1 лет: легкие фокальные генерализованные гиперкинезы не изменяющи физиологическое положени тела, обща целенаправленность движений и действи сохранена. Наличие незначительны нарушений психически функций
6.4.1.2					Нарушения психических функций, нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций; МКФ: B 110 - 199, B 710 - 799	Для детей в возрасте 0 - 1 лет: умеренные фокальные генерализованные гиперкинезы, изменяющи физиологическое положени тела и нарушающи последовательность целенаправленность движений и действий. Наличие умеренны нарушений психически функций
6.4.1.3					Нарушения психических	Для детей в возрасте 0 - 1

					функций, нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций; МКФ: B 110 - 199, B 710 - 799	лет: выраженные фокальные генерализованные гиперкинезы (торсионна дистония), сопровождающиеся стойки болевым синдромом, н контролируемые медикаментозным лечением, фиксированным патологическим положение тела, нарушением равновеси последовательности целенаправленности движений и действий. Наличие выраженны нарушений психически функций
6.5		Демиелинизирующие болезни центральной нервной системы		G35 - G37		
6.5.1			Рассеянный склероз Другая форма острой диссеминированной демиелинизации Другие демиелинизирующие болезни центральной	G35 G36 G37		

			нервной системы			
6.5.1.1					Нарушения психических, языковых и речевых, сенсорных, нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций, нарушение функций пищеварительной системы, мочевыделительной функции; МКФ: B 110 - 199, B 310 - 399, B 210 - 299, B 710 - 799, B 510 - 539, B 610 - 639	Для детей в возрасте 0 - 1 лет: отсутствие признако активности заболевания соответствии с критериями, том числе - по данным МРТ. Отсутствие ил незначительные нарушени функций организма, в то числе - на фоне терапи ПИТРС. Незначительные нарушени психических функций
6.5.1.2					Нарушения психических, языковых и речевых, сенсорных, нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций, нарушение функций пищеварительной системы, мочевыделительной функции; МКФ: B 110 - 199, B 310 - 399, B 210 - 299, B 710 - 799, B 510 - 539, B 610 - 639	Для детей в возрасте 0 - 1 лет: умеренные парезы верхни и/или нижних конечностей умеренные бульбарны нарушения; частична атрофия зрительных нервов умеренными нарушениям сенсорных функций; други умеренные нарушени функций организма, в то числе - на фоне терапи ПИТРС. Умеренные нарушени психических функций

6.5.1.3					Нарушения психических, языковых и речевых, сенсорных, нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций, нарушение функций пищеварительной системы, мочевыделительной функции; МКФ: B 110 - 199, B 310 - 399, B 210 - 299, B 710 - 799, B 510 - 539, B 610 - 639	Для детей в возрасте 0 - 1 лет: выраженные парезы верхни и/или нижних конечностей выраженные бульбарны нарушения; нарушени контроля функции тазовы органов, другие выраженны нарушения функци организма, в том числе - н фоне терапии ПИТРС
6.5.1.4					Нарушения психических, языковых и речевых, сенсорных, нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций, нарушение функций пищеварительной системы, мочевыделительной функции; МКФ: B 110 - 199, B 310 - 399, B 210 - 299, B 710 - 799, B 510 - 539, B 610 - 639	Для детей в возрасте 0 - 1 лет: значительно выраженны парезы или параличи верхни и/или нижних конечностей значительно выраженны бульбарные нарушения отсутствие контроля функци тазовых органов, други значительно выраженны нарушения функци организма, в том числе - н фоне терапии ПИТРС
6.6			Наследственная и идиопатическая	G60		

			невропатия Наследственная моторная и сенсорная невропатия	G60.0		
6.6.1					Нарушения нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций, нарушения сенсорных функций (осязания; тактильной, болевой, температурной, вибрационной и других видов чувствительности); МКФ: B 710 - 789, B 798, B 799, B 250 - 299	Для детей в возрасте 0 - 1 лет: легкий парез нижни конечностей без нарушени опоры и передвижени (снижение мышечной силы д 4 баллов)
6.6.2					Нарушения нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций, нарушения сенсорных функций (осязания; тактильной, болевой, температурной, вибрационной и других видов чувствительности); МКФ: B 710 - 789, B 798, B 799, B 250 - 299	Для детей в возрасте 0 - 1 лет: умеренный парез нижни конечностей (снижени мышечной силы до 3 баллов) изменение походк ("степаж"); незначительна деформация стоп
6.6.3					Нарушения нейромышечных, скелетных	Для детей в возрасте 0 - 1 лет:

					и связанных с движением (статодинамических) функций, нарушения сенсорных функций (осязания; тактильной, болевой, температурной, вибрационной и других видов чувствительности); МКФ: B 710 - 789, B 798, B 799, B 250 - 299	выраженный парез нижни конечностей (снижени мышечной силы до 2 баллов деформация стоп нарушающая опору передвижение, нарушени координации движений
6.7		Болезни нервно-мышечного синапса и мышц		G70 - G73		
6.7.1			Myasthenia gravis и другие нарушения нервно-мышечного синапса	G70		
6.7.1.1					Нарушения языковых и речевых, сенсорных функций, нарушения нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций, функций пищеварительной, дыхательной систем; МКФ: B 310 - 399, B 210 - 299, B 710 - 799, B 510 - 539, B 440 - 449	Для детей в возрасте 0 - 1 лет: локальные формы заболевания (глазная) медленно текущие, незначительными нарушениями функци организма. Генерализованная булбарная формы незначительными нарушениями функци

						организма: полна компенсация при лечени АХЭП или АХЭП в сочетани с глюкокортикоидами ил незначительная мышечна слабость и патологическа утомляемость, проявляющаяся только пр многократных повторны движениях или длительно статическом напряжени отдельных групп мыш туловища, конечносте окулярных краниобульбарных мышц. Положительный результа тимэктомии, позволяющи контролировать заболевани регресс симптомов
6.7.1.2					Нарушения языковых и речевых, сенсорных функций, нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций; МКФ: B 310 - 399, B 210 - 299, B 710 - 799, B 510 - 539, B 440 - 449	Для детей в возрасте 0 - 1 лет: локальные форм заболевания (глоточно-лицевая) умеренными бульбарным нарушениями, приводящими умеренным нарушения функций организма Медленно текуща генерализованная форма бе нарушения дыхания

						сердечной деятельности пр наличии умеренны статодинамических нарушений (относительна компенсация АХЭП). Умеренно выраженна мышечная слабость патологическая утомляемост мышц туловища и (или проксимальных сегменто конечностей, краниобульбарных мышц н фоне базисной терапии колебаниями и нарастание симптомов в течение суто усиливающаяся пр физической нагрузке, учетом удовлетворительног эффекта тимэктоми приводящие к умеренны нарушениям функци организма
6.7.1.3					Нарушения языковых, речевых, сенсорных функций, нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций, нарушение функций пищеварительной, дыхательной,	Для детей в возрасте 0 - 1 лет: глоточно-лицевая локальна форма с выраженным бульбарными нарушениями приводящими к выраженны нарушениям функци организма. Генерализованная форм

					сердечно-сосудистой систем; МКФ: B 310 - 399, B 210 - 299, B 710 - 799, B 510 - 539, B 440 - 449, B 410 - 429	миастении с выраженным бульбарными расстройствам и миастеническими кризами малоэффективная тимэктомия; относительна компенсация на фоне прием АХЭП Выраженная мышечна слабость и патологическа утомляемость мыш туловища и (или проксимальных сегменто конечностей, краниобульбарных мышц н фоне недостаточн эффективной базисно терапии, тимомтимэктомии лучевой терапии (пр злокачественной тимоме) приводящие к выраженны нарушениям функци организма
6.7.1.4					Нарушения языковых, речевых, сенсорных функций, нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций, нарушение функций пищеварительной, дыхательной,	Для детей в возрасте 0 - 1 лет: генерализованная миастени со злокачественным ил быстро прогрессирующи течением пр неэффективности терапии, с значительно выраженным бульбарными нарушениями

					сердечно-сосудистой систем; МКФ: B 310 - 399, B 210 - 299, B 710 - 799, B 510 - 539, B 440 - 449; B 410 - 429	приводящими к значительн выраженным нарушения функций органов и систе организма. Значительно выраженна мышечная слабость патологическая утомляемост мышц туловища, конечносте дыхательных и (или краниобульбарных мыш (генерализованная форма быстропрогрессирующее течение при неэффективно терапии, приводящие значительновыраженному нарушению функци организма, что требуе постоянного применени интубации трахеи с ИВЛ ил без нее, использовани зондового питания необходимость в постоянно посторонней помощи и уходе
6.7.2			Первичные поражения мышц (мышечные дистрофии)	G71		
6.7.2.1					Нарушения психических, языковых и речевых, нейромышечных, скелетных и связанных с движением	Для детей в возрасте 0 - 1 лет: снижение мышечной сил верхних и/или нижни

					(статодинамических) функций, функций сердечно-сосудистой системы; МКФ: B 110 - 199, B 310 - 399, B 710 - 799, B 410 - 429	конечностей до 4 баллов сохранением активны движений в суставах в полно объеме. Незначительные нарушени функций организма
6.7.2.2					Нарушения психических, языковых и речевых, нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций, функций сердечно-сосудистой системы; МКФ: B 110 - 199, B 310 - 399, B 710 - 799, B 410 - 429	Для детей в возрасте 0 - 1 лет: снижение мышечной сил верхних и/или нижни конечностей до 3 баллов умеренным ограничение амплитуды активны движений в суставах гипотрофией мышц плечево и тазового пояса. Умеренные нарушени функций организма
6.7.2.3					Нарушения психических, языковых и речевых, нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций, функций сердечно-сосудистой системы; МКФ: B 110 - 199, B 310 - 399, B 710 - 799, B 410 - 429	Для детей в возрасте 0 - 1 лет: снижение мышечной сил верхних и/или нижни конечностей до 2 баллов выраженным ограничение амплитуды активны движений в суставах выраженная гипотрофи мышц плечевого и тазово пояса. Выраженные нарушени

						функций организма
6.7.2.4					Нарушения психических, языковых и речевых, нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций, функций сердечно-сосудистой системы; МКФ: B 110 - 199, B 310 - 399, B 710 - 799, B 410 - 429	Для детей в возрасте 0 - 1 лет: снижение мышечной силы д 1 балла в верхних и/ил нижних конечностях, невозможностью самостоятельного передвижения. Значительно выраженны нарушения функци организма
6.8			Детский церебральный паралич	G80		
Примечание к подпункту 6.8. Количественная оценка степени выраженности стойких нарушений функций организма ребенка в возрасте до 18 лет при детском церебральном п зависит от клинической формы заболевания, характера и степени выраженности двигательных нарушений (с использованием классификации боль функций (GMFCS) в возрасте 0 - 17 лет и классификации мануальных способностей (MACS) в возрасте 4 - 17 лет), наличия, сочетания и степени нарушений психических функций (когнитивное снижение, умственная отсталость различных степеней), псевдобульбарного синдрома и свя нарушений языковых и речевых функций (дизартрия, дисграфия, дислексия и прочие), нарушений сенсорных функций, функций мочевыделите (нарушение или отсутствие контроля функции тазовых органов).						
6.8.1			Спастический церебральный паралич (двойная гемиплегия, спастический тетрапарез) Спастическая диплегия Детская гемиплегия	G80.0 G80.1 G80.2		

			Дискинетический церебральный паралич Атаксический церебральный паралич (атонически-астатическая форма)	G80.3 G80.4		
6.8.1.1					Нарушения психических, языковых и речевых, сенсорных функций, нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций; МКФ: B 110 - 199, B 310 - 399, B 210 - 299, B 710 - 799	Для детей в возрасте 0 - 1 лет: 1-й или 2-й уровен функциональной активност по GMFCS и/или MACS
6.8.1.2					Нарушения психических, языковых и речевых, сенсорных функций, нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций; МКФ: B 110 - 199, B 310 - 399, B 210 - 299, B 710 - 799	Для детей в возрасте 0 - 1 лет: 3-й уровен функциональной активност по GMFCS и/или MACS. Умеренные нарушени психических, языковых речевых функций
6.8.1.3					Нарушения психических, языковых и речевых, сенсорных функций, нейромышечных, скелетных и связанных с движением	Для детей в возрасте 0 - 1 лет: 4-й уровень функционально активности по шкале GMFC и/или MACS. Выраженны

					(статодинамических) функций, нарушение функций пищеварительной системы, мочевыделительной функции; МКФ: B 110 - 199, B 310 - 399, B 210 - 299, B 710 - 799, B 510 - 539, B 610 - 639	нарушения психических языковых и речевых функций Нарушение контроля функци тазовых органов
6.8.1.4					Нарушения психических, языковых и речевых, сенсорных функций, нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций, нарушение функций пищеварительной системы, мочевыделительной функции; МКФ: B 110 - 199, B 310 - 399, B 210 - 299, B 710 - 799, B 510 - 539, B 610 - 639	Для детей в возрасте 0 - 1 лет: 5-й уровень функционально активности по GMFCS и/ил MACS. Значительно выраженны нарушения психических языковых и речевых функций Значительно выраженны двигательные нарушения выраженный или значительн выраженный тетрапарез нижний спастически парапарез, значительн выраженный гемипарез ил гемиплегия (мышечная сила балл), нижняя параплеги (мышечная сила 0 баллов) множественными комбинированными контрактурами суставо конечностей; фиксированны

						порочным положением сто и/или кистей; нарушени координации движений равновесия, значительн затрудняющих вертикализацию, опору передвижение, либ отсутствие произвольны движений в конечностях туловище, фиксированно патологическое положени тела (в положении лежа), незначительными нецеленаправленными движениями (поворот набок помощью). Значительно выраженны спастико-гиперкинетический синдром: выраженный ил значительно выраженны спастический тетрапарез значительно выраженны асимметричные спастико-гиперкинетические парезы, значительн выраженные комбинированные контрактуры в суставах конечностей; движения суставах практическ отсутствуют (в больше степени вследстви

						гиперкинезов), значительн выраженный атетоз и/ил двойной атетоз и/ил торсионная дистония невозможностью вертикализации, опоры передвижения. Значительно выраженна туловищная (статическая атаксия, значительн выраженная динамическа атаксия, значительн выраженная мышечна гипотония, препятствующа точным движениям, схвату удержанию предметов формированию вертикально позы и произвольны движений. Значительно выраженны псевдобульбарный синдром Отсутствие устной письменной речи. Значительно выраженны нарушения психически функций: 0 - 3 года: значительн выраженное нарушени психомоторного, речевог развития. Отсутстви возрастных и социальны

						навыков. 4 - 17 лет: значительн выраженное когнитивно снижение и/или снижени интеллекта до уровня тяжело или глубокой умственно отсталости (IQ < 34 баллов) Отсутствие контроля функци тазовых органов
7	Болезни глаза и его придаточного аппарата (класс VII) Последствия травм с необратимыми изменениями и очевидным нарушением зрения Врожденные аномалии (пороки развития) глаза и уха			H00 - H59 T90.4 Q10 - Q17		

Примечание к пункту 7.
Количественная оценка степени выраженности стойких нарушений функций глаза и его придаточного аппарата, обусловленных заболеваниями, травм или дефектами, определяется с учетом возрастной оценки состояния основных зрительных функций (острота зрения в условных единица

зрения в градусах (°). Степень нарушения функций структур органа зрения, ответственных за зрительное восприятие, оценивается по состояни функций лучше видящего (или единственного) глаза в условиях оптимальной (максимально переносимой) коррекции. При поражении обоих гл учитывать остроту и поле зрения каждого глаза отдельно.
Кроме того, учитываются основные факторы патологического процесса и прогноза, влияющие на степень нарушения зрительных функций: форма и заболевания, возрастной период, в который наступил зрительный дефект и степень адаптированности ребенка к нему, активность и системность па процесса, результаты электрофизиологических и инструментальных методов обследования, оптимальная (максимально переносимая) коррекция или лучше видящего глаза.
В возрасте от 0 до 3 лет (3 г. 11 мес. включительно), а у неконтактных детей до 5 - 7 лет определение основных зрительных функций количест зрения; поле зрения) представляет значительные трудности, связанные с особенностями зрительного анализатора, а также возможностью налич психических функций у ребенка. Достоверные результаты у таких детей можно получить не ранее 10 - 12 лет, в связи с чем следует проводить оценку состояния зрительных функций, основанную на следующих показателях: отсутствие прямой и содружественной реакции зрачка на св условного рефлекса смыкания век на приближение к глазу яркого предмета, наличие (отсутствие) кратковременного поворота глаз к свету, отсутс взора, слежения за движением ярких предметов, а также визуально определяемые нарушения структуры тканей глазного яблока, нарушение преломляющих сред глаза, грубые пролиферативные изменения в стекловидном теле и сетчатке, очаговые изменения в центральных зонах сетч частичной или полной отслойки сетчатки, а также изменение формы, размера и цвета диска зрительного нерва. Количественная оценка нарушен функций у детей до 3 лет проводится по факту наличия или отсутствия предметного зрения.
В возрасте 4 лет и старше количественное определение основных зрительных функций (острота, поле зрения, зрительная работоспособность) с методами, принятыми в детской экспертной офтальмологической практике. При необходимости углубленного обследования использу нистагмометрических, электрофизиологических и офтальмоэргономических, ультразвуковых методов исследований, а также оптической когерентно Гейдельбергской томографии.

7.1					Нарушение сенсорных функций; МКФ: B 210 - 229 (зрения)	Для детей в возрасте 0 - года: наличие предметного зрения
7.2					Нарушение сенсорных функций; МКФ: B 210 - 229 (зрения)	Для детей в возрасте 4 - 1 лет: острота зрения лучш видящего (единственного глаза с оптимально коррекцией более 0,3. Любая степен

						концентрического сужени полей зрения лучше видящег (единственного) глаза до 40 при отсутствии скотом
7.3					Нарушение сенсорных функций; МКФ: B 210 - 229 (зрения)	Для детей в возрасте 0 - года: отсутствие предметног зрения
7.4					Нарушение сенсорных функций; МКФ: B 210 - 229 (зрения)	Для детей в возрасте 4 - 1 лет: острота зрения лучш видящего (единственного глаза с оптимально коррекцией более 0,1 до 0, включительно. Концентрическое сужени поля зрения лучше видящег (единственного) глаза от 39 до 20° включительно. Центральные абсолютны скотомы лучше видящег (единственного) глаза, 5° менее
7.5					Нарушение сенсорных функций; МКФ: B 210 - 229 (зрения)	Для детей в возрасте 4 - 1 лет: острота зрения лучш видящего (единственного глаза с оптимально коррекцией 0,1 - 0,0

						включительно. Концентрическое сужени полей зрения лучше видящег (единственного глаза) от 19 до 10° включительно. Центральные абсолютны скотомы лучше видящег (единственного) глаза мене 10 градусов, но более 5°
7.6					Нарушение сенсорных функций; МКФ: B 210 - 229 (зрения)	Для детей в возрасте 4 - 1 лет: острота зрения лучш видящего (единственного глаза с оптимально коррекцией от 0,04 до включительно. Концентрическое сужени полей зрения лучше видящег (единственного) глаза от 9° д 0° включительно. Центральные абсолютны скотомы лучше видящег (единственного) глаза 10° более
8	Болезни уха и сосцевидного отростка (класс VIII)			H60 - H95		
Примечание к пункту 8.						

Количественная оценка степени выраженности стойких нарушений функций уха и сосцевидного отростка, обусловленных заболеваниями, послед
или дефектами, основывается преимущественно на оценке характера и степени выраженности нарушения функции слуха (степени тугоухости), луч
(единственного) уха по международной классификации тугоухости. Учитываются также и другие факторы патологического процесса: форма и с
заболевания, возрастной период в котором наступил слуховой дефект, степень адаптивности к нему, вид и особенности осложнений, сочетание
речи, с нарушением психических функций, факторы прогноза и прочее. При объективизации степени нарушенных функций использ
электрофизиологических и других специальных методов исследования (акустическая импедансометрия, тональная подпороговая аудиометрия, от
эмиссия, коротколатентные слуховые вызванные потенциалы). У детей до 3-х летнего возраста оценка нарушений сенсорных функций пр
результатам объективных методов аудиологического исследования: акустическая импедансометрия, отоакустическая эмиссия, коротколатент
вызванные потенциалы (КСВП), регистрация стационарных слуховых потенциалов (ASSR-тест).
При наличии в структуре тугоухости нарушений языковых и речевых функций, количественная оценка которых превышает количественную о
тугоухости, экспертная оценка проводится по ведущему речевому дефекту (см. подпункт 5.1.1).

8.1			Болезни уха и сосцевидного отростка (потеря слуха (глухота), тугоухость, за исключением профессионально обусловленных)	H60 - H95		
8.1.1					Нарушения сенсорных, языковых и речевых функций; МКФ: B 230 - 249 (слуха), B 310 - 399	Для детей в возрасте 0 - 1 лет: односторонняя тугоухость I IV степени без речевы нарушений либо незначительными нарушениями языковых речевых функций
8.1.2					Нарушения сенсорных, языковых и речевых, психических функций;	Для детей в возрасте 0 - 1 лет: двусторонняя тугоухость I (2

					МКФ: B 230 - 249 (слуха), B 310 - 399, B 110 - 199	- 40 дБ) и II степени (41 - 5 дБ) без речевых нарушени либо с незначительным нарушениями языковых речевых функций. Двусторонняя тугоухость степени (41 - 55 дБ) пр наличии стойки незначительных нарушени языковых и речевых функци и/или психических функций
8.1.3					Нарушения сенсорных, языковых и речевых, психических функций; МКФ: B 230 - 249 (слуха), B 310 - 399, B 110 - 199	Для детей в возрасте 0 - 1 лет: двусторонняя тугоухость степени (41 - 55 дБ) пр наличии стойких умеренны нарушений языковых речевых функций. Двусторонняя тугоухость II степени (56 - 70 дБ) пр отсутствии или наличи стойких нарушений языковы и речевых и/или психически функций (незначительных умеренных)
8.1.4					Нарушения сенсорных, языковых и речевых, психических функций; МКФ: B 230 - 249 (слуха), B 310 - 399, B 110 - 199	Для детей в возрасте 0 - 1 лет: двусторонняя тугоухость IV степени (71 - 90 дБ), в то числе после односторонне

						или двухсторонне кохлеарной имплантации. Наличие стойки незначительных ил умеренных нарушени языковых и речевых функци и/или психических функций
8.1.5					Нарушения сенсорных, языковых и речевых, психических функций; МКФ: B 230 - 249 (слуха), B 310 - 399, B 110 - 199	Для детей в возрасте 0 - 1 лет: двусторонняя глухота (боле 91 дБ), в том числе посл односторонней ил двухсторонней кохлеарно имплантации. Наличие стойки незначительных ил умеренных нарушени языковых и речевых функци и/или психических функций
8.1.6					Нарушения сенсорных, языковых и речевых, психических функций; МКФ: B 230 - 249 (слуха); B 310 - 399, B 110 - 199	Для детей в возрасте 0 - 1 лет: сочетание тугоухости III - IV степени (на одно ухо) глухоты (на другое). Наличи стойких незначительных ил умеренных нарушени языковых и речевых функци и/или психических функций
8.2		Комбинированное				

		нарушение зрения и слуха, а также нарушения артикуляции (речи) и голосообразования				
8.2.1			Слепоглухота			
8.2.1.1					Нарушение сенсорных, языковых и речевых, психических функций; МКФ: B 210 - 249 (слуха и зрения), B 310 - 399, B 110 - 199	Для детей в возрасте 0 - 1 лет: двусторонняя тугоухость II степени с высокой степенью слабовидения (острота зрени лучше видящим глазом максимально переносимо коррекцией 0,1 - 0,05) наличие незначительных умеренных или выраженны нарушений языковых речевых и/или психически функций
8.2.1.2					Нарушения сенсорных, языковых и речевых, психических функций; МКФ: B 230 - 249 (слуха); B 310 - 399, B 110 - 199	Для детей в возрасте 0 - 1 лет: полная (тотальная) ил практическая слепоглухота Полная (тотальная) ил практическая слепота сочетании с тугоухостью III IV степени односторонне или двусторонней; наличи

						нарушений языковых речевых и/или психически функций различной степен выраженности
8.2.1.3					Нарушения сенсорных, языковых и речевых, психических функций; МКФ: B 230 - 249 (слуха), B 310 - 399, B 110 - 199	Для детей в возрасте 0 - 1 лет: высокая степень слабовидени (острота зрения (лучш видящим глазом максимально переносимо коррекцией в пределах 0,1 0,05) в сочетании односторонней ил двусторонней тугоухостью II - IV степени; наличи нарушений языковых речевых и/или психически функций различной степен выраженности
8.2.2			Глухонемота			
8.2.2.1					Нарушение сенсорных, языковых и речевых функций; МКФ: B 230 - 249 (слуха), B 310 - 399	Для детей в возрасте 0 - 1 лет: глухонемота при отсутстви или незначительным нарушениями психически функций
8.2.2.2					Нарушения психических, сенсорных, языковых и речевых функций;	Для детей в возрасте 0 - 1 лет: глухонемота с умеренным

					МКФ: B 110 - 199, B 230 - 249 (слуха), B 310 - 399	или выраженным нарушениями психически функций
8.2.2.3					Нарушения психических, сенсорных, языковых и речевых функций; МКФ: B 110 - 199, B 230 - 249 (слуха), B 310 - 399	Для детей в возрасте 0 - 1 лет: глухонемота со значительн выраженными нарушениям психических функций
8.2.3			Слепоглухонемота			
8.2.3.1					Нарушения психических, сенсорных функций, нарушение языковых и речевых функций; МКФ: B 110 - 199, B 210 - 249 (слуха и зрения), B 310 - 399	Для детей в возрасте 0 - 1 лет: врожденная либо приобретенная полная утрат зрения и слуха, немота наличие нарушени психических функци различной степен выраженности
9	Болезни системы кровообращения (класс IX) и патология с поражением преимущественно органов системы кровообращения,			I00 - I99		

	представленная в других классах					

Примечание к пункту 9.
Количественная оценка степени выраженности стойких нарушений функций сердечно-сосудистой системы организма ребенка в возрасте до 18 лет, с болезнями системы кровообращения и патологией с поражением преимущественно органов системы кровообращения, основывается на о выраженности следующих клинико-функциональных проявлений: недостаточность кровообращения, гипертонический синдром; легочная гиперт нарушения сердечного ритма, кардиогенные синкопальные состояния. Учитываются также и другие факторы патологического процесса: форма и тя патологического процесса, степень активности, частота и тяжесть обострений, распространенность, включение органов-мишеней, наличие осложнен

9.1			Эссенциальная (первичная) гипертензия	I10		
			Гипертензивная болезнь сердца (гипертоническая болезнь с преимущественным поражением сердца).	I11		
			Гипертензивная (гипертоническая) болезнь с преимущественным поражением почек	I12		
			Гипертензивная (гипертоническая) болезнь с преимущественным поражением сердца и почек.	I13		

			Вторичная гипертензия. Реноваскулярная гипертензия Гипертензия вторичная по отношению к другим поражениям почек Гипертензия вторичная по отношению к эндокринным нарушениям Другая вторичная гипертензия	I15 I15.0 I15.1 I15.2 I15.8		
9.1.1					Нарушения функций сердечно-сосудистой, мочевыделительной системы, нарушение психических, сенсорных функций; МКФ: B 410 - 429, B 610 - 639, B 110 - 199, B 210 - 299	Для детей в возрасте 0 - 1 лет: стойкое повышение АД н менее 6 месяцев, резистентно к гипотензивной терапии Индекс времени гипертензи по данным суточног мониторирования артериального давлени (СМАД) 25 - 50%. Поражени органов-мишеней незначительным нарушение их функции. Артериальна гипертензия I степен высокого риска (наличие 3 более дополнительны

						факторов риск сердечно-сосудистых заболеваний и/или поражени органов-мишеней и/ил наличие сопутствующи состояний)
9.1.2					Нарушения функций сердечно-сосудистой, мочевыделительной системы, нарушение психических, сенсорных функций; МКФ: B 410 - 429, B 610 - 639, B 110 - 199, B 210 - 299	Для детей в возрасте 0 - 1 лет: стойкое повышение АД н менее 6 месяцев, резистентно к комбинированно гипотензивной терапии Индекс времени гипертензи по данным СМАД > 50% Артериальная гипертензия степени. Поражение органов-мишене с умеренными нарушениям функций организма
9.1.3					Нарушение функций сердечно-сосудистой, дыхательной, мочевыделительной систем, нарушение психических, языковых и речевых, сенсорных функций, нарушения нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических)	Для детей в возрасте 0 - 1 лет: стойкое повышение АД н менее 6 месяцев резистентно к комбинированно гипотензивной терапии Индекс времени гипертензи по данным СМАД > 60% Артериальная гипертензия степени. Поражени органов-мишеней

					функций; МКФ: B 410 - 429, B 440 - 450, B 610 - 639, B 110 - 199, B 310 - 399, B 210 - 299, B 710 - 799	выраженными нарушениям функций организма
9.1.4					Нарушение функций сердечно-сосудистой, дыхательной, мочевыделительной систем, нарушение психических, языковых и речевых, сенсорных функций, нарушения нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций; МКФ: B 410 - 429, B 440 - 450, B 610 - 639, B 110 - 199, B 310 - 399, B 210 - 299, B 710 - 799	Для детей в возрасте 0 - 1 лет: стойкое повышение АД н менее 6 месяцев, резистентно к комбинированно гипотензивной терапии Индекс времени гипертензи по данным СМАД 95 - 100% среднее АД систолическо 150 - 160 мм рт.ст., А диастолическое 90 мм рт.ст Поражение органов-мишене со значительно выраженным нарушениями функци организма
9.2			Сердечная недостаточность Дилатационная кардимиопатия Обструктивная гипертрофическая кардиомиопатия	I50 I42.0 I42.1		

			Другая гипертрофическая кардиомиопатия Эндокардиальный фиброэластоз Другая рестриктивная кардиомиопатия Последствия травмы внутригрудных органов (сердца)	I42.2 I42.4 I42.5 T91.4		
9.2.1					Нарушение функций сердечно-сосудистой системы; МКФ: B 410 - 429	Для детей в возрасте 0 - 1 лет: незначительные нарушени функции сердечно-сосудисто системы: ХСН I стадия. ФК II
9.2.2					Нарушение функций сердечно-сосудистой системы; МКФ: B 410 - 429	Для детей в возрасте 0 - 1 лет: умеренные нарушени функции сердечно-сосудисто системы: ХСН IIA стадии, Ф II, III
9.2.3					Нарушение функций сердечно-сосудистой системы; МКФ: B 410 - 429	Для детей в возрасте 0 - 1 лет: выраженные нарушени функции сердечно-сосудисто системы: ХСН IIБ стадии, Ф III, IV

9.2.4					Нарушение функций сердечно-сосудистой системы; МКФ: B 410 - 429	Для детей в возрасте 0 - 1 лет: значительно выраженны нарушения функци сердечно-сосудистой системы: ХСН III стадии, Ф IV
9.3			Хронические ревматические болезни сердца Неревматические поражения митрального клапана Неревматические поражения аортального клапана Неревматические поражения трехстворчатого клапана	I05 - I09 I34 I35 I36		
9.3.1					Нарушение функций сердечно-сосудистой системы; МКФ: B 410 - 429	Для детей в возрасте 0 - 1 лет: ревматические неревматические болезн митрального, аортального трикуспидального клапанов незначительными нарушениями функци сердечно-сосудистой

						системы: наличие ХСН 0 или стадии
9.3.2					Нарушение функций сердечно-сосудистой системы; МКФ: B 410 - 429	Для детей в возрасте 0 - 1 лет: ревматические неревматические болезн митрального, аортального трикуспидального клапанов умеренными нарушениям функций сердечно-сосудисто системы: наличие ХСН IIA стадии.
9.3.3					Нарушения психических функций, функций сердечно-сосудистой системы; МКФ: B 110 - 139, B 140 - 189, B 198, B 199, B 410 - 429	Для детей в возрасте 0 - 1 лет: ревматические неревматические болезн митрального, аортального трикуспидального клапанов выраженными нарушениям функций сердечно-сосудисто системы: наличие ХСН II стадии
9.3.4					Нарушения психических функций, функций сердечно-сосудистой системы; МКФ: B 110 - 139, B 140 - 189, B 198, B 199, B 410 - 429,	Для детей в возрасте 0 - 1 лет: ревматические неревматические болезн митрального, аортального трикуспидального клапано со значительно выраженным нарушениями функци сердечно-сосудистой

						системы: ХСН III стадии
9.4			Наличие сердечных и сосудистых имплантатов и трансплантатов	Z95		
9.4.1					Нарушение функций сердечно-сосудистой системы; МКФ: B 410 - 429	Для детей в возрасте 0 - 1 лет: незначительные нарушени функции сердечно-сосудисто системы: ХСН 0 или I стадии
9.4.2					Нарушения психических функций, функций сердечно-сосудистой системы; МКФ: B 110 - 199, B 410 - 429	Для детей в возрасте 0 - 1 лет: умеренные нарушени функции сердечно-сосудисто системы: ХСН IIA. Наличие имплантированног ЭКС; наличие сосудистог импланта, периодическ требующего замены в связи ростом ребенка
9.4.3					Нарушения психических функций, функций сердечно-сосудистой системы; МКФ: B 110 - 199, B 410 - 429	Для детей в возрасте 0 - 1 лет: выраженные нарушени функции сердечно-сосудисто системы: ХСН IIБ стадии. Наличие ЭКС-зависимост при имплантированном ЭКС. Наличие имплантированног кардиовертера-дефибриллято а

9.4.4					Нарушения психических функций, функций сердечно-сосудистой системы; МКФ: B 110 - 199, B 410 - 429	Для детей в возрасте 0 - 1 лет: значительно выраженны нарушения функци сердечно-сосудистой системы: ХСН III стадии
9.5			Наличие трансплантированного сердца Наличие трансплантированных сердца и легкого	Z94.1 Z94.3		
Первичное освидетельствование						
9.5.1					Нарушение психических функций, функций сердечно-сосудистой системы; дыхательной системы, системы крови и иммунной системы; МКФ: B 110 - 199, B 410 - 429, B 440 - 449, B 430 - 439	Для детей в возрасте 0 - 1 лет: после трансплантации сердц или одновременно сердца легкого в течение первых лет
Повторное освидетельствование (после 2х летнего наблюдения)						
9.5.2					Нарушения психических функций, функций сердечно-сосудистой, дыхательной систем, системы крови и иммунной	Для детей в возрасте 0 - 1 лет: при наличии осложнени с умеренными нарушениям функций организма

					системы; МКФ: B 110 - 199, B 410 - 429, B 440 - 449, B 430 - 439	
9.5.3					Нарушения психических функций, функций сердечно-сосудистой, дыхательной систем, системы крови и иммунной системы; МКФ: B 110 - 199, B 410 - 429, B 440 - 449, B 430 - 439	Для детей в возрасте 0 - 1 лет: при наличии осложнений выраженными нарушениям функций организма
9.5.4					Нарушения психических функций, функций сердечно-сосудистой, дыхательной систем, системы крови и иммунной системы; МКФ: B 110 - 199, B 410 - 429, B 440 - 449, B 430 - 439	Для детей в возрасте 0 - 1 лет: при наличии осложнени со значительно выраженным нарушениями функци организма
9.6			Синдром удлиненного интервала QT Пароксизмальная тахикардия	I45.8 I47		
9.6.1					Нарушение функций сердечно-сосудистой системы; МКФ: B 410 - 429	Для детей в возрасте 0 - 1 лет: незначительные пароксизмальные нарушени сердечного ритма

						пароксизмы тахикарди (аритмии) редкие (до 3 - 4 ра в год), кратковременны (минуты, менее часа) непароксизмальные тахикардии (представленност эктопического ритма мене 35% за сутки по данны суточного ЭК мониторирования). Ритм восстанавливается бе лечебных мероприятий, пр использовании немедикаментозных приемо или после однократного ил двукратного прием антиаритмических препаратов. ХСН О или наличие ХСН стадии
9.6.2					Нарушение функций сердечно-сосудистой системы; МКФ: B 410 - 429	Для детей в возрасте 0 - 1 лет: умеренные пароксизмальны нарушения сердечного ритма пароксизмы тахикарди (аритмии), непароксизмальные тахикардии (представленност эктопического ритма 35 - 70% за сутки по данным суточног ЭКГ мониторирования)

						показатель корригированног интервала QT более 470 м (по данным ЭКГ); кардиогенные синкопальны состояния (частот сердцебиений и длительност пароксизма значения н имеют). Ритм восстанавливается пр систематическом (по схеме использовании антиаритмических препаратов. Наличие ХСН IIA стадии
9.6.3					Нарушение функций сердечно-сосудистой системы; МКФ: B 410 - 429	Для детей в возрасте 0 - 1 лет: выраженные пароксизмальны нарушения сердечного ритма частые (более 1 раза в месяц пароксизмы тахикарди (аритмии), непароксизмальные тахикардии (представленност эктопического ритма боле 70% за сутки по данны суточного ЭК мониторирования); стабильное увеличени среднего корригированног интервала QT более 490 м (по данным суточного ЭК

						мониторирования); кардиогенные синкопальны состояния пр неэффективности терапии на фоне наличи кардиовертера-дефибриллято а (частота сердцебиений длительность пароксизм значения не имеют). Ритм восстанавливается пр систематическом (по схеме использовании медикаментозных антиаритмических препаратов, применени дополнительной симптоматической терапии. Наличие ХСН IIБ стади аритмогенная дисфункци миокарда
9.6.4					Нарушение функций сердечно-сосудистой системы; МКФ: B 410 - 429	Для детей в возрасте 0 - 1 лет: значительно выраженны пароксизмальные нарушени сердечного ритма непрерывно рецидивирующи пароксизмы тахикарди (аритмии), длящиеся о нескольких часов до суток более; могут возникать бе каких-либо провоцирующи

						факторов; непароксизмальны тахикардии (представленност эктопического ритма за сутк более 80%); рецидивирующи кардиогенные синкопальны состояния. Ритм восстанавливается пр систематическом использовании медикаментозных антиаритмических препаратов, электроимпульсной терапии применении дополнительно симптоматической терапии. Наличие ХСН III стади аритмогенная дисфункци миокарда
9.7			Предсердно-желудочкова я атриовентрикулярная блокада полная Фибрилляция и трепетание предсердий Другие нарушения сердечного ритма	I44.2 I48 I49		
9.7.1					Нарушение функций сердечно-сосудистой системы; МКФ: B 410 - 429	Для детей в возрасте 0 - 1 лет: Стойкие незначительны нарушения сердечного ритма

						плотность экстрасистоли менее 20% за сутки п данным суточного ЭК мониторирования; синусова брадикардия с частото сердечных сокращений пределах ниже 15 - 19% о возрастной нормы превышение должно длительности пауз ритма п возрасту без нарушени глобальной функции сердца центральная периферическая гемодинамика не нарушень или нарушены незначительн (ХСН 0 или I стадии)
9.7.2					Нарушение функций сердечно-сосудистой системы; МКФ: B 410 - 429	Для детей в возрасте 0 - 1 лет: стойкие умеренны нарушения сердечного ритма плотность экстрасистоли более 20% за сутки по данны суточного ЭК мониторирования; синусова брадикардия с частото сердечных сокращений ниж 20% от возрастной норм вследствие синдрома слабост синусового узла ил атриовентрикулярной

						блокады II степени (минимальной частото сердечных сокращений мене 40 ударов в минуту); полна атриовентрикулярная блокад с частотой сокращени желудочков менее 50% о возрастной нормы, пауз ритма более 3,0 секун умеренные нарушени глобальной функции сердц (аритмогенная дисфункци миокарда), коронарног кровообращения, церебральной гемодинамики наличие ХСН IIA стадии
9.7.3					Нарушение функций сердечно-сосудистой системы; МКФ: B 410 - 429	Для детей в возрасте 0 - 1 лет: постоянные выраженны нарушения сердечного ритма плотность экстрасистоли более 30% за сутки по данны суточного ЭК мониторирования; синусова брадикардия с частото сердечных сокращений пределах ниже 25% о возрастной нормы вследстви синдрома слабост синусового узла ил атриовентрикулярной

						блокады II степени (минимальной частото сердечных сокращений мене 40 ударов в минуту); полна атриовентрикулярная блокад с частотой сокращени желудочков менее 50% о возрастной нормы, пауз ритма более 3,0 секун выраженные нарушени глобальной функции сердц коронарного кровообращени церебральной гемодинамик в том числе синкопальны (обморочные) состояни наличие ХСН IIБ стадии
9.7.4					Нарушение функций сердечно-сосудистой системы; МКФ: B 410 - 429	Для детей в возрасте 0 - 1 лет: постоянные значительн выраженные нарушени сердечного ритма с наличие двух и более фор нарушений, относящихся категории выраженно степени; фибрилляция трепетание предсердий фибрилляция желудочко полная атриовентрикулярна блокада с частото сокращений желудочко менее 50% от нормы; пауз

						ритма более 3,5 секунд выраженные нарушени глобальной функции сердца коронарного кровообращения церебральной гемодинамики в том числе синкопальны (обморочные) состояния наличие ХСН III стадии
9.8			Первичная легочная гипертензия Другие уточненные формы легочно-сердечной недостаточности	I27.0 I27.8		
9.8.1					Нарушение функций сердечно-сосудистой системы; дыхательной системы; МКФ: B 410 - 429, B 440 - 450	Для детей в возрасте 0 - 1 лет: незначительные нарушени функций организма на фон эффективной специфическо терапии: ФК ЛГ I
9.8.2					Нарушение функций сердечно-сосудистой системы; дыхательной системы МКФ: B 410 - 429, B 440 - 450	Для детей в возрасте 0 - 1 лет: умеренные нарушени функций организма на фон специфической терапии: ФК ЛГ II
9.8.3					Нарушение функций сердечно-сосудистой	Для детей в возрасте 0 - 1 лет:

					системы; дыхательной системы; МКФ: B 410 - 429, B 440 - 450	выраженные нарушени функций организма на фон специфической терапии: ФК ЛГ III
9.8.4					Нарушение функций сердечно-сосудистой системы; дыхательной системы; МКФ: B 410 - 429, B 440 - 450	Для детей в возрасте 0 - 1 лет: значительно выраженны нарушения функци организма на фон специфической терапии: ФК ЛГ IV
10	Болезни органов дыхания (класс X) и патология с поражением преимуществен но органов дыхания, представленная в других классах болезней			J00 - J99		

Примечание к пункту 10.
Количественная оценка степени выраженности стойких нарушений функций организма ребенка в возрасте до 18 лет, обусловленных болезнями орга основывается на оценке степени выраженности хронической дыхательной недостаточности. Учитываются также и другие (клинические) факторы па процесса: форма и тяжесть течения, наличие и частота обострений, распространенность патологического процесса, включение органов-мишеней, нес подавления иммунитета, наличие осложнений.
Степень тяжести ДН оценивается, исходя из газометрических показателей - парциального давления кислорода крови (PaO_2) и сатурации крови кисло

ДН I степени - PaO_2 79 - 60 мм.рт.ст., SaO_2 - 90 - 94%; ДН II степени - PaO_2 59 - 55 мм.рт.ст., SaO_2 - 89 - 85%; ДН III степени - PaO_2 < 55 мм.рт.ст., Sa						
10.1			Хронические болезни нижних дыхательных путей (исключая астму) Болезни легкого, вызванные внешними агентами Другие респираторные болезни, поражающие главным образом интерстициальную ткань Гнойные и некротические состояния нижних дыхательных путей Другие болезни органов дыхания Синдром Вильсона-Микити Бронхолегочная дисплазия, возникшая в перинатальном периоде	J40 - J47 J60 - J70 J80 - J84 J85 - J86 J95 - J99 P27.0 P27.1		
10.1.1					Нарушение функций дыхательной системы; МКФ: B 440 - 449	Для детей в возрасте 0 - 1 лет: легкая или среднетяжела форма течения заболевания последствия оперативны

						вмешательств, с редким обострениями (2 - 3 раза год), с бронхиально обструкцией на фоне базисно терапии без дыхательно недостаточности (ДН 0) либ с ДН I степени
10.1.2					Нарушения функций дыхательной, сердечно-сосудистой систем; МКФ: B 440 - 449; B 410 - 429	Для детей в возрасте 0 - 1 лет: среднетяжелая форма течени заболевания, последстви оперативных вмешательств, обострениями 4 - 6 раз в год, бронхиальной обструкцией н фоне базисной терапии при наличии ДН II степени преходящей или постоянно легочной гипертензии (ХСН или ХСН 1 стадии)
10.1.3					Нарушения функций дыхательной, сердечно-сосудистой систем; МКФ: B 440 - 449, B 410 - 429	Для детей в возрасте 0 - 1 лет: среднетяжелая и тяжела форма течения заболевания последствия оперативны вмешательств, с частым обострениями (более обострений в год) бронхиальной обструкцией н фоне базисной терапии пр наличии ДН II, III степени

						ХСН IIA стадии
10.1.4					Нарушения функций дыхательной, сердечно-сосудистой систем; МКФ: B 440 - 449, B 410 - 429	Для детей в возрасте 0 - 1 лет: тяжелая форма течени заболевания, последстви оперативных вмешательств частыми обострениям (обострения более 6 раз в год либо непрерывн рецидивирующее течени заболевания с бронхиально обструкцией; наличие осложнений, в то числе от оперативны вмешательств; ДН III степени ХСН IIБ, III стадии
10.2			Астма	J45		
10.2.1					Нарушение функций дыхательной, сердечно-сосудистой системы, психических функций, функций системы крови и иммунной системы, эндокринной системы и метаболизма; МКФ: B 410 - 429, B 440 - 449, B 110 - 199, B 430 - 439, B 540 - 559	Для детей в возрасте 0 - 1 лет: легкое течение заболевания н фоне базисной терапи низкими дозам ингаляционных кортикостероидов; контролируемое или частичн контролируемое, с редкими (и менее раз в год) сезонным обострениями и/или легким приступами; ДН 0 или ДН

						степени в межприступно периоде
10.2.2					Нарушение функций дыхательной, сердечно-сосудистой системы, психических функций, функций системы крови и иммунной системы, эндокринной системы и метаболизма; МКФ: B 410 - 429, B 440 - 449, B 110 - 199, B 430 - 439, B 540 - 559	Для детей в возрасте 0 - 1 лет: среднетяжелое и тяжело течение заболевания (на фон базисной терапии средним дозами ингаляционны кортикостероидов), частичн контролируемое течение более частыми (4 - 6 раз в год обострениями средней ил тяжелой степени тяжести; ДІ II степени в межприступно периоде
10.2.3					Нарушение функций дыхательной, сердечно-сосудистой системы, психических функций, функций системы крови и иммунной системы, эндокринной системы и метаболизма; МКФ: B 410 - 429, B 440 - 449, B 110 - 199, B 430 - 439, B 540 - 559	Для детей в возрасте 0 - 1 лет: тяжелое, неконтролируемо течение на фоне базисно терапии высокими дозам ингаляционных кортикостероидов; с частым (4 - 6 раз в год) тяжелым приступами, требующим стационарного лечения, ДН I ДН III степени межприступном периоде
10.3			Единственное легкое	Z92.4		
10.3.1					Нарушение функций	Для детей в возрасте 0 - 1

					дыхательной, сердечно-сосудистой системы, системы крови и иммунной системы; МКФ: B 440 - 449, B 410 - 429, B 430 - 439	лет: наличие единственног легкого (врожденное, посл пульмонэктомии)
10.3.2					Нарушение функций дыхательной, сердечно-сосудистой системы, системы крови и иммунной системы; МКФ: B 440 - 449, B 410 - 429, B 430 - 439	Для детей в возрасте 0 - 1 лет: наличие единственног легкого (врожденное, посл пульмонэктомии) признаками ДН
10.4			Наличие трансплантированного легкого	Z94.2		
Первичное освидетельствование						
10.4.1					Нарушение функций дыхательной, сердечно-сосудистой системы, системы крови и иммунной системы; МКФ: B 44 - 449, B 410 - 429, B 430 - 439	Для детей в возрасте 0 - 1 лет: после трансплантации легког в течение первых 2 лет
Повторное освидетельствование (по истечении срока 2х летнего наблюдения)						
10.4.2					Нарушение функций дыхательной,	Для детей в возрасте 0 - 1 лет:

					сердечно-сосудистой системы, системы крови и иммунной системы; МКФ: B 440 - 449, B 410 - 429, B 430 - 439	при наличии осложнений умеренными нарушениям функций организма
10.4.3					Нарушение функций дыхательной, сердечно-сосудистой системы, системы крови и иммунной системы; МКФ: B 440 - 449, B 410 - 429, B 430 - 439	Для детей в возрасте 0 - 1 лет: при наличии осложнений выраженными нарушениям функций организма
10.4.4					Нарушение функций дыхательной, сердечно-сосудистой системы, системы крови и иммунной системы; МКФ: B 440 - 449, B 410 - 429, B 430 - 439	Для детей в возрасте 0 - 1 лет: при наличии осложнений с значительно выраженным нарушениями функци организма
10.5			Респираторные нарушения после медицинских процедур, не классифицированные в других рубриках (трахеостома)	J95		
10.5.1					Нарушение функций дыхательной системы, языковых и речевых функций;	Для детей в возрасте 0 - 1 лет: наличие функционирующе постоянной трахеостомь

					МКФ: B 440 - 449, B 310 - 399	сохранная либ малоразборчивая речь; ДН или ДН I степени
10.5.2					Нарушение функций дыхательной системы, языковых и речевых функций; МКФ: B 440 - 449, B 310 - 399	Для детей в возрасте 0 - 1 лет: наличие функционирующе постоянной трахеостомы выраженными нарушениям языковых и речевых функций вплоть до потер экспрессивной речи, наличи ДН II или ДН III степени других осложнений
11	Болезни органов пищеварения (класс XI) и патология с поражением преимуществен но органов пищеварения, представленная в других классах болезней.			K00 - K93		

Примечание к пункту 11.
Количественная оценка степени выраженности стойких нарушений функций пищеварительной системы организма ребенка в возрасте до 18 лет, обус заболеваниями, последствиями травм или дефектами, основывается на оценке формы и тяжести заболевания, активности процесса, наличия и частот

распространенности патологического процесса, наличия недостаточности питания (белково-энергетической недостаточности, далее - БЭН), включен органов-мишеней, наличия осложнений, а также на данных лабораторных и инструментальных методов исследования.						
11.1		Болезни желудка и двенадцатиперстной кишки		K20 - K31		
11.1.1			Приобретенное отсутствие части желудка Синдромы оперированного желудка	Z90.3 K91.1		
11.1.1.1					Нарушения функций пищеварительной, эндокринной систем и метаболизма, системы крови и иммунной системы; МКФ: B 510 - 539, B 540 - 559, B 430 - 439	Для детей в возрасте 0 - 1 лет: наличие незначительног синдрома оперированног желудка (демпинг-синдром синдром приводящей петли прочие синдромы) посл резекции желудка различных модификациях отсутствие недостаточност питания либо наличие БЭН степени
11.1.1.2					Нарушения функций пищеварительной, эндокринной систем и метаболизма, системы крови и иммунной системы; МКФ: B 510 - 539, B 540 - 559, B 430 - 439	Для детей в возрасте 0 - 1 лет: наличие умеренного синдром оперированного желудк (демпинг-синдром, синдро приводящей петли и прочи синдромы) после резекци

						желудка в различны модификациях; наличие БЭ II степени
11.1.1.3					Нарушения функций пищеварительной, эндокринной систем и метаболизма, системы крови и иммунной системы; МКФ: B 510 - 539, B 540 - 559, B 430 - 439	Для детей в возрасте 0 - 1 лет: наличие выраженног синдрома оперированног желудка (демпинг-синдром синдром приводящей петли прочие синдромы) посл субтотальной или тотально резекции желудка; наличи БЭН III степени
11.1.2		Неинфекционнный энтерит и колит		K50 - 52		
11.1.2.1			Болезнь Крона (регионарный энтерит) Язвенный колит Другие неинфекционные гастроэнтериты и колиты	K50 K51 K52		
Примечание к подпункту 11.1.2.1. Количественная оценка нарушений функций пищеварительной системы ребенка в возрасте до 18 лет при НЯК и болезни Крона зависит от степе процесса, типа течения и тяжести заболевания, наличия осложнений (внекишечных, кишечных и перианальных); а также от эффективности терапии, наличия резистентности к ней.						
11.1.2.1.1					Нарушения функций пищеварительной,	Для детей в возрасте 0 - 1 лет:

					эндокринной систем и метаболизма, системы крови и иммунной системы; МКФ: B 510 - 539, B 430 - 439	длительная клинико-лабораторная ремиссия (1 год и более) отсутствием клинически симптомов заболевания лабораторных признако воспалительной активности либо с минимально активностью процесса; хроническое течени заболевания (обострения 1 ра в год и реже) с минимально активностью процесса (0 - степени) при отсутстви терапии или на фон проводимой терапии. Отсутствие осложнени заболевания и осложнений о проводимой медикаментозно терапии
11.1.2.1.2					Нарушения функций пищеварительной, дыхательной систем, функции сердечно-сосудистой системы, системы крови и иммунной системы, нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций, нарушения	Для детей в возрасте 0 - 17 лет: хроническое рецидивирующе течение (обострения 2 - 3 раз в год) и хроническо непрерывное течени заболевания с умеренно активностью процесса ведущие к умеренны нарушениям функци организма.

					психических функций; МКФ: B 510 - 539, B 440 - 449, B 410 - 429, B 430 - 439, B 710 - 799, B 110 - 199	Наличие кишечны осложнений, внекишечны проявлений заболевания н фоне проводимой базисно терапии
11.1.2.1.3					Нарушения функций пищеварительной, дыхательной систем, функции сердечно-сосудистой системы, системы крови и иммунной системы, нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций, нарушения психических функций; МКФ: B 510 - 539, B 440 - 449, B 410 - 429, B 430 - 439, B 710 - 799, B 110 - 199	Для детей в возрасте 0 - 1 лет: хроническое рецидивирующе течение (обострения 4 - 5 раз год) и хроническо непрерывное течени заболевания с высоко активностью процесса свищевая, стенозирующа формы заболевания, ведущи к выраженным нарушения функций организма. Наличие осложнени заболевания (любых) осложнений от проводимо медикаментозной терапии
11.1.2.1.4					Нарушения функций пищеварительной, дыхательной систем, функции сердечно-сосудистой системы, системы крови и иммунной системы, нейромышечных, скелетных и связанных с движением	Для детей в возрасте 0 - 1 лет: прогрессирующее течени заболевания с тотальны поражением кишечника значительно выраженным нарушениями функци организма (мальабсорбция мальдигестия тяжело

					(статодинамических) функций, нарушения психических функций; МКФ: B 510 - 539, B 440 - 449, B 410 - 429, B 430 - 439, B 710 - 799, B 110 - 199	степени, кахексия последствия массивно резекции кишечника)
11.2		Другие болезни кишечника Болезни брюшины		K55 - K64 K65 - K67		
11.2.1			Кишечные сращения (спайки) с непроходимостью	K56.5		
11.2.1.1					Нарушение функции пищеварительной системы; МКФ: B 510 - 539	Для детей в возрасте 0 - 1 лет: спаечная болезнь с редкими (- 4 раза в год) приступам кишечной непроходимости купирующимися консервативными методам терапии (в амбулаторны условиях)
11.2.1.2					Нарушения функций пищеварительной, эндокринной систем и метаболизма, системы крови и иммунной системы; МКФ: B 510 - 539, B 540 - 559, B 430 - 439	Для детей в возрасте 0 - 1 лет: спаечная болезнь приступами кишечно непроходимости 5 и более ра в год, купирующимис консервативными методам

						терапии в условия стационара или требующи оперативного вмешательств (разделение спаек) не более раза в год)
11.2.1.3					Нарушения функций пищеварительной, эндокринной систем и метаболизма, системы крови и иммунной системы; МКФ: B 510 - 539, B 540 - 559, B 430 - 439	Для детей в возрасте 0 - 1 лет: непрерывно рецидивирующее прогрессирующее течени спаечной болезни, требующе стационарного лечения, н поддающееся консервативно терапии и требующе оперативного вмешательств (разделение спаек, резекци кишки, наложение стомы)
11.3		Болезни печени Вирусный гепатит		K70 - K77 B15 - B19		
Примечание к подпункту 11.3. Количественная оценка нарушений функций пищеварительной системы ребенка в возрасте до 18 лет при болезнях печени зависит от стадии фибр шкале METAVIR, шкале FibroTest), стадии цирроза печени (класс по Чайлд-Пью), фазы патологического процесса (индекс гистологической актив цитолиза, холестаза), степени портальной гипертензии, наличия осложнений (отечно-асцитический, геморрагический синдром - кровотечения расширенных вен пищевода, желудка, геморроидальных вен и других, печеночная энцефалопатия, формирование цирроза-рака и прочие), а так сочетанных клинических синдромов (гепато-пульмонального, гепато-панкреатического, гепато-ренального и других).						
11.3.1			Хронический вирусный гепатит Токсическое поражение	B18 K71		

			печени Хронический гепатит, не классифицированный в других рубриках Фиброз печени	 K73 K74.0		
11.3.1.1					Нарушение функций пищеварительной системы; МКФ: B 510 - 539	Для детей в возрасте 0 - 1 лет: хронический гепатит незначительными признакам активности прогрессирования. Отсутстви фиброза либо незначительны признаки фиброза (A1F0 ил A1F1 по шкале METAVIR)
11.3.1.2					Нарушения функций пищеварительной, системы крови и иммунной системы; МКФ: B 510 - 539; B 430 - 439	Для детей в возрасте 0 - 1 лет: хронический гепатит умеренными признакам активности прогрессирования. Умеренные признаки фиброз (A2F2 по шкале METAVIR)
11.3.1.3					Нарушения функций пищеварительной, эндокринной систем и метаболизма, системы крови и иммунной системы, нейромышечных, скелетных	Для детей в возрасте 0 - 1 лет: хронический гепатит выраженными признакам активности прогрессирования.

					и связанных с движением (статодинамических) функций; МКФ: B 510 - 539, B 540 - 559, B 430 - 439, B 710 - 799	Исход в цирроз, выраженны признаки фиброза (A3F4 - п шкале METAVIR)
11.3.2			Токсическое поражение печени с циррозом печени Цирроз печени Врожденный цирроз печени	K71.7 K74.1 Q44		
11.3.2.1					Нарушения функций пищеварительной, эндокринной систем и метаболизма, сердечно-сосудистой системы, системы крови и иммунной системы, нарушения психических функций; МКФ: B 510 - 539, B 540 - 559, B 410 - 429, B 430 - 439, B 110 - 199	Для детей в возрасте 0 - 1 лет: цирроз печени (A0 - 1, F4 п шкале METAVIR компенсированный (класс А по Чайлд-Пью). Умеренны нарушения функци организма
11.3.2.2					Нарушения функций пищеварительной, эндокринной систем и метаболизма, сердечно-сосудистой	Для детей в возрасте 0 - 17 ле цирроз печени (A1 - 3, F4 п шкале METAVIR субкомпенсированный (клас В по Чайлд-Пью)

					системы, системы крови и иммунной системы, нарушения психических функций; МКФ: B 510 - 539, B 540 - 559, B 410 - 429, B 430 - 439, B 110 - 199	выраженными нарушениям функций организма
11.3.2.3					Нарушения функций пищеварительной, эндокринной систем и метаболизма, сердечно-сосудистой системы, системы крови и иммунной системы, нарушения психических функций; МКФ: B 510 - 539, B 540 - 559, B 410 - 429, B 430 - 439, B 110 - 199	Для детей в возрасте 0 - 17 ле Цирроз печени (A1 - 3, F4 п шкале METAVIR декомпенсированный (класс по Чайлд-Пью) с значительно выраженным нарушениями функци организма
11.3.3			Портальная гипертензия Синдром Бадда-Киари	K76.6 I82.0		
Примечание к подпункту 11.3.3. Количественная оценка нарушенных функций организма ребенка в возрасте до 18 лет при различных видах ПГ основывается на стадии ПГ, степени ВРВП, наличия и частоты кровотечений из варикозно расширенных вен различной локализации, на нарушении функции печени, а также на наличии (гепатолиенальный синдром, асцит, гидроперикард, гидроторакс, фиброз печени, печеночная энцефалопатия и прочие).						
11.3.3.1					Нарушения функций пищеварительной, эндокринной систем и	Для детей в возрасте 0 - 1 лет: незначительное нарушени

					метаболизма, сердечно-сосудистой системы, системы крови и иммунной системы; МКФ: B 510 - 539, B 540 - 559, B 410 - 429, B 430 - 439	функций организма при ПГ степени после оперативног лечения и на фоне стойко длительной ремиссии (2 - года). Наличие ВРВП 0 - степени, без кровотечений анамнезе
11.3.3.2					Нарушения функций пищеварительной, эндокринной систем и метаболизма, сердечно-сосудистой системы, системы крови и иммунной системы; МКФ: B 510 - 539, B 540 - 559, B 410 - 429, B 430 - 439	Для детей в возрасте 0 - 1 лет: умеренное нарушени функций организма при ПГ I степени после оперативног лечения и на фоне стойко длительной ремиссии (2 - года). Наличие ВРВП II степени
11.3.3.3					Нарушения функций пищеварительной, эндокринной системы и метаболизма, сердечно-сосудистой системы, системы крови и иммунной системы, психических функций; МКФ: B 510 - 539, B 540 - 559, B 410 - 429, B 430 - 439, B 110 - 199	Для детей в возрасте 0 - 1 лет: выраженное нарушени функций организма при ПГ II степени с выраженным проявлениями гиперспленизма; пр однократном кровотечении и ВРВ различной локализации. Период послеоперационно компенсации и адаптаци после портально декомпрессии и сочетанны операций

11.3.3.4					Нарушения функций пищеварительной, эндокринной системы и метаболизма, сердечно-сосудистой системы, системы крови и иммунной системы, психических функций; МКФ: B 510 - 539, B 540 - 559, B 410 - 429, B 430 - 439, B 110 - 199	Для детей в возрасте 0 - 1 лет: значительно выраженно нарушение функци организма при ПГ IV стади со значительно выраженным проявлениями гиперспленизма; пр повторяющихся кровотечениях из ВП различной локализации; пр наличии осложнений Паллиативное лечени (спленэктомия, гастротомия перевязкой ве пищеводно-желудочного перехода, оментогепатопексия); неэффективность хирургического лечения
11.3.4			Наличие трансплантированной печени	Z94.4		
Первичное освидетельствование						
11.3.4.1					Нарушения функций системы крови и иммунной системы; сердечно-сосудистой, дыхательной, эндокринной	Для детей в возрасте 0 - 1 лет: состояние посл трансплантации печени течение первых 2 лет

					систем и метаболизма, пищеварительной системы, мочевыделительной системы; нарушения психических функций; МКФ: B 430 - 439, B 410 - 429, B 440 - 450, B 540 - 559, B 510 - 539, B 610 - 639, B 110 - 199	
Повторное освидетельствование (по истечении 2х летнего срока)						
11.3.4.2					Нарушения функций системы крови и иммунной системы; сердечно-сосудистой, дыхательной, эндокринной систем и метаболизма, пищеварительной системы, мочевыделительной системы; нарушения психических функций; МКФ: B 430 - 439, B 410 - 429, B 440 - 450, B 540 - 559, B 510 - 539, B 610 - 639, B 110 - 199	Для детей в возрасте 0 - 1 лет: при наличии осложнений умеренными нарушениям функций организма
11.3.4.3					Нарушения функций системы крови и иммунной системы; сердечно-сосудистой, дыхательной, эндокринной	Для детей в возрасте 0 - 1 лет: при наличии осложнений выраженными нарушениям функций организма

					систем и метаболизма, пищеварительной системы, мочевыделительной системы; нарушения психических функций; МКФ: B 430 - 439, B 410 - 429, B 440 - 450, B 540 - 559, B 510 - 539, B 610 - 639, B 110 - 199	
11.3.4.4					Нарушения функций системы крови и иммунной системы; сердечно-сосудистой, дыхательной, эндокринной систем и метаболизма, пищеварительной системы, мочевыделительной системы; нарушения психических функций; МКФ: B 430 - 439, B 410 - 429, B 440 - 450, B 540 - 559, B 510 - 539, B 610 - 639, B 110 - 199	Для детей в возрасте 0 - 1 лет: при наличии осложнений с значительно выраженным нарушениями функци организма
11.4		Болезни желчного пузыря, желчевыводящих путей и поджелудочной железы		K80 - 87		

			Другие хронические панкреатиты	K86.1		
КонсультантПлюс: примечание. Нумерация пунктов дана в соответствии с официальным текстом документа.						
11.4.1.1					Нарушения функций пищеварительной, эндокринной систем и метаболизма; МКФ: B 510 - 539, B 540 - 559	Для детей в возрасте 0 - 17 лет: легкое течение заболевания, показатель фекальной эластазы > 200 мкг/г; отсутствие признаков недостаточности питания на фоне заместительной терапии незначительные нарушения внешнесекреторной функции поджелудочной железы - 100 200 мкг\г, незначительные нарушения - уровень компенсации (гликированный гемоглобин HbA1c < 6,5%; гликемия натощак 4 - 8 ммоль\л) с учетом нутритивного статуса/ Незначительные нарушения SDS от -2,0 до -3,0
11.4.1.2					Нарушения функций пищеварительной, эндокринной систем и метаболизма; МКФ: B 510 - 539, B 540 -	Для детей в возрасте 0 - 17 лет: среднетяжелое течение заболевания, наличие обострений со стационарным

					559	лечением (до 3 раз в год включительно); наличие экзокринной недостаточности по фекальной эластазе (от 100 до 200 мкг/г) на фоне заместительной терапии, умеренные нарушения внешнесекреторной функции поджелудочной железы 60 - 100 мкг\г; умеренные нарушения эндокринной недостаточности (HbAlc < 7,5 - 9% гликемия более 8 ммоль\л) с учетом нутритивного статуса. Умеренные нарушения SDS о -3,1 до -3,9
11.4.1.3					Нарушения функций пищеварительной, эндокринной систем и метаболизма; МКФ: B 510 - 539, B 540 - 559	Для детей в возрасте 0 - 17 лет: тяжелое течение заболевания, наличие частых обострений (более 4 раз в год); наличие экзокринной недостаточности по фекальной эластазе (менее 100 мкг/г) на фоне заместительной терапии; выраженные нарушения внешнесекреторной функции поджелудочной железы - менее 50 мкг\г; выраженные нарушения HbA1c более 9 %;

						гликемия более 9 ммоль\л) с учетом нутритивного статуса Выраженные нарушения SDS отклонение более чем на - 4 отклонения
11.5		Состояние, связанное с наличием искусственного отверстия		Z93		
11.5.1			Наличие гастростомы Наличие илеостомы Наличие колостомы Наличие другого искусственного отверстия желудочно-кишечного тракта	Z93.1 Z93.2 Z93.3 Z93.4		
11.5.1.1					Нарушения функций пищеварительной системы; МКФ: B 510 - 539	Для детей в возрасте 0 - 1 лет: наличие неустранимого аномального отверстия (стомы) желудочно-кишечного тракта в рамках паллиативной терапии
12	Болезни кожи и			L00 - L99		

	подкожной клетчатки (класс XII)					
Примечание к пункту 12. Количественная оценка степени выраженности стойких нарушений функций кожи ребенка в возрасте до 18 лет и связанных с ней систем преимущественно на оценке распространенности, локализации кожного процесса, формы и тяжести течения заболевания, активности процесса, нал обострений. Учитывается также необходимость подавления иммунитета, наличие осложнений с поражением органов и систем органи рецидивирующим формам кожных заболеваний относятся случаи обострения не менее 1 раза в течение последних 3 лет.						
12.1			Буллезные дерматозы Линеарный IgA зависимый дерматоз Дерматит герпетиформный Субкорнеальный пустулезный дерматит	L10 - L15 L12.2 L13.0 L13.1		
12.1.1					Нарушение функции кожи и связанных с ней систем; МКФ: B 810 - 849, B 850 - 899	Для детей в возрасте 0 - 1 лет: ограниченные проявлени кожного процесса, наличи единичных пузырей на кож и/или слизистых оболочках требующие лечения и ухода
12.1.2					Нарушение функции кожи и связанных с ней систем; МКФ: B 810 - 849, B 850 - 899	Для детей в возрасте 0 - 1 лет: распространенные высыпани на коже и/или слизисты

						оболочках (в том числ внутренних органов) локализованные высыпани на коже активны поверхностей тела (кож кистей и стоп); требующи лечения и ухода
12.2			Атопический дерматит	L20		
12.2.1					Нарушение функции кожи и связанных с ней систем; МКФ: B 810 - 849, B 850 - 899	Для детей в возрасте 0 - 1 лет: ограниченный дерматит площадью поражения до 10% поверхности тела, ил распространенный дерматит площадью поражения от 10 д 30%; обострения до 3 раз год на фоне проводимог лечения
12.2.2					Нарушение функции кожи и связанных с ней систем МКФ: B 810 - 849, B 850 - 899	Для детей в возрасте 0 - 1 лет: распространенный ил диффузный дерматит площадью поражения боле 30% поверхности тела обострения более 3 раз в год склонность к торпидном непрерывно рецидивирующему течению резистентность к системном

						лечению
12.3		Папулосквамозные нарушения		L40 - L45		
12.3.1			Псориаз	L40		
12.3.1.1					Нарушение функции кожи и связанных с ней систем; МКФ: B 810 - 849, B 850 - 899	Для детей в возрасте 0 - 1 лет: псориаз с площадью поражения до 10% поверхности тела, редко рецидивирующие (до 2 раз в год) формы заболевания
12.3.1.2					Нарушения функций кожи и связанных с ней систем, нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций; МКФ: B 810 - 849, B 850 - 899, B 710 - 799	Для детей в возрасте 0 - 1 лет: распространенные формы с площадью поражения поверхности кожи более 10%, частые обострения (более 2 раз в год); или непрерывно-рецидивирующее течение при неэффективности проводимого системного лечения; ладонно-подошвенный псориаз при неэффективности проводимого системного лечения
12.4		Другие болезни кожи и подкожной		L80 - L99		

		клетчатки				
12.4.1			Локализованная склеродермия (morphea) Линейная (полосовидная) склеродермия туловища и/или конечностей Прогрессирующая гемиатрофия лица Парри-Ромберга - глубокая линейная склеродермия	L94.0 L94.1 L94.1		
12.4.1.1					Нарушения функций кожи и связанных с ней систем; МКФ: B 810 - 849, B 850 - 899	Для детей в возрасте 0 - 1 лет: поверхностные форм склеродерм без нарушени или с незначительным нарушениями функции кожи связанных с ней систем
12.4.1.2					Нарушения функций кожи и связанных с ней систем, нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций, сенсорных функций; МКФ: B 810 - 849, B 850 - 899, B 710 - 799, B 210 - 299	Для детей в возрасте 0 - 1 лет: глубокие форм склеродермии при вовлечени в процесс кожи и подкожно клетчатки, фасций, мыш костей с образованием рубцо (вплоть до укорочени конечности и образовани контрактур),

						сопровождающиеся умеренными нарушениям функций организма (зависимости от локализации)
12.5		Врожденные аномалии и пороки развития кожи		Q80 - Q89		
12.5.1			Врожденный ихтиоз Вульгарный ихтиоз Х-сцепленный ихтиоз Пластинчатый (ламеллярный) ихтиоз Врожденная буллезная ихтиозиформная эритродермия	Q80 Q80.0 Q80.1 Q80.2 Q80.3		
12.5.1.1					Нарушение функции кожи и связанных с ней систем; МКФ: B 810 - 849, B 850 - 899	Для детей в возрасте 0 - 1 лет: незначительные нарушени функции кожи и связанных ней систем, хорош компенсирующиеся на фон терапии
12.5.1.2					Нарушения функций кожи и связанных с ней систем, нейромышечных, скелетных и связанных с движением	Для детей в возрасте 0 - 1 лет: генерализованные форм кератодермии, включа

					(статодинамических) функций, сенсорных функций; МКФ: B 810 - 849, B 850 - 899, B 710 - 799, B 210 - 299	ладонно-подошвенную локализацию, сопровождающиеся нарушением целостност кожных покровов резистентные к терапии
12.5.2			Врожденный буллезный эпидермолиз	Q81		
12.5.2.1					Нарушение функции кожи и связанных с ней систем; МКФ: B 810 - 849, B 850 - 899	Для детей в возрасте 0 - 1 лет: ограниченные формы
12.5.2.2					Нарушения функций кожи и связанных с ней систем, нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций, сенсорных функций, функций пищеварительной системы; МКФ: B 810 - 849, B 850 - 899, B 710 - 799, B 210 - 299, 510 - 539	Для детей в возрасте 0 - 1 лет: поражения кожи (в том числ активных поверхностей кистей, стоп), слизисты оболочек, приводящие умеренным нарушения функций организма
12.5.2.3					Нарушения функций кожи и связанных с ней систем, нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций, сенсорных	Для детей в возрасте 0 - 1 лет: поражения кожи, слизисты оболочек, в том числ внутренних органо приводящие к выраженны

					функций, нарушение функций пищеварительной, сердечно-сосудистой системы, мочевыделительной функции; МКФ: B 810 - 849, B 850 - 899, B 710 - 799, B 210 - 299, B 510 - 539; B 410 - 429, B 610 - 639	нарушениям функци организма
12.6		Болезни придатков кожи		L60 - L75		
12.6.1			Алопеция тотальная	L63.0		
12.6.1.1					Нарушения функций кожи и связанных с ней систем; МКФ: B 810 - 849, B 850 - 899	Для детей в возрасте 0 - 1 лет: тотальное облысение отсутствием бровей и ресниц
13	Болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани (класс XIII)			M00 - M99		

Примечание к пункту 13.
Количественная оценка степени выраженности стойких нарушений функций костно-мышечной системы и соединительной ткани организма ребенк
18 лет, обусловленных заболеваниями, последствиями травм или дефектами, основывается на оценке нарушений функций всех сегментов опорно
аппарата. При этом учитывается: нарушение функций суставов и всей конечности в целом, позвоночника (каждого отдела и в целом), направление
(правильное, неправильное), наличие патологических (порочных) установок, оценка состояния мышц конечностей, тазового и плечевого поясов. И

также и другие факторы: форма и тяжесть течения заболевания, наличие и частота обострений, распространенность и активность патологичес наличие осложнений						
13.1		Артропатии Системные поражения соединительной ткани Спондилопатии		M00 - M25 M30 - 36 M45 - 49		
13.1.1			Юношеский (ювенильный) артрит Юношеский (ювенильный) артрит при болезнях, классифицированных в других рубриках Узелковый полиартериит и родственные состояния Другие некротизирующие васкулопатии Системная красная волчанка Дерматополимиозит Системный склероз	M08 M09 M30 M31 M32 M33 M34		

			Другие системные поражения соединительной ткани Анкилозирующий спондилит	M35 M45		

Примечание к подпункту 13.1.1.
Количественная оценка степени выраженности стойких нарушений функций костно-мышечной системы и соединительной ткани организма ребенк
18 лет обусловленных воспалительными артропатиями (юношеский артрит), системными поражениями соединительной ткани (узелковый п
родственные состояния, другими некротизирующими васкулопатиями, системной красной волчанкой, дерматополимиозитом, системным склер
системными поражениями соединительной ткани), а также анкилозирующим спондилитом, основывается преимущественно на оценке степени
нарушений функций органов и систем организма, степени выраженности нарушений функции суставов (наличие и степень контрактуры сустава),
(степень ограничения подвижности позвоночника), на оценке рентгенологических изменений в суставах и позвоночнике, клинико-лабораторны
активности воспалительного процесса, характеристике течения заболевания; оценке степени тяжести заболевания, частоты, длительности и тяжес
объективизированных в условиях стационара, а также на оценке функциональной способности ребенка, наличия осложнений заболевания и
проводимой медикаментозной терапии. Необходимо учитывать также постоянную потребность (объем и виды) иммуносупрессивной терап
препаратов нескольких фармакотерапевтических групп), на фоне которой достигается и сохраняется состояние ремиссии заболевания.

13.1.1.1					Нарушения нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических), сенсорных функций, функций пищеварительной, дыхательной, сердечно-сосудистой систем, системы крови и иммунной системы, эндокринной системы и метаболизма, мочевыделительной	Для детей в возрасте 0 - 1 лет: отсутствие ил незначительное нарушени функции суставов и/ил позвоночника; рентгенологическая стадия отсутствие прогрессировани заболевания; отсутствие или наличи обострений (не более 1 раза год), отсутствие или I степен активности воспалительног

					функции, функций кожи и связанных с ней систем; МКФ: B 710 - 799, B 210 - 299, B 510 - 539, B 440 - 469, B 410 - 429, B 430 - 439, B 540 - 559, B 610 - 639, B 810 - 899	процесса на фоне терапии; ФК I; отсутствие осложнени заболевания от проводимо медикаментозной терапи (НПВП)
13.1.1.2					Нарушения нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических), сенсорных функций, функций пищеварительной, дыхательной, сердечно-сосудистой систем, системы крови и иммунной системы, эндокринной системы и метаболизма, мочевыделительной функции, функций кожи и связанных с ней систем; МКФ: B 710 - 799, B 210 - 299, B 510 - 539, B 440 - 469, B 410 - 429, B 430 - 439, B 540 - 559, B 610 - 639, B 810 - 899	Для детей в возрасте 0 - 1 лет: умеренное нарушени функции суставов и/ил позвоночника (ФК II степени) рентгенологическая стадия II; вариант заболевания поражением или бе поражения глаз (увеит); прогрессирующее течени заболевания: обострения 2 - 4 раза в год сохраняющаяся активност воспалительного процесса или II степени на фон иммуносупрессивной терапии необходимость коррекци терапии, возможност достижения ремиссии тольк при применени иммуносупрессивной терапи препаратами нескольких (2 более) фармакотерапевтических

						групп (за исключением НПВП), в том числе генно-инженерными биологическими препаратами; наличие осложнений заболевания и проводимой медикаментозной терапии
13.1.1.3					Нарушения нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических), сенсорных функций, функций пищеварительной, дыхательной, сердечно-сосудистой систем, системы крови и иммунной системы, эндокринной системы и метаболизма, мочевыделительной функции, функций кожи и связанных с ней систем; МКФ: B 710 - 799, B 210 - 299, B 510 - 539, B 440 - 469, B 410 - 429, B 430 - 439, B 540 - 559, B 610 - 639, B 810 - 899	Для детей в возрасте 0 - 1 лет: выраженное нарушение статодинамической функции вследствие поражения суставов и/или позвоночника; рентгенологическая стадия I или III, вариант заболевания с поражением или без поражения глаз (увеит); прогрессирующее течение заболевания; частые длительные обострения (более 4 раз в год) ФК II или III; сохраняющаяся активность воспалительного процесса 2 или 3 степени на фоне иммуносупрессивной терапии; возможность достижения ремиссии только при применении иммуносупрессивной терапии препаратами нескольких (2

						более) фармакотерапевтических групп (за исключение НПВП); в том числ генно-инженерными биологическими препаратами наличие осложнени заболевания и проводимо медикаментозной терапии
13.1.1.4					Нарушения нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических), сенсорных функций, функций пищеварительной, дыхательной, сердечно-сосудистой систем, системы крови и иммунной системы, эндокринной системы и метаболизма, мочевыделительной функции, функций кожи и связанных с ней систем; МКФ: B 710 - 799, B 210 - 299, B 510 - 539, B 440 - 469, B 410 - 429, B 430 - 439, B 540 - 559, B 610 - 639, B 810 - 899	Для детей в возрасте 0 - 1 лет: значительно выраженны нарушения статодинамических функций обусловленные поражение суставов и/или позвоночника; рентгенологическая стадия II или IV; вариант заболевания поражением или бе поражения глаз (увеит); быстро прогрессирующе течение заболевания; активность воспалительног процесса 3 степени; ФК III или IV; низкая эффективность ил резистентность к проводимо иммуносупрессивной терапи препаратами нескольки

						фармакотерапевтических групп (2 и более, включа генно-инженерные биологические препараты); наличие необратимы осложнений заболевания проводимой медикаментозно терапии
13.2		Деформирующие дорсопатии Врожденны е аномалии (пороки развития позвоночника и костей грудной клетки)		M40 - M43 Q76		
Примечание к подпункту 13.2. Количественная оценка степени выраженности стойких нарушений функций организма ребенка в возрасте до 18 лет, обусловленных деформацией основывается на оценке клинико-функциональных проявлений заболевания и данных рентгенологического обследования: вид деформации выраженности, локализация и протяженность основной дуги деформации и степень ее мобильности, темп прогрессирования деформации за кал степень ограничения подвижности позвоночника, наличие неврологической симптоматики, степень нарушения функций других органов и сист наличие и степень выраженности вторичного дегенеративно-дистрофического поражения позвоночника. Учитываются также результаты консервати наличие показаний и противопоказаний для реконструктивной хирургической коррекции, ее эффективность, осложнения, протяженность конструкции, завершенность периода активного роста ребенка, сопутствующие заболевания и сочетание сколиоза с другими пороками развития др систем организма (костно-мышечной, сердечно-сосудистой, дыхательной и других систем). Также необходимо учитывать наличие факторов неблагоприятного клинического и реабилитационного прогноза: быстрое прогрессирование, высока сколиоза; сочетание различных видов деформации дуги позвоночника; неэффективность реконструктивной хирургической коррекции, д металлоконструкции в послеоперационном периоде.						
13.2.1			Кифоз	M40		

			Сколиоз	M41		
13.2.1.1					Нарушения нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций; МКФ: B 710 - 799	Для детей в возрасте 0 - 1 лет: медленно прогрессирующи или стабильный тип течения низкая степень мобильност сколиотической дуги; инфантильные сколиозы (0 - лет), ювенильный сколиоз (7 12 лет): I или II степень сколиоза бе ограничения или незначительным ограничением подвижност позвоночника; юношеские сколиозы (13 - 1 лет): I, II, III степень сколиоза незначительным/умеренным ограничением подвижност позвоночника; при III степени сколиоза отсутствие неблагоприятны факторов прогноза. Наличие стабильно металлической конструкции пределах одного отдел позвоночника
13.2.1.2					Нарушения нейромышечных, скелетных	Для детей в возрасте 0 - 1 лет:

					и связанных с движением (статодинамических) функций, нарушения функций сердечно-сосудистой, дыхательной систем, пищеварительной системы; МКФ: B 710 - 799, B 410 - 429, B 440 - 449, B 510 - 539	быстро прогрессирующий ти течения сколиоза, средняя ил высокая степень мобильност сколиотической дуги; III степень сколиоза умеренным ограничение подвижности позвоночник при наличии неблагоприятны факторов прогноза; III степень сколиоза выраженным ограничение подвижности позвоночника. Наличие стабильно металлической протяженно конструкции более 1 отдела выраженным ограничение подвижности позвоночника. Нестабильность металлоконструкции и други осложнения оперативног лечения. Сочетание сколиотическо деформации со стабильно кифотической деформаци III и выше степеней
13.2.1.3					Нарушения нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций, нарушения функций	Для детей в возрасте 0 - 1 лет: IV степень сколиоза декомпенсированный, выраженным нарушение функций организма.

					сердечно-сосудистой, дыхательной систем, пищеварительной системы; МКФ: B 710 - 799, B 410 - 429, B 440 - 449, B 510 - 539	
13.2.2			Врожденный сколиоз, вызванный пороком развития кости	Q76.3		
Примечание к пункту 13.2.2. Количественная оценка степени выраженности стойких нарушений функций организма ребенка в возрасте до 18 лет, обусловленных врожденн основывается на оценке клинико-функциональных проявлений патологии и данных рентгенологического обследования: вид и форма аномал сегментации, слияния и формирования позвонков), наличие вариантов сочетаний аномалий позвонков и их распространенность, величин позвоночника и наличие деформации грудной клетки, наличие сочетания аномалии позвонков с различными аномалиями ребер и пороками ра органов и систем, тип течения сколиоза, состояние механизмов компенсации, эффективность хирургической коррекции и протяженность конструкции. Также необходимо учитывать наличие факторов неблагоприятного клинического и реабилитационного прогноза: нарушение сегмен "блокирование через сегмент", угол первичной деформации более 30°, грудопоясничная локализация порока, большое количество блокированны одной стороны, "кифосколиозогенные" пороки, любой вариант спондилолистеза; наличие кифотического компонента.						
13.2.2.1					Нарушения нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций, нарушения функций сердечно-сосудистой, дыхательной, пищеварительной систем; МКФ: B 710 - 799, B 410 - 429, B 440 - 449, B 510 - 539	Для детей в возрасте 0 - 1 лет: сколиозы, обусловленны локальным пороком. Угол первичной деформаци до 15 - 20°. Отсутствие противопоказани для оперативного лечения устранение деформаци оперативным путем. Отсутствие осложнений правильное стабильно

						расположение металлическо конструкции
13.2.2.2					Нарушения нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций, нарушения функций сердечно-сосудистой, дыхательной, пищеварительной систем; МКФ: B 710 - 799, B 410 - 429, B 440 - 449, B 510 - 539	Для детей в возрасте 0 - 1 лет: сколиозы субкомпенсированные, имеющие прогрессирующе течение. Угол первичной деформаци от 21° до 30°, наличи прогностически неблагоприятных критериев. Недостаточная коррекци деформации посл оперативного лечения большая протяженност металлической конструкции дестабилизация металлической конструкции наличие осложнений
13.2.2.3					Нарушения нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций, нарушения функций сердечно-сосудистой, дыхательной, пищеварительной систем, нарушение	Для детей в возрасте 0 - 1 лет: сколиозы декомпенсированные, имеющие прогрессирующее быстро прогрессирующе течение. Угол первичной деформаци более 30°, наличи прогностически

					мочевыделительной функции; МКФ: B 710 - 799, B 410 - 429, B 440 - 449, B 510 - 539, B 610 - 639	неблагоприятных критериев; сколиозы, сочетающиеся аномалиями развити позвоночного канала спинного мозга, други органов и систем; неудовлетворительный результат оперативног лечения (рецид деформации), наличи осложнений с умеренным или выраженным нарушениями функци организма; наличие противопоказаний оперативному вмешательству
13.2.2.4					Нарушения нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций, нарушения функций сердечно-сосудистой, дыхательной, пищеварительной систем, нарушение мочевыделительной функции; МКФ: B 710 - 799, B 410 - 429, B 440 - 449, B 510 - 539, B 610 - 639	Для детей в возрасте 0 - 1 лет: неоперабельные деформаци с выраженным ил значительно выраженны нарушением функци организма

13.3		Нарушения плотности кости		M80 - M85		
13.3.1			Остеопороз с патологическим переломом Остеопороз без патологического перелома	M80 M81		
Примечание к подпункту 13.3.1. Количественная оценка степени выраженности стойких нарушений функций организма ребенка в возрасте до 18 лет, обусловленных проявлениям различного генеза, основывается на частоте возникновения патологических переломов, их множественности, локализации, характера перелома с консолидации, исходов. Необходимо принимать во внимание показатели Z-критерия, по величине которого оценивается МПКТ и соотве возникновения патологических переломов. Учитываются результаты рентгенологической диагностики, а также результаты лабораторных показател минерального обмена (содержание ионизированной фракции кальция в крови, содержание фосфора в крови, суточная экскреция фосфора и кал экскреция кальция с мочой натощак по отношению к концентрации креатинина в этой же порции мочи).						
13.3.1.1					Нарушения нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций, функций эндокринной системы и метаболизма; МКФ: B 710 - 799, B 540 - 559	Для детей в возрасте 0 - 1 лет: отсутствуют перелом длинных трубчатых косте Отсутствуют деформации ил имеют место незначительны (менее 7 - 10°) деформаци оси конечности ил позвоночника, без нарушени или с незначительны нарушением их функци Z-критерий соответствуе остеопении или остеопорозу Лабораторные показател

						фосфорно-кальциевого обмена с незначительным отклонениями. Rg-признаки остеопороз отсутствуют
13.3.1.2					Нарушения нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций, функций эндокринной системы и метаболизма; МКФ: B 710 - 799, B 540 - 559	Для детей в возрасте 0 - 1 лет: патологические перелом длинных трубчатых костей раз в 2 - 3 года с длительны сроком консолидации деформацией оси конечност более 10°, но менее 20° вторичная деформация ос позвоночника (сколиоз II и II степени) Z-критери соответствует тяжелом остеопорозу. Лабораторные показател фосфорно-кальциевого обмена - умеренны изменения. Выявляются начальны Rg-признаки остеопороза
13.3.1.3					Нарушения нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций, функций эндокринной системы и	Для детей в возрасте 0 - 1 лет: патологические перелом длинных трубчатых косте более 1 раза в год, спонтанны переломы. Длительные срок

					метаболизма; МКФ: B 710 - 799, B 540 - 559	консолидации. Выраженная (20 градусов более) деформация ос конечности, возникновени ложных суставов, вторична деформация оси позвоночник с умеренным нарушением и функций. Z-критерий соответствуе тяжелому остеопорозу (очен высокий риск переломов). Лабораторные показател фосфорно-кальциевого обмена - умеренны выраженные и значительн выраженные изменения
13.3.1.4					Нарушения нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций, функций эндокринной системы и метаболизма; МКФ: B 710 - 799, B 540 - 559	Для детей в возрасте 0 - 1 лет: возникновение спонтанног перелома длинных трубчаты костей при незначительны двигательных и физически нагрузках, включая ве собственного тела Невозможность вертикализации из-з высокого риск возникновения спонтанног перелома
13.3.2			Другие нарушения	M85		

			плотности и структуры кости Единичная (солитарная) киста кости Аневризмальная киста кости Другие кисты костей	 M85.4 M85.5 M85.6		
Примечание к подпункту 13.3.2. Кисты костей (солитарные кисты длинных трубчатых костей, аневризмальные кисты, кисты в костях таза и телах позвонков) могут быть причиной п переломов; нарушения роста кости и развития неврологических осложнений (невропатия, радикулопатия). Количественная оценка степени выражен нарушений функций организма ребенка зависит от локализации и размеров кисты, характера патологического перелома, наличия и степени неврологических осложнений, эффективности проведенного лечения (наличие укорочения конечности, степень выраженности контрактуры суста конечности), наличия рецидивов кист						
13.3.2.1					Нарушения нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций; МКФ: B 710 - 799	Для детей в возрасте 0 - 1 лет: весь период лечения пр отсутствии осложнений; посл завершения лечения - пр расположении кисты вне зон роста, правильном срастани перелома без деформации ил с незначительно деформацией оси (плеча бедра), отсутствии ил незначительном ограничени объема движений в смежно суставе, отсутствии рецидиво заболевания посл

						реконструктивной хирургической коррекции
13.3.2.2					Нарушения нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций; МКФ: B 710 - 799	Для детей в возрасте 0 - 1 лет: укорочение конечности (пр локализации кисты в зон роста), требующее повторны оперативных вмешательств целью ее удлинения (по мер роста ребенка). Выраженная деформация ос (плеча, бедра, конечности целом), требующа оперативной коррекци наличие неврологически осложнений с умеренны ограничением объем движения в суставах. Рецидив заболевания посл проведенного оперативног лечения, требующи повторного оперативног вмешательства
13.4		Другие остеопатии		M86 - 90		
13.4.1			Другой хронический остеомиелит Другие хронические гематогенные остеомиелиты	M86.5 M86.6		

			Остеомиелит неуточненный	M86.9		
Примечание к подпункту 13.4.1. Количественная оценка стойких нарушений функций организма человека при хроническом остеомиелите зависит от распространенности, протяженности очага, частоты, тяжести и длительности обострений, степени активности процесса, включая клинические, рентгенологические и данные, состояния окружающих мягких тканей, наличия осложнений (нарушение роста кости, укорочение конечности, деформация и искривле контрактуры и анкилозы крупных суставов, патологические вывихи, ложные суставы), необходимости повторного оперативного лечения и его эф также от поражения других органов и систем вследствие хронической интоксикации.						
13.4.1.1					Нарушения нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций, функций системы крови и иммунной системы, функций кожи и связанных с ней систем; МКФ: B 710 - 799; B 430 - 439; B 810 - 899	Для детей в возрасте 0 - 1 лет: редкие (1 раз в год и реже непродолжительные (менее недель) обострения
13.4.1.2					Нарушения нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций, функций системы крови и иммунной системы, функций кожи и связанных с ней систем; МКФ: B 710 - 799; B 430 - 439; B 810 - 899	Для детей в возрасте 0 - 1 лет: обострения свищевой форм остеомиелита средне частоты (до 2 раз в год средней продолжительност (не менее 4 недель)
13.4.1.3					Нарушения	Для детей в возрасте 0 - 1

					нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций, функций сердечно-сосудистой, дыхательной, пищеварительной систем, нарушение мочевыделительной функции, функций кожи и связанных с ней систем; МКФ: B 710 - 799; B 410 - 429, B 440 - 449, B 510 - 539, B 610 - 639; B 810 - 899	лет: рецидивирующий остеомиелит: обострени частые (3 - 4 раза в год длительные (более 4 недель формирование умеренных ил выраженных контрактур смежных суставах. Наличие осложнений (ложны суставы, патологически вывихи)
13.5		Хондропатии		M91 - 94		
13.5.1			Юношеский остеохондроз головки бедренной кости (Болезнь Легга-Кальве-Пертеса	M91.1		
13.5.1.1					Нарушения нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций; МКФ: B 710 - 799	Для детей в возрасте 0 - 1 лет: IV или V стадии болезн Пертеса (стадия репарации стадия исхода) с сохранение анатомических соотношений тазобедренном суставе восстановлением функци сустава, или с формировани легкой контрактуры в суставе

13.5.1.2					Нарушения нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций; МКФ: B 710 - 799	Для детей в возрасте 0 - 1 лет: IV стадия (репарация): пр необходимости соблюдени ортопедического режима дозированной нагрузкой дополнительной опорой. V стадия (исход осложненная формировани выраженной контрактуры тазобедренном суставе (одной стороны), подвывих бедра (с одной стороны) выраженной гипотрофи мышц бедра и ягодичны мышц, с укорочени конечности (более 4 см)
13.5.1.3					Нарушения нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций; МКФ: B 710 - 799	Для детей в возрасте 0 - 1 лет: I и II стадия (некроз импрессионный перелом), III стадия (фрагментации) н весь период полно иммобилизации
14	Болезни мочеполовой системы (класс XIV) и патология с поражением			N00 - N99		

	преимущественно органов мочеполовой системы, представленная в других классах болезней					
примечание к пункту 14. Количественная оценка степени выраженности стойких нарушений функций организма ребенка, обусловленных болезнями мочеполовой системы преимущественно на оценке степени выраженности нарушения функции почек в соответствии с классификацией хронической болезни почек (Учитываются также и другие факторы патологического процесса, форма и тяжесть течения заболевания, активность процесса, наличие и часто распространенность патологического процесса, включение органов - мишеней, необходимость подавления иммунитета, наличие осложнени пиелонефрит, мочекаменная болезнь и прочие). В большинстве представленных случаев (за исключением болезней, указанных в подпунктах 14.3 и количественной системы оценки) незначительная степень нарушения мочевыделительной функции организма характеризуется отсутствием хронич почек, либо ее начальными стадиями (ХБП 1 и ХБП 2 стадии); умеренная степень - наличием ХБП 3 стадии (3А и 3Б), выраженная и значитель степень нарушения мочевыделительной функции характеризуется хронической болезнью почек 4 и 5 стадий соответственно. В основе стратификац лежит уровень скорости клубочковой фильтрации (далее - СКФ), который отличается у детей разных возрастов.						
14.1			Гломерулярные болезни (хронический нефритический синдром, нефротический синдром) Тубулоинтерстициальные болезни почек: исключая обструктивную уропатию и рефлюкс-уропатию (или гидронефроз - N13) и хронический обструктивный	N00 - N08 N10 - N16		

			пиелонефрит (N11), предусмотренные подпунктами 14.3 и 14.4 настоящей количественной системы оценки Почечная недостаточность (включая хроническую болезнь почек)	N17 - N19		
14.1.1					Нарушение мочевыделительной функции; МКФ: B 610 - 639	Дети 0 - 12 месяцев: СКФ ниже возрастной норм на 10 - 20%; дети старше 1 года: ХБП 1 стадии, СКФ более 9 мл/мин/1,73 м^2; ХБП 2 стадии, СКФ пределах 89 - 60 мл/мин/1,7 м^2
14.1.2					Нарушения мочевыделительной функции, функции системы крови и иммунной системы; эндокринной системы и метаболизма; МКФ: B 610 - 639, B 430 - 439, B 540 - 559	Дети 0 - 12 месяцев: СКФ ниже возрастной норм на 30%; дети старше 1 года: ХБП 3А стадии, СКФ 59-4 мл/мин/1,73 м^2; ХБП 3Б стадии, СКФ 44-3 мл/мин/1,73 м^2. Любая стадия ХБП пр заболеваниях с частым

						обострениями или пр латентном течени заболевания с высоко степенью активност патологического процесса нуждаемость в препаратах подавляющих иммунитет неэффективность лечения при наличии осложнений
14.1.3					Нарушения мочевыделительной функции, функции системы крови и иммунной системы; эндокринной системы и метаболизма; МКФ: B 610 - 639, B 430 - 439, B 540 - 559	Дети 0 - 12 месяцев: СКФ ниже возрастной норм на 40%; дети старше 1 года: ХБП 4 стадии, СКФ 29-1 мл/мин/1,73 м^2
14.1.4					Нарушения мочевыделительной функции, функции системы крови и иммунной системы; эндокринной системы и метаболизма; МКФ: B 610 - 639, B 430 - 439, B 540 - 559	Дети 0 - 12 месяцев: СКФ ниже возрастной норм на более 50%; дети старше 1 года: ХБП 5 стадии, СКФ ниже 1 мл/мин/1,73 м^2
14.2			Помощь, включающая гемодиализ Подготовительные процедуры для	Z49 Z49.0		

			проведения диализа Экстракорпоральный диализ Другой вид диализа	 Z49.1 Z49.2		
14.2.1					Нарушения мочевыделительной функции, статодинамических, психических функций, функций сердечно-сосудистой системы, системы крови и иммунной системы, эндокринной системы и метаболизма; МКФ: B 610 - 639; B 710 - 789, B 110 - 139, B 140 - 189, B 198, B 199, B 410 - 429, B 430 - 439, B 540 - 559	Дети 0 - 12 месяцев: СКФ ниже возрастной норм на более 40%; дети старше 1 года: СКФ 29 - 15 мл/мин/1,73 м^2
14.2.2					Нарушения мочевыделительной функции, статодинамических, психических функций, функций сердечно-сосудистой системы, системы крови и иммунной системы, эндокринной системы и	Дети 0 - 12 месяцев: СКФ ниже возрастной норм более 50%; дети старше 1 года: СКФ ниже 15 мл/мин/1,73 м^2

					метаболизма; МКФ: B 610 - 639; B 710 - 789, B 110 - 139, B 140 - 189, B 198, B 199, B 410 - 429, B 430 - 439, B 540 - 559	
14.3			Обструктивная уропатия и рефлюкс-уропатия (гидронефроз) Хронический тубулоинтерстициальный нефрит (в том числе хронический обструктивный пиелонефрит) Мочекаменная болезнь Другие болезни почки и мочеточника	N13 N11.1 - N11.9 N20 - N23 N25 - N29		
14.3.1					Нарушения мочевыделительной функции, функций эндокринной системы и метаболизма; МКФ: B 610 - 639, B 540 - 559	Для детей в возрасте 0 - 1 лет: обструктивный уретерогидронефроз обострением хроническог пиелонефрита до 2 раз в год реже, без нарушения функци почек либо с развитием ХБП или 2 стадии
14.3.2					Нарушения	Для детей в возрасте 0 - 1

					мочевыделительной функции, психических функций, функций сердечно-сосудистой системы, системы крови и иммунной системы, эндокринной системы и метаболизма; МКФ: B 610 - 639; B 110 - 199, B 410 - 429, B 430 - 439, B 540 - 559	лет: обструктивный уретерогидронефроз обострением хронического пиелонефрита от 2 до 4 раз год; развитие ХБП 3 стадии
14.3.3					Нарушения мочевыделительной функции, психических функций, функций сердечно-сосудистой системы, системы крови и иммунной системы, эндокринной системы и метаболизма; МКФ: B 610 - 639; B 110 - 199, B 410 - 429, B 430 - 439, B 540 - 559	Для детей в возрасте 0 - 1 лет: обструктивный уретерогидронефроз обострением хронического пиелонефрита более 4 раз год; развитие ХБП 4 стадии
14.4			Приобретенное отсутствие почки Агенезия и другие редукционные дефекты почки	Z90.5 Q60		
14.4.1					Нарушения	Для детей в возрасте 0 - 1

					мочевыделительной функции, функции эндокринной системы и метаболизма; МКФ: B 610 - 639, B 540 - 559	лет: единственная почка, ХБП или 2 стадии
14.4.2					Нарушения мочевыделительной функции, психических функций, функций сердечно-сосудистой системы, системы крови и иммунной системы; эндокринной системы и метаболизма; МКФ: B 610 - 639; B 110 - 199, B 410 - 429, B 430 - 439, B 540 - 559	Для детей в возрасте 0 - 1 лет: единственная почка, ХБП стадии
14.4.3					Нарушения мочевыделительной функции, психических функций, функций сердечно-сосудистой системы, системы крови и иммунной системы; эндокринной системы и метаболизма; МКФ: B 610 - 639, B 110 - 199, B 410 - 429, B 430 - 439, B 540 - 559	Для детей в возрасте 0 - 1 лет: единственная почка; ХБП стадии

14.4.4					Нарушения мочевыделительной функции, психических функций, функций сердечно-сосудистой системы, системы крови и иммунной системы; эндокринной системы и метаболизма; МКФ: B 610 - 639, B 110 - 199, B 410 - 429, B 430 - 439, B 540 - 559	Для детей в возрасте 0 - 1 лет: хронический пиелонефри единственной почки, ХБП стадии
14.5			Наличие трансплантированной почки	Z94.0		
Первичное освидетельствование						
14.5.1					Нарушения мочевыделительной функции, нарушения статодинамических, психических функций, функций сердечно-сосудистой системы, системы крови и иммунной системы; эндокринной системы и метаболизма; МКФ: B 610 - 639, B 710 - 799, B 110 - 199, B 410 -	Для детей в возрасте 0 - 1 лет: состояние посл трансплантации почки течение первых 2 лет

					429, B 430 - 439, B 540 - 559	
Повторное освидетельствование (по истечении 2х летнего срока)						
14.5.2					Нарушения мочевыделительной функции, нарушения статодинамических, психических функций, функций сердечно-сосудистой системы, системы крови и иммунной системы; эндокринной системы и метаболизма; МКФ: B 610 - 639, B 710 - 799, B 110 - 199, B 410 - 429, B 430 - 439, B 540 - 559	Для детей в возрасте 0 - 1 лет: при наличии осложнений умеренными нарушениям функций организма
14.5.3					Нарушения мочевыделительной функции, нарушения статодинамических, психических функций, функций сердечно-сосудистой системы, системы крови и иммунной системы; эндокринной системы и метаболизма; МКФ: B 610 - 639, B 710 - 799, B 110 - 199, B 410 -	Для детей в возрасте 0 - 1 лет: при наличии осложнений выраженными нарушениям функций организма

					429, В 430 - 439, В 540 - 559	
14.5.4					Нарушения мочевыделительной функции, нарушения статодинамических, психических функций, функций сердечно-сосудистой системы, системы крови и иммунной системы; эндокринной системы и метаболизма; МКФ: В 610 - 639, В 710 - 799, В 110 - 199, В 410 - 429, В 430 - 439, В 540 - 559	Для детей в возрасте 0 - 1 лет: при наличии осложнений с значительно выраженным нарушениями функци организма
14.6			Обтурация шейки мочевого пузыря различной этиологии Стриктура уретры Уретральный свищ (уретроперинеальный, уретроректальный, мочевой) Послеоперационная стриктура уретры Поликистоз почки, детский тип	N32.0 N35 N36.0 N99.1 Q61.1		

			Врожденный гидронефроз Атрезия и стеноз мочеточника: стеноз лоханочно-мочеточникового сегмента (ЛМС), стеноз пузырно-мочеточникового сегмента (ПМС) Врожденный мегауретер Врожденный пузырно-мочеточниковый рефлюкс	Q62.0 Q62.1 Q62.2 Q62.7		
14.6.1					Нарушение мочевыделительной функции; МКФ: B 610 - 639	Для детей в возрасте 0 - 1 лет: после окончани оперативного лечения пр наличии незначительног нарушения мочевыделительной функции обострения вторичног пиелонефрита до 2 раз в год; отсутствие нарушени функции почек, ХБП 1 или стадии
14.6.2					Нарушение мочевыделительной функции;	Для детей в возрасте 0 - 1 лет: на весь период проведени

					МКФ: B 610 - 639	многоэтапного оперативног лечения, сопровождающегос наличием искусственны отверстий мочевого тракта; после окончани оперативного лечения пр наличии умеренног нарушения мочевыделительной функции обострения вторичног пиелонефрита от 2 до 4 раз год, латентное течени пиелонефрита; ХБП 3 стадии
14.6.3					Нарушение мочевыделительной функции; МКФ: B 610 - 639	Для детей в возрасте 0 - 1 лет: на весь период проведени многоэтапного оперативног лечения, сопровождающегос наличием мочевых свищей; длительной и/или постоянно катетеризацией мочевог пузыря. После окончани оперативного лечения пр наличии выраженног нарушения мочевыделительной функции обострения вторичног пиелонефрита более 4 раз год; ХБП 4 стадии

14.7			Наличие цистостомы Наличие искусственных отверстий мочевого тракта (нефростомы, уретростомы, уретеростомы)	Z93.5 Z93.6		
14.7.1					Нарушение мочевыделительной функции; МКФ: B 610 - 639	Для детей в возрасте 0 - 1 лет: наличие неустранимог аномального отверсти (стомы) мочевого тракта рамках паллиативной терапии
15	Врожденные аномалии (пороки), деформации и хромосомные болезни (Класс XVII)			Q00 - Q99		
Примечание к пункту 15. Количественная оценка нарушения функций организма ребенка в возрасте до 18 лет при врожденных аномалиях (пороках), деформациях и хромосо зависит от заболевания, характера течения, степени нарушенных функций органов и систем организма, от эффективности проводимой терапии, ре ней, а также от прогноза врожденной и наследственной патологии.						
15.1		Врожденные аномалии (пороки развития) нервной системы		Q00 - Q07		

Примечание к подпункту 15.1.
Количественная оценка степени выраженности стойких нарушений функций организма ребенка в возрасте до 18 лет при врожденных аномалиях не зависит от характера порока, от содержимого и локализации грыжевого мешка, размера структурных нарушений вещества головного или спин результатам КТ, МРТ) клинико-функциональных проявлений порока или аномалии: выраженности двигательных нарушений, степени неврологичес когнитивного и интеллектуального снижения, наличия судорожных пароксизмов и их вида, частоты, тяжести, резистентности к противосудоро Учитывается также клинический прогноз возможность хирургической коррекции порока, его эффективность, наличие осложнений, сочетание с поро других органов и систем организма (зрения, слуха, опорно-двигательной, сердечно-сосудистой и других систем), степень нарушений психичес языковых, сенсорных, статодинамических и других функций организма.

15.1.1			Анэнцефалия и подобные пороки развития (ацефалия, гемицефалия)			
15.1.1.1					Нарушения психических, языковых и речевых, сенсорных, нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций, дыхательной, пищеварительной систем, мочевыделительной функции; МКФ: B 110 - 199, B 310 - 399, B 210 - 299, B 710 - 799, B 440 - 450, B 510 - 539, B 610 - 639	Для детей в возрасте 0 - 1 лет: ацефалия и гемицефалия с снижением интеллекта мене 34 баллов, значительн выраженными статодинамическими нарушениями (тетра-; геми- парапарезы); значительно выраженными резистентными к терапи пароксизмальными расстройствами; значительно выраженным псевдобульбарными булбарными нарушениями отсутствием контрол функции тазовых органов

15.1.2			Энцефалоцеле	Q01		
15.1.2.1					Нарушения психических, языковых и речевых, сенсорных, нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций; МКФ: B 110 - 199, B 210 - 299, B 310 - 399, 710 - 799	Для детей в возрасте 0 - 1 лет: менингоцеле небольши размеров (дефект косте черепа не более 2 x 2 см) средних размеров (более 2 x 2 но менее 3 x 3 см) посл радикальной оперативно коррекции без осложнени при отсутствии ил незначительных нарушения функций организма: 0 - 3 года - развитие п возрасту или незначительно отставание в физическом психомоторном, речево развитии, формировани социальных навыков; старш 3 лет - незначительны когнитивные нарушения незначительное снижени интеллекта (3 - 15 лет: IQ = 7 - 79 баллов; 16 - 17 лет: IQ = 65 - 69 баллов); редки пароксизмальные расстройства; незначительные нарушени устной и/или письменно речи; незначительны нарушения

						статодинамических сенсорных функций (зрени и/или слуха)
15.1.2.2					Нарушения психических, языковых и речевых, сенсорных, нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций, функций пищеварительной, дыхательной систем, нарушения мочевыделительной функции; МКФ: B 110 - 199, B 310 - 399, B 210 - 299, B 710 - 79, B 510 - 539, B 540 - 550, B 610 - 639	Для детей в возрасте 0 - 1 лет: менингоцеле больши размеров (дефект косте черепа 3 x 3 см и более) посл радикальной оперативно коррекции при наличи умеренных нарушени функций организма: 0 - 3 года - умеренно отставание в физическом психомоторном, речево развитии, формировани социальных навыков; дет старше 3 лет - умеренны когнитивные нарушения умеренное снижени интеллекта (3 - 15 лет: IQ = 5 - 69 баллов; 16 - 17 лет: IQ = 50 - 64 баллов); умеренны пароксизмальные расстройства; умеренны псевдобульбарный синдром умеренные нарушения устно и/или письменной речи двигательные нарушени (умеренные тетра, геми- парапарезы); нарушени

						сенсорных функций и ины нарушения
15.1.2.3					Нарушения психических, языковых и речевых, сенсорных, нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций, функций пищеварительной, дыхательной систем, нарушения мочевыделительной функции; МКФ: B 110 - 199, B 310 - 399, B 210 - 299, B 710 - 79, B 510 - 539, B 540 - 550, B 610 - 639	Для детей в возрасте 0 - 1 лет: энцефаломенингоцеле посл частичной оперативно коррекции при наличи осложнений, выраженны нарушений функци организма: 0 - 3 года - выраженно отставание в физическом психомоторном, речево развитии, формировани социальных навыков; старш 3 лет - выраженны когнитивные нарушения выраженное снижени интеллекта (3 - 17 лет: IQ= 3 - 49 баллов); выраженны пароксизмальные расстройства, резистентные терапии; выраженны псевдобульбарный синдром выраженные нарушени устной и/или письменно речи; нарушение контрол функции тазовых органов
15.1.2.4					Нарушения психических, языковых и речевых,	Для детей в возрасте 0 - 1 лет:

					сенсорных функций, нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций; функций пищеварительной системы, дыхательной системы, нарушения мочевыделительной функции; МКФ: B 110 - 199, B 310 - 399, B 210 - 299, B 710 - 799, B 510 - 539; B 540 - 550, B 610 - 639	энцефалоцистоменингоцеле больших размеров, н подлежащая радикально оперативной коррекции; значительно выраженны нарушения функци организма: 0 - 3 года - значительн выраженное отставание физическом, психомоторном речевом развитии; отсутстви формирования социальны навыков; дети старше 3 лет значительно выраженно снижение интеллекта (IQ = 3 балла для всех возрастов) значительно выраженны псевдобульбарный синдром значительно выраженны речевые нарушени (возможно примитивно общение при помощи звуков жестов либо устная реч отсутствует), значительн выраженные двигательны нарушения (тетра-, геми- парапарезы или плегии сочетании с гиперкинезами атаксией), синдром эпилептических энцефалопатий (синдром Веста, Айкарди, Отахара

						Леннокса-Гасто и прочие резистентные противосудорожной терапии нарушения сенсорны функций и иные нарушения Отсутствие контроля функци тазовых органов
15.1.3			Микроцефалия Другие врожденные аномалии (пороки развития) мозга	Q02 Q04		
15.1.3.1					Нарушения психических, языковых и речевых, сенсорных, нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций, функций пищеварительной системы, мочевыделительной функции; МКФ: B 110 - 199, B 310 - 399, B 210 - 299, B 710 - 799, B 510 - 539, B 610 - 639	Для детей в возрасте 0 - 1 лет: Незначительные нарушени функций организма: 0 - 3 года - незначительно отставание в физическом психомоторном, речево развитии, в темпа формирования социальны навыков; дети старше 3 лет незначительное снижени интеллекта (3 - 15 лет: IQ = 7 - 79 баллов; 16 - 17 лет: IQ 65 - 69 баллов); наличи незначительных когнитивны нарушений, нарушени устной и/или письменно речи, редки

						пароксизмальных расстройств, незначительны нарушений сенсорны функций (зрения и/или слуха)
15.1.3.2					Нарушения психических, языковых и речевых, сенсорных, нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций, функций пищеварительной системы, мочевыделительной функции; МКФ: B 110 - 199, B 310 - 399, B 210 - 299, B 710 - 799, B 510 - 539, B 610 - 639	Для детей в возрасте 0 - 1 лет: умеренные нарушени функций организма: 0 - 3 года - умеренно отставание в физическом психомоторном, речево развитии, в формировани социальных навыков; старш 3 лет - умеренны когнитивные нарушения умеренное снижени интеллекта (3 - 15 лет: IQ = 5 - 69 баллов; 16 - 17 лет: IQ 50 - 64 баллов); умеренны нарушения устной и/ил письменной речи пароксизмальные расстройства средне частоты; умеренны нарушения сенсорны функций
15.1.3.3					Нарушения психических, языковых и речевых, сенсорных, нейромышечных, скелетных	Для детей в возрасте 0 - 1 лет: выраженные нарушени функций организма:

					и связанных с движением (статодинамических) функций, функций пищеварительной системы, мочевыделительной функции; МКФ: B 110 - 199, B 310 - 399, B 210 - 299, B 710 - 799, B 510 - 539, B 610 - 639	0 - 3 года - выраженно отставание физическог психомоторного, речевог развития, формировани социальных навыков; старше 3 лет - выраженно снижение интеллекта (IQ = 3 - 49 баллов); выраженны когнитивные нарушения выраженные нарушени устной и/или письменно речи; часты пароксизмальные расстройства; выраженны нарушения сенсорны функций; нарушение контрол функции тазовых органов
15.1.3.4					Нарушения психических, языковых и речевых, сенсорных, нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций, функций пищеварительной системы, мочевыделительной функции; МКФ: B 110 - 199, B 310 - 399, B 210 - 299, B 710 - 799, B 510 - 539, B 610 - 639	Для детей в возрасте 0 - 1 лет: значительно выраженны нарушения функци организма: 0 - 3 года - значительн выраженное отставани физического, психомоторног речевого развития; отсутстви формирования социальны навыков; старше 3 лет значительно выраженно снижение интеллекта (IQ < 3 баллов); значительн

						выраженные речевы нарушения (возможн примитивное общение пр помощи звуков, жестов либ устная речь отсутствует) синдромы эпилептически энцефалопатий (синдром Веста, Айкарди, Отахара Леннокса-Гасто и прочи синдромы); резистентные противосудорожной терапии нарушения сенсорны функций. Отсутстви контроля функции тазовы органов
15.1.4			Врожденная гидроцефалия	Q03		
15.1.4.1					Нарушения психических, языковых и речевых, сенсорных, нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций; МКФ: B 110 - 199, B 310 - 399, B 210 - 299, B 710 - 799	Для детей в возрасте 0 - 1 лет: удовлетворительные результаты проведени радикальной эндоскопическо коррекции гидроцефали (компенсация ил субкомпенсация); компенсированная гидроцефалия в перио динамического наблюдени без необходимост оперативного лечени

						(отсутствие ликвородинамических нарушений). Отсутствие нарушений ил незначительные нарушени функций организма: 0 - 3 года - незначительно отставание физическог психомоторного, речевог развития, формировани социальных навыков; старш 3 лет - незначительно снижение когнитивны процессов, незначительно снижение интеллекта (3 - 1 лет: IQ = 70 - 79 баллов; 16 17 лет: IQ = 65 - 69 баллов) незначительные нарушени устной и/или письменно речи; незначительны нарушения сенсорных статодинамических функций
15.1.4.2					Нарушения психических, языковых и речевых, сенсорных, нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций; МКФ: B 110 - 199, B 310 - 399, B 210 - 299, B 710 - 799	Для детей в возрасте 0 - 1 лет: прогрессирующий рос окружности головы несмотр на проводимо консервативное лечение неэффективность эндоскопической коррекци гидроцефалии; установк

						имплантируемой клапанно-дренажной системы (шунтозависимая гидроцефалия) с наличием умеренного гипертензионно-гидроцефального синдрома ликвородинамическими кризами средней частоты; умеренными нарушениями функций организма: 0 - 3 года: умеренное отставание в физическом, психомоторном, речевом развитии, формировании социальных навыков; старше 3 лет - умеренное снижение когнитивных процессов, умеренное снижение интеллекта (3 - 15 лет: IQ = 50 - 69 баллов; 16 - 17 лет: IQ = 50 - 64 баллов); умеренные нарушения устной и/или письменной речи, двигательные нарушения (легкий тетрапарез, умеренные геми-, парапарезы, умеренная динамическая атаксия), нарушения сенсорных функций
15.1.4.3					Нарушения психических,	Для детей в возрасте 0 - 1

					языковых и речевых, сенсорных, нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций, функций пищеварительной системы, мочевыделительной функции; МКФ: B 110 - 199, B 310 - 399, B 210 - 299, B 710 - 799, B 510 - 539, B 610 - 639	лет: прогрессирующий рос окружности головы динамике; нарастани неврологической симптоматики (активна гидроцефалия); неэффективность оперативного лечения дисфункция шунта посл вентрикулоперитонеального шунтирования (1 раз и более год) с частым ликвородинамическими кризами; повторно шунтирование. Выраженные нарушени функций организма: 0 - 3 года - выраженно отставание в физическом психомоторном, речево развитии, формировани социальных навыков; старш 3 лет - выраженное снижени когнитивных процессов выраженное снижени интеллекта (3 - 15 лет: IQ = 5 - 69 баллов; 16 - 17 лет: IQ = 50 - 64 баллов); выраженны нарушения устной и/ил письменной речи двигательные нарушени

						(умеренный тетрапарез выраженные пара- гемипарезы); часты пароксизмальные расстройства; нарушени сенсорных функций. Нарушение контроля функци тазовых органов
15.1.4.4					Нарушения психических, языковых и речевых, сенсорных, нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций, функций пищеварительной системы, мочевыделительной функции; МКФ: B 110 - 199, B 310 - 399, B 210 - 299, B 710 - 799, B 510 - 539, B 610 - 639	Для детей в возрасте 0 - 1 лет: высокий тем прогрессирования гидроцефалии несмотря н проводимое лечение с значительно выраженным нарушениями функци организма: 0 - 3 года - значительн выраженное отставани физического, психомоторного речевого развития, отсутстви формирования социальны навыков; старше 3 лет значительно выраженно снижение интеллекта (IQ < 3 баллов), значительн выраженные речевы нарушения (возможн примитивное общение пр помощи звуков, жестов либ устная речь отсутствует

						наличие синдромо эпилептических энцефалопатий (синдром Веста, Айкарди, Отахара Леннокса-Гасто и прочи синдромы), резистентные противосудорожной терапии двигательные нарушени (параличи, парезы до плегии атаксия); нарушени сенсорных функций (слепота глухота). Отсутствие контроля функци тазовых органов
15.1.5			Spina bifida (неполное закрытие позвоночного канала) (истинные спинномозговые грыжи: открытое расщепление позвоночника с формированием кистозной спинномозговой грыжи Spina bifida cysticauverta (менингоцеле); корешковая форма спинномозговой грыжи (менингорадикулоцеле); мозговая форма (менингомиелоцеле или	Q05		

			менингомиелорадикулоцеле) Гипоплазия и дисплазия спинного мозга	Q06.1		
15.1.5.1					Нарушения нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций; МКФ: B 710 - 789, B 798, B 799	Для детей в возрасте 0 - 1 лет: расщепление позвоночника (- 3 позвонков) формированием спинномозговой грыжи бе элементов нервной ткани грыжевом мешк (менингоцеле), с элементам корешков спинного мозг менингорадикулоцеле) отсутствием или минимальной неврологической симптоматикой, незначительными нарушениями статодинамических функций с благоприятным прогнозо при своевременно оперативной коррекции
15.1.5.2					Нарушения нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических)	Для детей в возрасте 0 - 1 лет: расщепление позвоночника (- 5 позвонков)

					функций, сенсорных функций, мочевыделительной функции; МКФ: B 710 - 799, B 210 - 299, B 610 - 639	формированием менингорадикулоцеле умеренной неврологическо симптоматикой, умеренным нарушениями статодинамических функций возможны нарушени сенсорных функци (снижение остроты зрени и/или слуха оценивается зависимости от степен выраженности); нарушени контроля функции тазовы органов
15.1.5.3					Нарушения психических, языковых и речевых; нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций, сенсорных функций, мочевыделительной функции; МКФ: B 110 - 199, B 310 - 399, B 710 - 799, B 210 - 299, B 610 - 639	Для детей в возрасте 0 - 1 лет: расщепление позвоночника н любом протяжении вовлечением спинного мозг и/или его элементо (менингомиелоцеле, мелоцистоцеле) с выраженно неврологической симптоматикой, нарушениями сенсорны функций (снижение остроти зрения и/или и слуха), нарушением контрол функции тазовых органов, формированием различны деформаций нижни

						конечностей, приводящих выраженным нарушения статодинамических функций. Любой вариан спинномозговой грыжи сочетающийся с порокам развития головного ил спинного мозга на другом уровне с выраженным нарушениями функци организма
15.1.5.4					Нарушения психических, языковых и речевых, нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций, сенсорных функций, мочевыделительной функции; МКФ: B 110 - 199, B 310 - 399, B 710 - 799, B 210 - 299, B 610 - 639	Для детей в возрасте 0 - 1 лет: расщепление позвоночника н любом протяжении вовлечением в порок развити спинного мозга и/или ег элементов (менингомиелоцеле, миелоцистоцеле) с значительно выраженно неврологической симптоматикой (нижня параплегия, значительн выраженный нижни парапарез), с отсутствие контроля функции тазовы органов, с формирование различных деформаци нижних конечносте приводящих к значительн

						выраженным нарушения статодинамических функций. Любой вариан спинномозговой грыжи сочетающийся с порокам развития головного ил спинного мозга на любо уровне со значительн выраженными нарушениям функций организма
15.2		Врожденные аномалии (пороки развития) системы кровообращения		Q20 - Q28		
15.2.1			Врожденные аномалии (пороки развития) сердечных камер и соединений, сердечной перегородки, легочного, трехстворчатого, аортального и митрального клапанов. Другие врожденные аномалии (пороки развития) сердца	Q20 - Q24		
15.2.1.1					Нарушение функций сердечно-сосудистой системы; МКФ: B 410 - 429	Для детей в возрасте 0 - 1 лет: пороки сердца и крупны сосудов до проведени

						оперативного лечения и посл радикального оперативног устранения порока, н приводящие недостаточности кровообращения или незначительными нарушениями функци сердечно-сосудистой системы: наличие ХСН 0 или стадии, ФК I; без нарушени либо с незначительным нарушениями сердечног ритма и проводимости гемодинамически н значимыми
15.2.1.2					Нарушения функций сердечно-сосудистой, дыхательной системы, мочевыделительной функции, психических, сенсорных функций; МКФ: B 410 - 429, B 440 - 450, B 610 - 639, B 110 - 199, B 210 - 299	Для детей в возрасте 0 - 1 лет: пороки сердца и крупны сосудов до проведени оперативного лечения и посл радикального оперативног устранения порока умеренными нарушениям гемодинамики и функци сердечно-сосудистой системы: ХСН IIA стадии, ФК (подтвержденные клинико-лабораторными данными и данным

						инструментальных методо обследования); умеренные нарушени сердечного ритма проводимости: желудочковые экстрасистол (представленность эктопического ритма от 10 д 20% за сутки по данны суточного ЭК мониторирования) ил наджелудочковые экстрасистолы наджелудочковые тахикарди (представленность эктопического ритма от 20 д 30% за сутки по данны суточного ЭК мониторирования), атриовентрикулярная ил синоатриальная блокада степени, требующи постоянной медикаментозно коррекции. Наличие осложнени (рестеноз, дисфункци клапана, реканализаци дефекта, инфекционны эндокардит) посл оперативной коррекци порока и/или наличи отягощающей сопутствующе

						патологии с умеренным нарушениями функци организма. Необходимость в повторно хирургическом вмешательстве, в том числе использованием протезны материалов. Сложные пороки на перио проведения этапног хирургического лечения ил паллиативного лечения
15.2.1.3					Нарушения функций сердечно-сосудистой, дыхательной системы, мочевыделительной функции, психических, сенсорных функций; МКФ: B 410 - 429, B 440 - 450, B 610 - 639, B 110 - 199, B 210 - 299	Для детей в возрасте 0 - 1 лет: пороки сердца и крупны сосудов до проведени оперативного лечения и посл радикального оперативног устранения порока выраженными нарушениям гемодинамики и функци сердечно-сосудистой системы: ХСН IIБ, ФК III, выраженны нарушения сердечного ритм и проводимости - трепетани и мерцание предсердий частые желудочковы экстрасистолы (представленность эктопического ритма боле

						20% за сутки по данны суточного ЭК мониторирования) ил наджелудочковые экстрасистолы и залп наджелудочковой тахикарди (представленность эктопического ритма боле 30% за сутки по данны суточного ЭК мониторирования) атриовентрикулярная блокад 3 степени; наличие осложнений посл оперативной коррекци порока и/или наличи отягощающей сопутствующе патологии с выраженным нарушениями функци организма. Неудовлетворительный результат оперативног лечения сложных пороко необходимость повторны оперативных вмешательств, том числе с использование протезных материалов
15.2.1.4					Нарушение функций сердечно-сосудистой, дыхательной системы, мочевыделительной	Для детей в возрасте 0 - 1 лет: пороки сердца и крупны сосудов до проведени

					функции, психических, сенсорных функций; МКФ: B 410 - 429, B 440 - 450, B 610 - 639, B 110 - 199, B 210 - 299	оперативного лечения и посл радикального оперативног устранения порока с значительно выраженным нарушениями гемодинамики функций сердечно-сосудисто системы: ХСН III стадии, ФК IV Наличие осложнений посл оперативной коррекци порока и/или наличи отягощающей сопутствующе патологии со значительн выраженными нарушениям функций организма. Возможность проведени только паллиативны операций при сложны сочетанных пороках; неоперабельные порок сердца и крупных сосудов
15.2.2			Врожденные аномалии (пороки развития) крупных артерий Врожденные аномалии (пороки развития) крупных вен Другие врожденные аномалии (пороки	Q25 Q26 Q27		

			развития) системы периферических сосудов Другие врожденные аномалии (пороки развития) системы кровообращения	Q28		

Примечание к подпункту 15.2.2.
Количественная оценка стойких нарушений функций организма ребенка в возрасте до 18 лет при ангиодисплазиях проводится с учетом (мальформации капиллярные, артериальные, венозные, артериовенозные, лимфатические и различные их сочетания), локализации и распространенн (конечности, легкие, головной и спинной мозг, множественные), степени выраженности хронической недостаточности кровообращения сегменте(ах) или органе(ах), выраженности трофических изменений кожи, мягких тканей и других изменений в пораженных органах, эффективност лечения и наличия осложнений, наличия и степени выраженности вторичных деформаций опорно-двигательного аппарата.
В зависимости от этого выделяют состояния: компенсации (увеличение объема и длины конечности без ее деформации и без трофических нарушен нарушений центральной гемодинамики, наличие эффективного коллатерального кровообращения); субкомпенсации (увеличение объема, длины деформация, трофические нарушения кожи без изъязвления, начальные признаки перегрузки правого желудочка, НК 0 или НК I, коллатеральное кр малоэффективно); декомпенсация (увеличение объема конечности на 5 - 6 см и более, длины конечности на 7 - 8 см и более по сравнени конечностью, деформация конечности, трофические нарушения кожи в виде эрозии, трофических язв, НК I или II, отсутствие коллатерального крово

15.2.2.1					Нарушение функций сердечно-сосудистой системы; нарушения нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций; МКФ: B 410 - 429, B 710 - 799	Для детей в возрасте 0 - 1 лет: локальные ил распространенные форм ангиодисплазий в фаз компенсации кровообращени (ХАН 0 или 1 степени, ХВН или 1 степени); 0 - 6 лет: увеличение объем конечности на 1,0 - 1,5 см бе ее деформации, увеличени длины конечности на 2,0 - 2,

						см, компенсируемо ортопедической стелькой ил коском. 7 - 17 лет: увеличение объем и длины конечности до 4,0 с без ее деформации компенсируемое ортопедической стелькой ил коском. Начальные признак вторичных изменений позвоночнике. Незначительное ограничени объема движений в суставах конечности(ей)
15.2.2.2					Нарушение психических функций, функций сердечно-сосудистой системы, дыхательной системы, нарушения нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций; МКФ: B 110 - 199, B 410 - 429, B 440 - 450, B 710 - 799	Для детей в возрасте 0 - 1 лет: локальные ил распространенные форм ангиодисплазий в стади субкомпенсации кровообращения (ХАН степени, ХВН 2 степени); преимущественная локализация на активны поверхностях конечносте (ладони и стопы); 0 - 6 лет: увеличение объем конечности до 2,0 - 4,0 см увеличение длины конечност на 3,0 - 4,0 см

						компенсируемое сложно ортопедической обувью. 7 - 17 лет: увеличение объем конечности на 5,0 см и более увеличение длины конечност на 5,0 см и более компенсируемое сложно ортопедической обувью. Статический сколиоз 2 или степени, умеренно ограничение объем движений в сустава конечности(ей), признак неврологических осложнени (нейропатии), наличи болевого синдрома. Наличие неврологическо симптоматики и умеренны нарушения функци организма при локализаци соустий в головном ил спинном мозге
15.2.2.3					Нарушение психических функций, функций сердечно-сосудистой системы, дыхательной системы, нарушения нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций;	Для детей в возрасте 0 - 1 лет: декомпенсация кровообращения пораженной конечности(ях со стойким болевы синдромом, с глубоким трофическими нарушениям (длительно незаживающи

					МКФ: B 110 - 199, B 410 - 429, B 440 - 450, B 710 - 799	язвы) кровотечениям различной интенсивности; с тяжелыми деформациям конечности, локализаци соустий на открытых частя тела после лечения вторичные изменения суставах и позвоночник (контрактуры, сколиозы дегенеративно-дистрофическ е изменения) неврологические осложнени (тяжелые нейропатии) Выраженные нарушени функций организма пр локализации соустий головном или спинном мозге сердце и легких и пр различных их сочетаниях
15.2.2.4					Нарушение психических функций, функций сердечно-сосудистой системы, дыхательной системы, нарушения нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций; МКФ: B 110 - 199, B 410 - 429, B 440 - 450, B 710 - 799	Для детей в возрасте 0 - 1 лет: декомпенсация кровообращения: обширно поражение сосудисто системы, неустранимы тяжелые трофически нарушения, тяжелы осложнения в виде нарушени мозгового кровообращения кровообращения в спинно мозге с развитием параличей

						отсутствием контрол функции тазовых органов
15.3		Врожденные аномалии (пороки развития) органов дыхания		Q30 - Q34		
15.3.1					Нарушение функций дыхательной, сердечно-сосудистой систем, психических функций, функций системы крови и иммунной системы, эндокринной системы и метаболизма; МКФ: B 110 - 199, B 410 - 429, B 440 - 449, B 430 - 439, B 540 - 559	Для детей в возрасте 0 - 1 лет: редкие обострени воспалительных бронхолегочных заболевани (2 - 3 раза в год продолжительностью пределах 3 недель), бе дыхательной недостаточност (ДН 0) либо наличие ДН степени
15.3.2					Нарушение функций дыхательной, сердечно-сосудистой систем, психических функций, функций системы крови и иммунной системы, эндокринной системы и метаболизма; МКФ: B 110 - 199, B 410 - 429, B 440 - 449, B 430 - 439, B 540 - 559	Для детей в возрасте 0 - 1 лет: умеренные нарушени функции дыхательно системы: обострени воспалительных бронхолегочных заболевани 4 - 6 раз в год продолжительностью от 3 до недель; необходимость многоэтапных оперативны коррекциях, осложнени

						хирургических вмешательств наличие ДН II степени преходящей или постоянно легочной гипертензии (ХСН или ХСН 1 стадии)
15.3.3					Нарушение функций дыхательной, сердечно-сосудистой систем, психических функций, функций системы крови и иммунной системы, эндокринной системы и метаболизма; МКФ: B 110 - 199, B 410 - 429, B 440 - 449, B 430 - 439, B 540 - 559	Для детей в возрасте 0 - 1 лет: выраженные нарушени функции дыхательно системы: обострени воспалительных бронхолегочных заболевани 4 - 6 раз в год продолжительностью от 3 до недель; наличие осложнени (стенозы, свищи дыхательно системы), приводящие необходимости дальнейши хирургических вмешательств наличие ДН II, III степени ХСН II А стадии
15.3.4					Нарушение функций дыхательной, сердечно-сосудистой систем, психических функций, функций системы крови и иммунной системы, эндокринной системы и метаболизма; МКФ: B 110 - 199, B 410 -	Для детей в возрасте 0 - 1 лет: значительно выраженны нарушения функци дыхательной систем обострения воспалительны бронхолегочных заболевани более 6 раз в год продолжительностью более

					429, B 440 - 449, B 430 - 439, B 540 - 559	недель; последствия осложнения оперативны вмешательств, наличие ДН II степени в сочетании с ХСН I Б или III стадии
15.4		Расщелина губы и неба		Q35 - 37		

Примечание к подпункту 15.4.
Количественная оценка нарушений функций организма ребенка в возрасте до 18 лет при челюстно-лицевых аномалиях основывается на оце распространенности порока, возможности использования ортеза и адаптации к нему, длительности и эффективности реконструктивного операти (восстановление анатомической целостности и взаимоотношений структур артикуляционного аппарата на этапах оперативного лечения и п последнего), на оценке нарушений функции пищеварительной системы (оценка параметров физического развития и их возрастная динами нарушений артикуляционной моторики (степень ограничения ее при сосании, глотании, жевании, выполнении артикуляционных движений выраженности речевых синдромов при их наличии (ринолалия, ринофония, дислалия), а также на оценке функции других сопряженных орган функции, функции носового дыхания).
Степень выраженности речевых синдромов (ринолалия, ринофония, дислалия, синдромы письменной речи) оценивается по заключению логопеда организации (уровень/степень общего или системного недоразвития речи). Принципы количественной оценки нарушений языковых и рече указанных в подпункте 5.1.1. настоящей количественной системы оценки.

15.4.1			Расщелина неба Расщелина губы Расщелина неба и губы	Q35 Q36 Q37		
15.4.1.1					Нарушения функций пищеварительной системы, языковых и речевых функций; МКФ: B 510 - 539, B 310 - 399	Для детей в возрасте 0 - 1 лет: расщелина мягкого неба мягкого и частично (задня треть) твердого неба изолированная расщелин

						верхней губы; расщелин мягкого и твердого неба пр использовании ортеза адаптации к нему незначительное нарушени функций сосания, глотания жевания; параметры физического развити соответствуют возрасту ил незначительно снижены Незначительные нарушени языковых и речевых функций
15.4.1.2					Нарушения функций пищеварительной системы, языковых и речевых функций; МКФ: B 510 - 539, B 310 - 399	Для детей в возрасте 0 - 1 лет: полная расщелина твердого мягкого неба, верхней губы (одно- и двусторонняя) н период реконструктивного оперативного лечения неудовлетворительный результат оперативного лечения (грубые деформации послеоперационные изъяны твердого неба, выраженны челюстной дисбаланс) требующие повторны оперативных вмешательст и/или длительного аппаратного ортодонтического лечения умеренное нарушени

						функций сосания, глотания жевания; умеренное снижени параметров физическог развития. Умеренны нарушения языковых речевых функций
15.4.1.3					Нарушения функций пищеварительной системы, языковых и речевых функций; МКФ: B 510 - 539, B 310 - 399	Для детей в возрасте 0 - 1 лет: сложные врожденные порок развития челюстно-лицево области в сочетании другими аномалиям развития, с выраженным нарушениями функци организма; нарушение акта жевания возможностью приема тольк протертой пищи, выраженно снижение параметро физического развития Выраженные нарушени языковых и речевых функций
15.5		Другие врожденные аномалии (пороки развития) органов пищеварения		Q38 - Q45		
Примечание к подпункту 15.5. Количественная оценка степени выраженности нарушений функций пищеварительной системы ребенка в возрасте до 18 лет при врожденных анома						

развития) желудочно-кишечного тракта зависит от вида и локализации порока, объема и характера оперативного лечения (необходимость нало резекции и прочее) объема и видов мероприятий по реабилитации (необходимость бужирования, его частота и эффективность), степени не анального сфинктера, наличия осложнений (в том числе осложнений оперативного лечения, необходимость повторных реконструктивных опера заболевания (рестеноз - компенсированный субкомпенсированный, декомпенсированный), поражения других органов (характер, тяжесть), уровн развития ребенка.						
15.5.1			Атрезия пищевода без свища Атрезия пищевода с трахеально-пищеводным свищом Врожденный стеноз и стриктура пищевода Дивертикул пищевода Другие врожденные аномалии пищевода	Q39.0 Q39.1 Q39.3 Q39.6 Q39.8		
15.5.1.1.					Нарушения функций пищеварительной, эндокринной систем и метаболизма; МКФ: B 510 - 539, B 540 - 559	Для детей в возрасте 0 - 1 лет: после проведенног одноэтапного оперативног вмешательства с наложение прямого анастомоза. Посл завершения всех этапо оперативного лечения пр отсутствии затруднени приема пищи или незначительными нарушениями функци

						пищеварительной системы. Необходимость планового бужирования (3 и менее раз год)
15.5.1.2					Нарушения функций пищеварительной системы, дыхательной системы, эндокринной системы и метаболизма; МКФ: B 510 - 539, B 440 - 449, B 540 - 559	Для детей в возрасте 0 - 1 лет: на весь период этапного хирургического реконструктивного лечения. По завершении всех этапо оперативного лечения пр наличии умеренны нарушений функци пищеварительной системы дисфагия с возможностью приема только протертой жидкой пищи; необходимость плановог бужирования (более 3 раз год). Наличие осложнений, том числе осложнени оперативного лечения, умеренными нарушениям функций организма
15.5.1.3					Нарушения функций пищеварительной, дыхательной, эндокринной систем и метаболизма; МКФ: B 510 - 539, B 440 - 449, B 540 - 559	Для детей в возрасте 0 - 1 лет: после проведения первог этапа оперативного лечени (наложение гастростомы) н весь последующий перио

						лечения, включа восстановление анатомической целостност пищевода и ег проходимости; после завершени оперативного лечени (пластики пищевода) пр наличии выраженны нарушений функци пищеварительной системы Наличие осложнений, в то числе осложнени оперативного лечения, выраженными нарушениям функций организма. Рестеноз пищевода. Необходимость повторны оперативных вмешательств
15.5.2			Другие уточненные пороки развития желудка: врожденный кардиоспазм, смещение желудка, дивертикул желудка, желудок в виде песочных часов; удвоение желудка; мегалогастрия; микрогастрия Врожденное отсутствие,	Q40.2 Q41.0 -		

			атрезия и стеноз двенадцатиперстной кишки, тощей кишки, подвздошной кишки Врожденное отсутствие, атрезия и стеноз других уточненных частей тонкого кишечника	Q41.2 Q41.8		
15.5.2.1					Нарушение функций пищеварительной системы; МКФ: B 510 - 539	Для детей в возрасте 0 - 1 лет: после проведенног оперативного вмешательства случаях небольшо протяженности участк резекции кишечника пр физиологических параметра физического развития ил незначительных нарушения функции пищеварительно системы
15.5.2.2					Нарушение функций пищеварительной системы; МКФ: B 510 - 539	Для детей в возрасте 0 - 1 лет: после проведенног оперативного вмешательств при наличии осложнени (синдром короткой кишки) умеренными нарушениям функции пищеварительно системы

15.5.2.3					Нарушение функций пищеварительной системы; МКФ: B 510 - 539	Для детей в возрасте 0 - 1 лет: после проведенног оперативного вмешательств при наличии осложнени (синдром короткой кишки) выраженными нарушениям функции пищеварительно системы. Необходимость повторны оперативных вмешательств наличие стомы
15.5.3			Врожденное отсутствие, атрезия и стеноз прямой кишки со свищем Врожденное отсутствие, атрезия и стеноз прямой кишки без свища (заращение прямой кишки) Врожденное отсутствие, атрезия и стеноз заднего прохода со свищем	Q42.0 Q42.1 Q42.2		

Примечание к подпункту 15.5.3.
Количественная оценка нарушений функций пищеварительной системы организма при врожденных пороках развития прямой кишки и ануса зави порока объема и характера оперативного лечения (необходимость наложения стомы, функционирование стомы), эффективности мероприятий по (нарушение эвакуаторной функции различной степени, объективизированного в условиях стационара), степени недостаточности анально (объективизированной в условиях стационара), наличия осложнений (в том числе осложнений оперативного лечения, необходимос реконструктивных операций); от поражения сопряженных органов (характер, тяжесть), уровня физического развития ребенка

15.5.3.1					Нарушение функций пищеварительной системы; МКФ: B 510 - 539	Для детей в возрасте 0 - 1 лет: после проведенног реконструктивного оперативного лечения восстановлением анатомических структу аноректальной области: I степень недостаточност функции запирательног аппарата прямой кишки; Отсутствие осложнений показаний к повторном оперативному лечению
15.5.3.2					Нарушение функций пищеварительной системы; МКФ: B 510 - 539	Для детей в возрасте 0 - 1 лет: при сложных пороках - н весь период этапног оперативного лечения последующей реабилитации. По завершении лечения - пр наличии II степен недостаточности функци запирательного аппарат прямой кишки
15.5.3.3					Нарушение функций пищеварительной системы; МКФ: B 510 - 539	Для детей в возрасте 0 - 1 лет: с момента диагностик врожденной клоаки на вес период лечения; посл

						завершения лечения нарушение контроля функци тазовых органов. По завершении этапо оперативного лечения други пороков - при наличии II степени недостаточност функции запирательног аппарата прямой кишки
15.5.4			Болезнь Гиршпрунга (аганглиоз, врожденный (аганглиозный мегаколон)	Q43.1		
15.5.4.1					Нарушение функций пищеварительной системы; МКФ: B 510 - 539	Для детей в возрасте 0 - 1 лет: после завершени оперативного лечения восстановление пассажа п толстой кишке; хронический запор самостоятельный стул на фон диеты или эффективног консервативного лечени (объективизированного условиях стационара); I степень недостаточност анального сфинктер (объективизированная условиях стационара) отсутствие осложнений

15.5.4.2					Нарушение функций пищеварительной системы; МКФ: B 510 - 539	Для детей в возрасте 0 - 1 лет: при многоэтапно оперативном лечении (на вес период лечения). Посл завершения этапног оперативного лечения отсутствие самостоятельног стула на фоне диетотерапии консервативного лечени (объективизированное условиях стационара). II степень недостаточност анального сфинктер (объективизированная условиях стационара)
15.5.4.3					Нарушение функций пищеварительной системы МКФ: B 510 - 539	Для детей в возрасте 0 - 1 лет: после завершени хирургического лечения отсутствие самостоятельног стула, формировани копролитов, признак хронической интоксикации анемии (объективизированны в условиях стационара) III степень недостаточност анального сфинктера. Энкопрез. Необходимость повторны оперативных вмешательств

15.6			Врожденные аномалии (пороки развития) желчного пузыря, желчных протоков и печени Синдром Алажилля	Q44 Q44.7		
Примечание к подпункту 15.6. Количественная оценка нарушений функций организма ребенка в возрасте до 18 лет при врожденных пороках внутрипеченочных желчных прото вида порока (атрезия, гипоплазия, удвоение, дивертикулы, эктопии протоков) и степени выраженности, варианта течения заболевания (легкое выраженности симптомов холестаза, механической желтухи, гепатомегалии, симптомов портальной гипертензии, геморрагическо желудочно-кишечных кровотечений и других синдромов, степени выраженности необратимых морфологических (структурных) изменений в пе цирроз), степени нарушений функций других органов и систем организма эффективности лечения.						
15.6.1					Нарушения функций пищеварительной, сердечно-сосудистой системы, нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций, психических, сенсорных функций, мочевыделительной функции; МКФ: B 510 - 539, B 410 - 429, B 710 - 799, B 110 - 199, B 210 - 299, B 610 - 639	Для детей в возрасте 0 - 1 лет: при прогредиентном течени заболевания с умеренным нарушениями функци организма
15.6.2					Нарушения функций пищеварительной, сердечно-сосудистой	Для детей в возрасте 0 - 1 лет: при прогредиентном течени

					системы, нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций, психических, сенсорных функций, мочевыделительной функции; МКФ: B 510 - 539, B 410 - 429, B 710 - 799, B 110 - 199, B 210 - 299, B 610 - 639	заболевания с выраженным нарушениями функци организма
15.6.3					Нарушения функций пищеварительной, сердечно-сосудистой системы, нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций, психических, сенсорных функций, мочевыделительной функции; МКФ: B 510 - 539, B 410 - 429, B 710 - 799, B 110 - 199, B 210 - 299, B 610 - 639	Для детей в возрасте 0 - 1 лет: при прогредиентном течени заболевания со значительн выраженными нарушениям функций организма
15.7		Врожденные аномалии и пороки развития мочевой системы		Q60 - Q64		

Примечание к подпункту 15.7.
Клинико-функциональная характеристика и количественная оценка агенезии и других редукционных дефектов почки, кистозной болезни п врожденных нарушений проходимости почечной лоханки и врожденных аномалий мочеточник, указанных в подпунктах 14.4 и 14.6 настоящей к системы оценки.

15.7.1			Экстрофия мочевого пузыря, частичная или тотальная эписпадия	Q64.1		
15.7.1.1					Нарушение мочевыделительной функции; МКФ: B 610 - 639	Для детей в возрасте 0 - 1 лет: частичная эписпадия - посл проведения оперативног лечения при отсутствии ил незначительных нарушения мочевыделительной функции
15.7.1.2					Нарушение мочевыделительной функции; МКФ: B 610 - 639	Для детей в возрасте 0 - 1 лет: экстрофия мочевого пузыря (тотальной эписпадией или бе нее) после завершени реконструктивного хирургического лечения пр умеренных нарушения мочевыделительной функции
15.7.1.3					Нарушение мочевыделительной функции; МКФ: B 610 - 639	Для детей в возрасте 0 - 1 лет: экстрофия мочевого пузыря (тотальной эписпадией и бе нее) после завершени реконструктивного

						хирургического лечения развитием осложнений выраженными нарушениям мочевыделительной функции
15.8		Врожденные аномалии (пороки развития) и деформации костно-мышечной системы		Q65 - Q79		
15.8.1			Врожденный вывих бедра односторонний Врожденный вывих бедра двусторонний Врожденный подвывих бедра односторонний Врожденный подвывих бедра двухсторонний	Q65.0 Q65.1 Q65.3 Q65.4		
Примечание к подпункту 15.8.1 Количественная оценка степени выраженности нарушений статодинамических функций у детей с врожденными аномалиями развития тазобедр зависит от формы аномалии (врожденный вывих бедра, врожденный подвывих бедра, дисплазия: одно- или двухстороннее поражение), степени морфологических и структурных изменений в суставе (по результатам УЗИ и Rg-исследования), своевременности диагностики, длительно эффективности лечения, наличия осложнений, возникающих в период лечения (аваскулярный некроз головки бедра), наличия рецид компенсаторных механизмов опорно-двигательной системы, наличия и характера сопутствующей патологии.						
15.8.1.1					Нарушение нейромышечных, скелетных	Для детей в возрасте 0 - года:

					и связанных с движением (статодинамических) функций; МКФ: B 710 - 789, B 798, B 799	при своевременно диагностике и адекватно лечении: на весь перио лечения (при односторонне вывихе, одно- двухстороннем подвывихе дисплазии тазобедренны суставов) и при сохранени достигнутого результат (вправление вывиха ил подвывиха). Для детей в возрасте 4 - 1 лет: при эффективно оперативном лечении вывих бедра (одно- двухстороннего); полное восстановлени опороспособности конечности(ей); пр сохранной структур сустава(ов); отсутствии ил незначительном ограничени объема движений тазобедренном(ых) суставе(ах)
15.8.1.2					Нарушение нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций;	Для детей в возрасте 0 - года: при наличии осложнений н фоне проводимого лечения рецидив патологии посл

					МКФ: B 710 - 789, B 798, B 799	начала самостоятельно ходьбы; Для детей в возрасте 4 - 1 лет: при поздней диагностик врожденного вывиха бедра н весь период лечения; наличи осложнений на фон проводимого лечения (кром аваскулярного некроз головки бедренной кости) наличие вторичны изменений в суставах нижни конечностей, позвоночник (артроз, остеохондроз спондилоартроз) с умеренны нарушением их функции рецидив вывиха. Последствия проведенног оперативного лечения умеренными нарушениям статодинамических функций
15.8.1.3					Нарушение нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций; МКФ: B 710 - 789, B 798, B 799	Для детей в возрасте 4 - 1 лет: при наличии осложнений виде аваскулярного некроз головки бедренной кости н весь период иммобилизации; При двустороннем вывих бедра после неэффективног лечения (отсутстви

						центрации головок бедренны костей в вертлужны впадинах, формировани неоартрозов) с нарушение опороспособности конечностей
15.8.2			Конско-варусная косолапость Пяточно-варусная косолапость Пяточно-вальгусная косолапость Врожденная плоская стопа (pes planus). Другие врожденные деформации стопы	Q66.0 Q66.1 Q66.4 Q66.5 Q66.8		
Примечание к подпункту 15.8.2. Количественная оценка степени нарушений функций опорно-двигательной системы при одно- и двусторонней врожденной косолапости (эквино деформация стопы с изменениями на уровне голеностопного, подтаранного, Шопарова и Лисфранкова суставов) зависит от вида деформаци атипичная, изолированная или в структуре системных заболеваний), от степени выраженности и тяжести деформации. Также оценивается эффектив стойкость достигнутого эффекта (наличие или отсутствие рецидива, наличие патологических установок стопы), объем движений в голеностопых сус рентгенологических изменений в костях и суставах стопы голеностопных суставах, опороспособность (патологические изменения на подошвенно стоп(пы) в виде гиперкератоза, натоптышей); сопутствующая патология.						
15.8.2.1					Нарушение нейромышечных, скелетных и связанных с движением	Для детей в возрасте 0 - года: косолапость легкой и средне

					(статодинамических) функций; МКФ: B 710 - 789, B 798, B 799	степени (одно- двухсторонняя) на этап консервативного лечения. Для детей в возрасте 4 - 1 лет: при услови удовлетворительного результата лечения и пр сохранении достигнутог результата по мере роста развития ребенка
15.8.2.2					Нарушение нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций МКФ: B 710 - 789, B 798, B 799	Для детей в возрасте 0 - 1 лет: неудовлетворительный результат лечения (рецидив прогрессирование деформации); нуждаемость в повторны реконструктивных операциях Врожденная двусторонняя плоско-вальгусная стоп тяжелой степен ("стопа-качалка")
15.8.3			Синдактилия	Q70		
15.8.3.1					Нарушение нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций;	Для детей в возрасте 0 - 1 лет: неполная простая форм синдактилии II - V пальце обеих кистей.

					МКФ: B 710 - 789, B 798, B 799	Полная простая форм синдактилии всех пальце одной или обеих кистей посл завершения реконструктивного оперативного лечения. Другие (сложные) форм синдактилии посл завершения реконструктивного оперативного лечения пр условии полног восстановления или пр незначительном нарушени функции кисти/кистей (схват и удержания)
15.8.3.2					Нарушение нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций; МКФ: B 710 - 789, B 798, B 799	Для детей в возрасте 0 - 1 лет: полная простая форм синдактилии всех пальце одной или обеих кистей н весь перио реконструктивного оперативного лечения. Другие (сложные) форм синдактилии на весь перио реконструктивного оперативного лечения или пр нарушениях основны функций кисти (схвата удержания)

15.8.3.3					Нарушение нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций МКФ: B 710 - 789, B 798, B 799	Для детей в возрасте 0 - 1 лет: другие (сложные) форм синдактилии, в том числе сочетании с другим пороками развития кисти(ей с выраженным нарушение функций кисти (схвата удержания)
15.8.4		Дефекты, укорачивающие верхнюю конечность		Q71		
Примечание к подпункту 15.8.4. Количественная оценка нарушенных функций при врожденных аномалиях верхних и нижних конечностей зависит от вида порока (фокомелия - значительное недоразвитие проксимальных отделов конечностей, вследствие чего кисти и стопы кажутся прикрепленными непосредственно перомелия - отсутствует конечность, от туловища отходит рудимент пальца; эктромелия - отсутствие одной конечности, двух верхних или всех гемимелия - отсутствие дистального отдела конечности при нормальном развитии проксимального), тяжести и распространенности патологии (и порок развития конечности или порок в структуре наследственного синдрома), возможности протезирования и эффективности его, степени адапта пороку, а при последующем протезировании - к протезу(ам). Также учитывается возраст, в котором выполнено первичное протезирование, а в п репротезирование.						
15.8.4.1			Врожденное полное отсутствие верхней(их) конечности(ей) Врожденное отсутствие плеча и предплечья при наличии кисти Врожденное отсутствие	Q71.0 Q71.1 Q71.2		

			предплечья и кисти			
15.8.4.1.1					Нарушение нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций; МКФ: B 710 - 789: B 798, B 799	Для детей в возрасте 0 - 1 лет: при наличии грубой аномали развития одной конечност или при отсутствии кисти; при наличии культ предплечья, плеча на границ верхней и средней трети, пр сохранной функции локтевог и плечевого суставов
15.8.4.1.2					Нарушение нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций; МКФ: B 710 - 789, B 798, B 799	Для детей в возрасте 0 - 1 лет: полное отсутствие одно верхней конечности; короткая культя плеча. Экзартикуляция плечево кости с резекцией част ключицы и/или лопатки
15.8.4.1.3					Нарушение нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций; МКФ: B 710 - 789, B 798, B 799	Для детей в возрасте 0 - 1 лет: полное отсутствие обеи верхних конечностей н любом уровне (кистей предплечий, плеч); полное отсутствие одной недоразвитие другой верхне конечности с выраженны или значительно выраженны

						нарушением ее функции
15.8.4.2			Врожденное отсутствие кисти и пальца(ев)	Q71.3		
15.8.4.2.1					Нарушение нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций; МКФ: B 710 - 789, B 798, B 799	Для детей в возрасте 0 - 1 лет: отсутствие одного пальца (I III, IV или V) кисти, в то числе с соответствующе пястной костью. Сочетание дву отсутствующих пальце (исключая I) при сохранны пястных костях. Отсутствие I пальца одно кисти. Отсутствие дистальны фаланг пальцев кисти: I, II, II IV, V
15.8.4.2.2					Нарушение нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций; МКФ: B 710 - 789, B 798, B 799	Для детей в возрасте 0 - 1 лет: отсутствие всех фаланг пальца обеих кистей. Отсутствие всех фаланг дву пальцев, включая I палец вместе с пястными костями н одной кисти. Отсутствие всех фаланг тре пальцев, исключая I палец вместе с пястными костями н

						одной кисти. Отсутствие всех фаланг тре любых пальцев, включая палец. Отсутствие всех фалан четырех пальцев, при наличи анатомически функционально полноценног I пальца на одной кисти. Отсутствие всех фаланг пят пальцев на одной руке
15.8.4.2.3					Нарушение нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций; МКФ: B 710 - 789, B 798, B 799	Для детей в возрасте 0 - 1 лет: отсутствие двух пальцев включая I палец, вместе пястными костями на обеи кистях. Отсутствие трех пальцев исключая I палец, вместе пястными костями на обеи кистях. Отсутствие всех фалан четырех пальцев при наличи анатомически функционально полноценног I пальца на обеих кистях. Отсутствие всех фаланг тре любых пальцев, включая палец, на обеих кистях н период реконструктивног оперативного лечения.

						Отсутствие трех любы пальцев, включая I палец, н обеих кистях
15.8.4.2.4					Нарушение нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций; МКФ: B 710 - 789, B 798, B 799	Для детей в возрасте 0 - 1 лет: отсутствие всех 10 пальцев
15.8.4.3			Продольное укорочение лучевой кости (врожденная косорукость, лучевая косорукость) Продольное укорочение локтевой кости Локтевая косорукость	Q71.4 Q71.5		
Примечание к подпункту 15.8.4.3. Количественная оценка нарушений функций верхней(их) конечности(ей) при косорукости зависит от варианта косорукости (полное или частичн лучевой или локтевой кости на одной или двух конечностях), сохранности кисти, ее положения и функции, степени отклонения кисти в лучевую сторону, функции локтевого сустава, а также величины анатомического укорочения сегмента конечности.						
15.8.4.3.1					Нарушение нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций; МКФ: B 710 - 789, B 798, B 799	Для детей в возрасте 0 - 1 лет: при одностороннем двустороннем поражении: лучевая косорукость степени, I тип кисти; локтевая косорукость

						степени; незначительное нарушени функции кисти и суставо верхней конечности
15.8.4.3.2					Нарушение нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций; МКФ: B 710 - 789, B 798, B 799	Для детей в возрасте 0 - 1 лет: при одностороннем двустороннем поражении: лучевая косорукость степени, II тип кисти; локтевая косорукость степени; умеренное нарушени функции кисти и суставо верхней конечности. Сочетание косорукости степени с нормальной кисть на доминантной конечности лучевой косорукости степени со II типом кисти ил локтевой косорукостью степени на контрлатерально конечности. Лучевая косорукость II степени, III тип кисти локтевая косорукость II степени, выраженно нарушение функции кисти суставов верхней конечности
15.8.4.3.3					Нарушение	Для детей в возрасте 0 - 1

					нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций; МКФ: B 710 - 789, B 798, B 799	лет: Двусторонняя лучева косорукость III степени, I тип кисти; локтева косорукость III степени выраженное нарушени функции кистей и суставо верхней конечности
15.8.4.3.4			Клешнеобразная кисть Врожденное расщепление стопы	Q71.6 Q72.7		
15.8.4.4.1					Нарушение нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций; МКФ: B 710 - 78, B 798, B 799	Для детей в возрасте 0 - 1 лет: Клешнеобразные кисти. Клешнеобразные стопы пр отсутствии опороспособност на период ортезирования приобретения навыко стояния и ходьбы
15.8.4.4.2					Нарушение нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций; МКФ: B 710 - 78, B 798, B 799	Для детей в возрасте 0 - 1 лет: сочетание дву клешнеобразных кистей выраженным нарушение функции схвата и удержани предметов с двум клешнеобразными стопами нарушением опороспособности

15.8.5		Дефекты, укорачивающие нижнюю конечность		Q72		
15.8.5.1			Врожденное полное отсутствие нижней(их) конечности(ей) Врожденное отсутствие бедра и голени при наличии стопы (фокомелия) Врожденное отсутствие голени и стопы Продольное укорочение бедренной кости Продольное укорочение большеберцовой кости Продольное укорочение малоберцовой кости	Q72.0 Q72.1 Q72.2 Q72.4 Q72.5 Q72.6		
15.8.5.1.1					Нарушение нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций; МКФ: B 710 - 789, B 798, B 799	Для детей в возрасте 0 - 5 лет врожденное укорочени любого сегмента и все нижней конечности в цело до 3 см (по сравнению с здоровой) при отсутстви других аномалий конечности.

						Дети в возрасте 6 - 17 лет: пр анатомическом укорочении д 6 см., функциональном - до см.
15.8.5.1.2					Нарушение нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций; МКФ: B 710 - 789, B 798, B 799	Для детей в возрасте 0 - 1 лет: при наличии аномали развития одной конечност (отсутствие стопы, культ голени на границе верхней средней трети при сохранно функции коленного тазобедренного суставов). Протезированная культя бедр одной конечности на границ верхней и средней трети Отсутствие обеих стоп н уровне костей предплюсн (уровень сустава Шопара). Врожденное укорочени любого сегмента и все нижней конечности в цело более чем на 3 см в возрасте - 3 года, более чем на 6 см возрастном периоде 6 - 17 ле (по сравнению со здоровой при отсутствии други аномалий конечности. Иное сочетание аномали развития конечностей умеренным нарушение

						статодинамических функций
15.8.5.1.3					Нарушение нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций; МКФ: B 710 - 789, B 798, B 799	Для детей в возрасте 0 - 1 лет: при наличии аномали развития двух конечностей отсутствие стоп с костям предплюсны, культи голене на границе верхней и средне трети при сохранной функци коленного и тазобедренног суставов после эффективног протезирования приобретения навыко стояния и ходьбы на протеза. Культи обеих голеней пр двустороннем порочно положении культи на перио реконструктивного лечения протезирования Культя бедра одно конечности на границ верхней и средней трети пр сохранной функци тазобедренного сустава н период протезирования либ при наличии медицински противопоказаний протезированию. Аномалия развития одно верхней и одной нижне конечности до уровня верхне

						трети плеча и до границ верхней трети бедра. Аплазия одного из сегменто конечности с нарушение функции смежных суставов н период реконструктивног оперативного лечения протезирования. Иное сочетание аномали развития конечностей выраженным нарушение статодинамических функций
15.8.5.1.4					Нарушение нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций; МКФ: B 710 - 789, B 798, B 799	Для детей в возрасте 0 - 1 лет: культя обоих бедер и голене на любом уровне на перио протезирования и адаптации протезам. Короткая культя обоих беде при наличии медицински противопоказаний протезированию. Сочетание с другим аномалиями развити конечностей со значительн выраженным нарушение статодинамических функций
15.8.5.2			Врожденное отсутствие стопы и пальца(ев) стопы	Q72.3		

15.8.5.2.1					Нарушение нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций; МКФ: B 710 - 789: B 798, B 799	Для детей в возрасте 0 - 1 лет: отсутствие всех фалан пальцев обеих стоп или одно стопы с сохранным плюсневыми костями. Отсутствие пальцев до уровн нижней трети плюсневы костей с одной стороны
15.8.5.2.2					Нарушение нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций; МКФ: B 710 - 789, B 798, B 799	Для детей в возрасте 0 - 1 лет: отсутствие пальцев вместе плюсневыми костями с одно стороны у детей раннег возраста на перио формирования ходьбы ка сложного стереотипа (д возраста 7 лет). Отсутствие пальцев вместе плюсневыми костями с обеи сторон у детей любог возраста
15.8.5.3			Другие врожденные аномалии верхней конечности(ей) (врожденный лучелоктевой синостоз)	Q74.0		
15.8.5.3.1					Нарушение нейромышечных, скелетных	Для детей в возрасте 0 - 1 лет:

					и связанных с движением (статодинамических) функций; МКФ: B 710 - 789, B 798, B 799	одно- или двусторонне поражение пр супинации-пронации функционально выгодно диапазоне (от 50 - 60° до 150 160°) либо анкилоз в средне положении между пронаци и супинацией (около 9 градусов)
15.8.5.3.2					Нарушение нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций; МКФ: B 710 - 789: B 798, B 799	Для детей в возрасте 0 - 1 лет: одно- или двусторонне поражение при супинаци менее 50 - 60°; либо анкилоз функционально невыгодно положении
15.8.5.4			Другие врожденные аномалии верхней конечности(ей). Деформация Шпренгеля	Q74.0		
15.8.5.4.1					Нарушение нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций МКФ: B 710 - 789, B 798, B 799	Для детей в возрасте 0 - 1 лет: мышечная форма болезни незначительным нарушение функции плечевого суста при эффективност консервативного лечения; отсутствие сочетания другими аномалиями развити

						конечностей или их наличие незначительным нарушение функции пораженног сегмента(ов)
15.8.5.4.2					Нарушение нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций; МКФ: B 710 - 789, B 798, B 799	Для детей в возрасте 0 - 1 лет: после проведенног оперативного лечения умеренным нарушение функции плечевого сустава сочетании с другим аномалиями развити конечностей с умеренны нарушением функци пораженного сегмента(ов). После проведенног оперативного лечения выраженным нарушение функции плечевого сустава. При наличии осложнени оперативного лечения, в то числе с повреждение плечевого сплетения
15.8.5.5			Врожденные аномалии позвоночника и костей грудной клетки (врожденный спондилолистез)	Q76.2.		
Примечание к подпункту 15.8.5.5						

Количественная оценка степени выраженности стойких нарушений функций организма ребенка в возрасте до 18 лет при спондилолистезе основывае спондилолистеза, оценке его стабильности, наличии неврологических осложнений, а также нуждаемости в оперативном лечении и оценке его эффек						
15.8.5.5.1					Нарушение нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций; МКФ: B 710 - 789, B 798, B 799	Для детей в возрасте 0 - 1 лет: спондилолистез I и II степени стабильный, бе неврологической симптоматики. Отсутстви сочетания со спондилолизом. Спондилолистез III и IV степени после эффективног оперативного лечения незначительным ограничением подвижност позвоночника
15.8.5.5.2					Нарушение нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций, функций пищеварительной системы, мочевыделительной функции; МКФ: B 710 - 789, B 798, B 799, B 510 - 539, B 610 - 639	Для детей в возрасте 0 - 1 лет: спондилолистез любо степени с наличие неврологических осложнени с умеренными нарушениям функций организма пр неэффективности консервативного лечения
15.8.5.5.3					Нарушения нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических)	Для детей в возрасте 0 - 1 лет: спондилолистез любо степени с наличие

					функций, функций пищеварительной системы, мочевыделительной функции; МКФ: B 710 - 789, B 798, B 799, B 510 - 539, B 610 - 639	неврологических осложнени с выраженными нарушениям функций организма пр неэффективности консервативного лечения
15.8.5.6			Другие пороки развития костно-мышечной системы (синдром Поланда)	Q79.8		
15.8.5.6.1					Нарушение нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций; МКФ: B 710 - 789, B 798, B 799	Для детей в возрасте 0 - 1 лет: гипоплазия и аплази большой грудной мышць отсутствие деформации ил незначительная деформаци грудной клетки, отсутстви нарушений ил незначительные нарушени функции органов грудно клетки
15.8.5.6.2					Нарушение нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций; МКФ: B 710 - 789, B 798, B 799	Для детей в возрасте 0 - 1 лет: левосторонняя аплази большой грудной мышць отсутствие ребер слева с значительной деформацие грудной клетки с умеренным нарушениями функци

						органов грудной клетки. Сочетание с другим аномалиями развити конечности с нарушение функции схвата и удержани предметов
15.8.6			Врожденный множественный артрогрипоз	Q74.3		
Примечание к подпункту 15.8.6. Количественная оценка нарушенных функций при артрогрипозе определяется степенью деформаций и укорочений верхних и нижних выраженностью контрактур крупных суставов, приводящих к нарушению опоры и передвижения, нарушению основных функций кисти. Учиты аномалии развития или метаболические нарушения, симптомы поражения ЦНС.						
15.8.6.1					Нарушение нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций; МКФ: B 710 - 789, B 798, B 799	Для детей в возрасте 0 - 1 лет: дистальная форм артрогрипоза с умеренны нарушением функции схвата удержания обеих кистей, умеренным нарушение функции стояния и ходьбы. Генерализованная форм артрогрипоза с наличие умеренных контракту суставов конечностей
15.8.6.2					Нарушение нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических)	Для детей в возрасте 0 - 1 лет: формирование выраженны контрактур крупных суставо

					функций; МКФ: B 710 - 789, B 798, B 799	верхних и нижни конечностей в функциональн невыгодном положении двусторонняя косолапост косорукость, полный высоки двусторонний вывих бедра выраженными нарушениям статодинамических функций. Генерализованная форм артрогрипоза с выраженным нарушениями статодинамических функций
15.8.6.3					Нарушение нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций; МКФ: B 710 - 789, B 798, B 799	Для детей в возрасте 0 - 1 лет: формирование анкилозов крупных суставах верхних нижних конечностей функционально невыгодно положении со значительн выраженными нарушениям статодинамических функций. Генерализованная форм артрогрипоза со значительн выраженными нарушениям статодинамических функций
15.8.7			Остеохондродисплазия с дефектами роста трубчатых костей и позвоночника	Q78.0		

			Ахондрогенезия	Q77.0		
			Точечная хондродисплазия	Q77.3		
			Ахондроплазия	Q77.4		
			Дистрофическая дисплазия	Q77.5		
			Хондроэктодермальная дисплазия	Q77.6		
			Спондилоэпифизарная дисплазия	Q77.7		
			Другая остеохондродисплазия с дефектами роста трубчатых костей и позвоночного столба	Q77.8		
			Остеохондродисплазия с дефектами роста трубчатых костей и позвоночного столба неуточненная	Q77.9		

Примечание к подпункту 15.8.7
Количественная оценка степени выраженности стойких нарушенных функций организма, обусловленных группой врожденных наследственны
костно-мышечной системы, сопровождающиеся системным поражением скелета - остеохондродисплазиями, включая формы с дефектами роста тру
и позвоночника проводится с учетом:
- множественности\комбинации поражения костно-мышечной системы, включая выраженность черепно-лицевого дисморфизма; наличия стой
синдрома; нарушение походки; ограничения движений в суставах вследствие контрактур (от умеренной до выраженной степени); степень

укорочения; наличия прогрессирующих деформаций с нарушением функциональности конечности с формированием ее функционально невыгодно быстрота прогрессирования деформаций костной системы, мобильность\фиксированность; наличие неврологических осложнений, сенсорны заинтересованности зон роста, риски патологических переломов или их наличие с учетом частоты за календарный год; частота хирургическог прогрессирующем пролиферативном процессе костной ткани.						
15.8.7.1					Нарушения нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций, функций эндокринной систем и метаболизма, нарушение функций системы крови и иммунной системы; МКФ: B 710 - 799, B 540 - 559, B 430 - 439	Для детей в возрасте 0 - 1 лет: медленно прогрессирующа деформация костной системы отставание в росте (SDS рост - 1 - 3); укорочение длин конечности до 30% от длин сегмента у детей раннег возраста, у детей школьног возраста - до 4,0 см ограничение объема активны движений в суставах конечностей без нарушени функции схвата и удержани предметов незначительно степени с функциональн выгодным положение конечности с возможность коррекции деформации/укорочения помощью малосложно ортопедической обуви незначительное ограничени подвижности без стойког болевого синдрома, незначительным нарушение функций конечностей.

15.8.7.2					Нарушения нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций, функций эндокринной систем и метаболизма, нарушение функций системы крови и иммунной системы; МКФ: B 710 - 799, B 540 - 559, B 430 - 439	Для детей в возрасте 0 - 1 лет: прогрессирующая деформация костной системы отставание в росте (SDS рост - 4); укорочение длины конечности более 30% (д 50%) от длины сегмент конечности у детей раннег возраста, у детей школьног возраста - на 4,0 - 7,0 см ограничение объема активны движений в суставах верхни и\или нижних конечностя умеренной степени пр наличии патологическо деформации конечности затрудняющих схват удержание предметов, опору передвижение пр невозможности коррекци деформации/укорочения помощью малосложно ортопедической обувью ограничение подвижност позвоночника с быстры прогрессированием деформации (более 7 градусо за год), ее мобильность, с стойким болевым синдромом возможно, с умеренны парезом конечности (3 балла)

15.8.7.3					Нарушения нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций, функций эндокринной систем и метаболизма, нарушение функций системы крови и иммунной системы; МКФ: B 710 - 799, B 540 - 559, B 430 - 439	Для детей в возрасте 0 - 1 лет: быстро прогрессирующа деформация костной системы отставание в росте (SDS рост - более 4); укорочение длин конечности более 50% о длины сегмента, у дете школьного возраст укорочение конечности боле 7,0 см; ограничение объем активных движений суставах верхних и\ил нижних конечностя выраженной степени, налич стойких контрактур затрудняющих схват удержание предметов, опору передвижение (пр двустороннем поражении выраженная деформаци позвоночника со стойки болевым синдромом.
15.8.7.4					Нарушения нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций, функций эндокринной систем и метаболизма, нарушение функций системы крови и	Для детей в возрасте 0 - 1 лет: множественные грубы деформации скелета с стойкими выраженным контрактурами в порочно положении конечностей невозможностью

					иммунной системы; МКФ: B 710 - 799, B 540 - 559, B 430 - 439	самостоятельного схвата удержания предметов, опор и передвижения.
15.8.8			Другие остеохондродисплазии Незавершенный остеогенез Полиостозная фиброзная дисплазия Остеопетроз Прогрессирующая диафизарная дисплазия Энхондроматоз Метафизарная дисплазия Множественные врожденные экзостозы Другие уточненные остеохондродисплазии Остеохондродисплазия неуточненная	Q78.0 Q78.0 Q78.1 Q78.2 Q78.3 Q78.4 Q78.5 Q78.6 Q78.8 Q78.9		
Примечание к подпункту 15.8.8 Количественная оценка нарушенных функций при незавершенном остеогенезе зависит от частоты и тяжести переломов костей различной локализац и степени деформации длинных трубчатых костей и позвоночника; от нарушения функции суставов (нестабильность, наличие контрактур), нали						

снижения слуха; от нарушения функции органов брюшной полости при наличии грыж передней брюшной стенки.						
15.8.8.1					Нарушения нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций, сенсорных функций, функций сердечно-сосудистой системы, пищеварительной, функций эндокринной систем и метаболизма, нарушение функций системы крови и иммунной системы, мочевыделительной функции; МКФ: B 710 - 799, B 210 - 299, B 410 - 429, B 510 - 539, B 540 - 559, B 430 - 439, B 610 - 639	Для детей в возрасте 0 - 1 лет: отсутствие переломо длинных трубчатых костей. Отсутствие деформаций ил незначительные (менее 1 градусов) деформации ос конечности или позвоночника без нарушения или незначительным нарушение их функций. Отсутствие ил незначительное отставание физическом развитии. Z критерий по данны денситометрии -1,0. Отсутствие ил незначительные нарушени функций организма
15.8.8.2					Нарушения нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций, сенсорных функций, функций сердечно-сосудистой системы, пищеварительной, функций эндокринной систем и метаболизма,	Для детей в возрасте 0 - 1 лет: переломы длинных трубчаты костей. Консолидация перелома(ов) деформацией оси конечност более 10°, но менее 20°, укорочением конечности; деформация оси позвоночник (сколиоз или кифоз 2 или 3 ст

					нарушение функций системы крови и иммунной системы, мочевыделительной функции; МКФ: B 710 - 799, B 210 - 299, B 410 - 429, B 510 - 539, B 540 - 559, B 430 - 439, B 610 - 639	с умеренным нарушением и функций. Умеренное отставание физическом развитии. Z критерий по данны денситометрии - 1,0 - 2,5 Умеренные нарушени функции организма
15.8.8.3					Нарушения нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций, сенсорных функций, функций сердечно-сосудистой системы, пищеварительной, функций эндокринной систем и метаболизма, нарушение функций системы крови и иммунной системы, мочевыделительной функции; МКФ: B 710 - 799, B 210 - 299, B 410 - 429, B 510 - 539, B 540 - 559, B 430 - 439, B 610 - 639	Для детей в возрасте 0 - 1 лет: последствия повторны переломов длинны трубчатых костей выраженными нарушениям статодинамических функций. Выраженная (20° и более деформация оси конечности деформация оси позвоночник с выраженным нарушение его функции. Выраженное отставание физическом развити Выраженные нарушени функций организма. Z критерий по данны денситометрии < -2,5 наличием повторны переломов длинны трубчатых костей

15.8.8.4					Нарушения нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций, сенсорных функций, функций сердечно-сосудистой системы, пищеварительной, функций эндокринной систем и метаболизма, нарушение функций системы крови и иммунной системы, мочевыделительной функции; МКФ: B 710 - 799, B 210 - 299, B 410 - 429, B 510 - 539, B 540 - 559, B 430 - 439, B 610 - 639	Для детей в возрасте 0 - 1 лет: повторные переломы длинны трубчатых костей пр незначительных двигательны и физических нагрузках. Наличие множественны металлических конструкци после проведенных операций Выраженные деформаци конечностей, требующи оперативного лечения. Значительно выраженны нарушения функции суставо конечностей (нестабильност до степени разболтанности контрактуры). Значительно выраженна задержка физическог развития Значительн выраженные нарушени функции организма. Z критерий по данны денситометрии < -2,5
15.9		Другие врожденные аномалии Хромосомные аномалии, не классифицированн		Q80 - Q89 Q90 - Q99		

		ые в других рубриках				
Примечание к подпункту 15.9. Количественная оценка нарушенных функций организма ребенка в возрасте до 18 лет при других врожденных и хромосомных аномалиях, не класси в других рубриках, зависит от характера аномалии, клинико-функциональных проявлений (клинического полиморфизма симптоматики) - нару слуха, опорно-двигательной, сердечно-сосудистой и других систем, от степени выраженности неврологического дефицита; наличия ко интеллектуального снижения, судорожных пароксизмов (их вида, частоты, тяжести) и других нарушений, прогредиентности течения заболевания также клинический прогноз, возможность компенсации нарушенных функций организма патогенетическим лечением, наличие осложнений.						
15.9.1			Факоматозы, не классифицированные в других рубриках (болезнь Реклингхаузена, туберозный склероз, болезнь Бурневилля, эпилойя; болезнь Пейтца-Егерса, Страджа-Вебера, Гиппеля-Ландау)	Q85		
			Другие уточненные синдромы врожденных аномалий (пороков развития), затрагивающих несколько систем (синдром Аперта, синдром Гольденхара; Мебиуса; Робена; синдром Прадера-Вилли; Рассела-Сильвера;	Q87		

			синдром Холта-Орама, Рубинштейна-Тейби; Беквита-Видемана; Сотоса, Уивера, Синдром Марфана, синдром Альпорта, Лоренса-Муна-Бидля, Зелвегера и другие синдромы)			
			Синдром Дауна	Q90		
			Синдром Эдвардса и синдром Патау	Q91		
			Другие трисомии и частичные трисомии аутосом, не классифицированные в других рубриках (несбалансированные транслокации и инсерции)	Q92		
			Моносомии и утраты части аутосом, не классифицированные в других рубриках	Q93		
			Сбалансированные перестройки и структурные маркеры, не классифицированные в	Q95		

			других рубриках Другие аномалии хромосом, не классифицированные в других рубриках	Q99		
15.9.1.1					Нарушения психических функций, языковых и речевых функций, сенсорных, нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций, функций пищеварительной, сердечно-сосудистой, дыхательной, эндокринной систем и метаболизма, мочевыделительной функции, функции кожи и связанных с ней систем; МКФ: B 110 - 199, B 210 - 299, B 710 - 799, B 510 - 539, B 410 - 429, B 440 - 450, B 540 - 559, B 610 - 639, B 810 - 899	Для детей в возрасте 0 - 1 лет: прогредиентное течени заболевания, компенсируемо патогенетической терапие при наличии незначительны нарушений функци организма, в том числе: 0 - 3 года - незначительна задержка физическог психомоторного, речевог развития, формировани социальных навыков; 4 - 17 лет - незначительно когнитивное снижени отсутствие снижения ил незначительное снижени интеллекта - 4 - 15 лет: IQ 70 - 79 баллов; 16 - 17 лет: I = 65 - 69 баллов незначительные нарушени устной и письменной речи
15.9.1.2					Нарушения психических функций, языковых и	Для детей в возрасте 0 - 1 лет:

					речевых функций, сенсорных, нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций, функций пищеварительной, сердечно-сосудистой, дыхательной, эндокринной систем и метаболизма, мочевыделительной функции, функции кожи и связанных с ней систем; МКФ: B 110 - 199, B 210 - 299, B 710 - 799, B 510 - 539, B 410 - 429, B 440 - 450, B 540 - 559, B 610 - 639, B 810 - 899	прогредиентное течени заболевания, н компенсируемое патогенетической терапие при наличии умеренны нарушений функци организма, в том числе: 0 - 3 года - умеренна задержка физическог психомоторного, речевог развития, формировани социальных навыков; 4 - 17 лет - умеренно когнитивное снижени умеренное снижени интеллекта - 4 - 15 лет: IQ 50 - 69 баллов; 16 - 17 лет: I = 50 - 64 баллов; умеренны нарушения устной письменной речи
15.9.1.3					Нарушения психических функций, языковых и речевых функций, сенсорных, нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций, функций пищеварительной, сердечно-сосудистой, дыхательной, эндокринной	Для детей в возрасте 0 - 1 лет: прогредиентное течени заболевания неблагоприятным прогнозом не компенсируемо патогенетической терапие при наличии выраженны нарушений функци организма, в том числе: 0 - 3 года - выраженна

					систем и метаболизма, мочевыделительной функции, функции кожи и связанных с ней систем; МКФ: B 110 - 199, B 210 - 299, B 710 - 799, B 510 - 539, B 410 - 429, B 440 - 450, B 540 - 559, B 610 - 639, B 810 - 899	задержка физического психомоторного, речевог развития, формировани социальных навыков; 4 - 17 лет - наличи выраженного когнитивног снижения, выраженног снижения интеллекта (IQ = 3 - 49 баллов); выраженны нарушения устной письменной речи. Нарушение контроля функци тазовых органов
15.9.1.4					Нарушения психических функций, языковых и речевых функций, сенсорных, нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций, функций пищеварительной, сердечно-сосудистой, дыхательной, эндокринной систем и метаболизма, мочевыделительной функции, функции кожи и связанных с ней систем; МКФ: B 110 - 199, B 210 - 299, B 710 - 799, B 510 - 539, B 410 - 429, B 440 -	Для детей в возрасте 0 - 1 лет: прогредиентное течени заболевания неблагоприятным прогнозом не компенсируемо патогенетической терапие при наличии значительн выраженных нарушени функций организма: 0 - 3 года - значительн выраженная задержк физического, психомоторного речевого развития, отсутстви формирования социальны навыков; 4 - 17 лет - значительн выраженное снижени

					450, B 540 - 559, B 610 - 639, B 810 - 899	интеллекта (IQ < 34 баллов) отсутствие устной письменной речи. Отсутствие контроля функци тазовых органов
16	Травмы, отравления и некоторые другие последствия воздействия внешних причин (класс XIX), а также отдельные состояния, возникающие в перинатальном периоде (Болезни класса XVI)			S00 - T98		
16.1		Термические и химические ожоги глаза и других внутренних органов		T26 - T28		
16.1.1			Термический ожог пищевода Химический ожог	T28.1 T28.6		

			пищевода			
Примечание к подпункту 16.1.1. При определении количественной оценки степени выраженности нарушений функций при ожогах пищевода необходимо учитывать вид ожога химический: кислотой, щелочью - более тяжелые), степень ожога, распространенность ожога, длительность и эффективность бужирования и е (степень рубцового сужения пищевода), необходимость оперативного лечения, объем его, исход, наличие осложнений.						
16.1.1.1					Нарушения функции пищеварительной, эндокринной систем и метаболизма; МКФ: B 510 - 539, B 540 - 559	Для детей в возрасте 0 - 1 лет: последствия ожога пищевод с рубцовым сужение пищевода I или II степен после проведенного лечения затруднением прохождени только твердой пищи, бе потери массы тела
16.1.1.2					Нарушения функции пищеварительной, эндокринной систем и метаболизма; МКФ: B 510 - 539, B 540 - 559	Для детей в возрасте 0 - 1 лет: последствия ожога пищевод с рубцовым сужение пищевода III степен (субкомпенсация) необходимостью планового бужирования. Наличие искусственног пищевода с умеренны нарушением функци пищеварительной системы
16.1.1.3					Нарушения функции пищеварительной, эндокринной систем и	Для детей в возрасте 0 - 1 лет: последствия ожога пищевод

					метаболизма, дыхательной системы; МКФ: B 510 - 539, B 540 - 559, B 440 - 449	с рубцовым сужением пищевода III степени и выш (декомпенсация) нарушением приема пищ (зондовое питание, наличи гастростомы и питание чере нее); наличие осложнени (свищи) с выраженным нарушениями функци организма
16.1.1.4					Нарушения функции пищеварительной, эндокринной систем и метаболизма, дыхательной системы; МКФ: B 510 - 539, B 540 - 559, B 440 - 449	Для детей в возрасте 0 - 1 лет: декомпенсация пищеварени (кахексия); неустранимы тяжелые последствия болезни неэффективность многоэтапных реконструктивно-восстановит ельных хирургически вмешательств
16.1.2		Последствия термических и химических ожогов и отморожений		T95		
16.1.2.1			Последствия термического и химического ожога и отморожения головы и шеи	T95.0		

			Последствия термического и химического ожога и отморожения туловища Последствия термического и химического ожога и отморожения верхней конечности Последствия термического и химического ожога и отморожения нижней конечности	T95.1 T95.2 T95.3		
Примечание к подпункту 16.1.2.1. При определении количественной оценки степени выраженности нарушений функций организма ребенка в возрасте до 18 лет при термических т локализации необходимо учитывать степень, площадь и локализацию ожога (отморожения); поражение других органов - верхних дыхательных пут объем лечения (консервативное, реконструктивное хирургическое, косметические операции) и его эффективность (приживление трансплант восстановленного кожного покрова), качество образовавшихся рубцов (поверхностные, глубокие, плоские, келлоидные, их растяжимость ил формирование контрактур суставов, кисти и их степень, наличие косметического дефекта, показания для реконструктивно-пластических опер нарушения функций организма подробно изложены в соответствующих разделах.						
16.1.2.1.1					Нарушения нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций, нарушения сенсорных функций, функций сердечно-сосудистой,	Для детей в возрасте 0 - 1 лет: последствия термически поражений III степени н ограниченных участка туловища и конечностей вовлечением одного-дву смежных суставо

					дыхательной, пищеварительной систем, мочевыделительной функции, функции кожи и связанных с ней систем; МКФ: B 710 - 799, B 210 - 299, B 410 - 429, B 440 - 450, B 510 - 539, B 610 - 639, B 810 - 899	("стягивающие рубцы") формированием умеренно контрактуры в функциональн выгодном положении
16.1.2.1.2					Нарушения нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций, нарушения сенсорных функций, функций сердечно-сосудистой, дыхательной, пищеварительной систем, мочевыделительной функции, функции кожи и связанных с ней систем; МКФ: B 710 - 799, B 210 - 299, B 410 - 429, B 440 - 450, B 510 - 539, B 610 - 639, B 810 - 899	Для детей в возрасте 0 - 1 лет: последствия термически поражений III степени вовлечением одного-дву смежных суставо ("стягивающие рубцы") формированием выраженно контрактуры в функциональн невыгодном положении. Наличие осложнений умеренными нарушениям функций организма
16.1.2.1.3					Нарушения нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических)	Для детей в возрасте 0 - 1 лет: последствия термически поражений III степени

					функций, нарушения сенсорных функций, функций сердечно-сосудистой, дыхательной, пищеварительной систем, мочевыделительной функции, функции кожи и связанных с ней систем; МКФ: B 710 - 799, B 210 - 299, B 410 - 429, B 440 - 450, B 510 - 539, B 610 - 639, B 810 - 899	вовлечением 2 и боле суставов ("стягивающи рубцы") и формировани резко выраженных контракту и/или анкилозов функционально невыгодно положении. Наличие осложнений выраженными нарушениям функций организма
16.1.2.1.4					Нарушения нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций, нарушения сенсорных функций, функций сердечно-сосудистой, дыхательной, пищеварительной систем, мочевыделительной функции, функции кожи и связанных с ней систем; МКФ: B 710 - 799, B 210 - 299, B 410 - 429, B 440 - 450, B 510 - 539, B 610 - 639, B 810 - 899	Для детей в возрасте 0 - 1 лет: последствия распространенных термических поражений II степени и вид множественных порочны установок крупных суставов ригидных деформаци скелета. Наличие осложнений с значительно выраженным нарушениями функци организма

16.2		Последствия травм головы		T90		
16.2.1			Последствия открытого ранения головы Последствия перелома черепа и костей лица	T90.1 T90.2		
16.2.1.1					Нарушение нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций; МКФ: B 710 - 799	Для детей в возрасте 0 - 1 лет: дефект костей череп размером 3 x 3 см и менее пластикой и без нее
16.2.1.2					Нарушение нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций; МКФ: B 710 - 799	Для детей в возрасте 0 - 1 лет: дефект костей череп размером более 3 x 3 см пр наличии пульсации ТМО области дефекта
16.2.1.3					Нарушение нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций; МКФ: B 710 - 799	Для детей в возрасте 0 - 1 лет: значительный дефект косте черепа размером 10 x 10 см более
16.3		Последствия травм шеи и туловища		T91		

16.3.1					Нарушения нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций, нарушения мочевыделительной функции, функций пищеварительной системы; МКФ: B 710 - 799, B 610 - 639, B 510 - 539	Для детей в возрасте 0 - 1 лет: последствия неосложненны переломов позвоночника незначительным ил умеренным ограничение объема движени позвоночника, бе неврологической симптоматики. Наличие стабильно металлоконструкции небольшой протяженности (пределах одного отдел позвоночника)
16.3.2					Нарушения нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций, нарушения мочевыделительной функции, функций пищеварительной системы; МКФ: B 710 - 799, B 610 - 639, B 510 - 539	Для детей в возрасте 0 - 1 лет: последствия осложненны переломов позвоночника наличием неврологическо симптоматики, достигающе умеренной степени. Нестабильность металлоконструкции любо протяженности посл проведенного оперативног лечения
16.3.3					Нарушения нейромышечных, скелетных и связанных с движением	Для детей в возрасте 0 - 1 лет: последствия осложненны

					(статодинамических) функций, нарушения мочевыделительной функции, функций пищеварительной системы; МКФ: B 710 - 799, B 610 - 639, B 510 - 539	переломов позвоночника выраженной неврологическо симптоматикой
16.3.4					Нарушения нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций; нарушения мочевыделительной функции, функций пищеварительной системы; МКФ: B 710 - 799, B 610 - 639, B 510 - 539	Для детей в возрасте 0 - 1 лет: последствия осложненны переломов позвоночника полным анатомически прерыванием спинного мозга со значительно выраженно неврологической симптоматикой, нарушение функции тазовых органов
16.4		Родовая травма периферической нервной системы		P14		
Примечание к подпункту 16.4. При определении количественной оценки степени выраженности нарушений функций организма ребенка в возрасте до 18 лет при род периферической нервной системы необходимо учитывать вид пареза (Эрба-Дюшена - проксимальный паралич верхней конечности, Дежер дистальный парез верхней конечности, тотальный парез), степень двигательных нарушений (преимущественно при параличе Эрба-Дюш патологической установки; степень нарушения функции кисти (схват и удержание предметов)						
16.4.1			Паралич Эрба-Дюшена при родовой травме	P14.1		

			Паралич Дежерин-Клюмпке при родовой травме	P14.2		
16.4.1.1					Нарушение нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций; МКФ: B 710 - 799	Для детей в возрасте 0 - 1 лет: отсутствие патологически установок конечности незначительное ограничени движений в плечевом и локтевом суставах, вследстви контрактуры или парез (снижение силы мышц до баллов), сохранной основно функции кисти
16.4.1.2					Нарушение нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций; МКФ: B 710 - 799	Для детей в возрасте 0 - 1 лет: умеренный вялый паре доминантной конечност (снижение силы мышц до баллов в проксимальном, до баллов в дистальном отделах с ограничением объем активных движений укорочением конечност (более 7 см) с нарушение схвата и удержания предмето
16.4.1.3					Нарушение нейромышечных, скелетных и связанных с движением	Для детей в возрасте 0 - 1 лет: отсутствие движений в любо

					(статодинамических) функций; МКФ: B 710 - 799	верхней конечности (плегия) полным отсутствием функци конечности
16.5			Травмы, захватывающие несколько областей тела. Последствия травм верхней конечности Последствия травм нижней конечности Последствия травм, захватывающие несколько областей тела	T00 - T07 T92 T93 T94		
16.5.1					Нарушение нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций; МКФ: B 710 - 799	Для детей в возрасте 0 - 1 лет: отсутствие одного или дву пальцев (любых, включая I) н одной кисти. Отсутствие I пальца одно кисти на любом уровне; в то числе с пястной костью. Функциональное укорочени верхней конечности до 7 с (по сравнению со здоровой вследствие различных причин без нарушения функци крупных суставо конечностей, без нарушени функции кисти (схвата

						удержания). Функциональное укорочени любого сегмента или все нижней конечности в цело до 3 см (по сравнению с здоровой) в результат неправильно сросшихс переломов. Незначительные (менее 10° деформации оси конечности результате неправильн сросшегося перелом длинных трубчатых косте без нарушения или незначительным нарушение их функций. Отсутствие одного или дву пальцев (любых) одной стоп или обеих стоп на любо уровне. Отсутствие пальцев обеи стоп или одной стопы сохранными плюсневым костями. Отсутствие всех пальцев д уровня нижней трет плюсневых костей с одно стороны. Анкилоз одного сустава функционально выгодно положении. Эндопротез одног

						тазобедренного или одног коленного сустава (пр правильном его положении стабильности все компонентов). Последствия изолированны переломов костей таза бе нарушения целостност тазового кольца. Любые иные последстви травм конечностей различном их сочетании незначительными нарушениями статодинамических функци организма
16.5.2					Нарушение нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций; МКФ: B 710 - 799	Для детей в возрасте 0 - 1 лет: Отсутствие I пальца на обеи кистях Отсутствие двух пальцев включая I палец, вместе пястными костями. Отсутствие трех пальцев исключая I палец, вместе пястными костями. Отсутствие трех любы пальцев, включая I палец, пр наличии пястных костей н одной кисти. Отсутствие всех четыре

						пальцев на любом уровне н одной кисти при сохранны пястных костях и наличи анатомически функционально полноценног I пальца. Отсутствие сегмента(ов верхней конечности (кисти предплечья на границ верхней и средней трети) пр сохранной функции локтевог и плечевого суставов. Отсутствие сегмента(ов нижней конечности (стопы голени на границе верхней средней трети) при сохранно функции коленного тазобедренного суставов. Отсутствие стопы на уровн костей предплюсны с обеи сторон у детей любог возраста. Отсутствие стопы на уровн костей предплюсны или н уровне нижней трет плюсневых костей с одно стороны у детей раннег возраста на перио формирования ходьбы ка сложного стереотипа. Протезированная культя бедр одной конечности пр

						сохранной функци тазобедренного сустава (пр хорошей адаптации к протез и приобретении навыко ходьбы на нем) с уровне двигательной активности или выше. Укорочение нижне конечности в целом на 4 см более (по сравнению с здоровой) или деформаци оси конечности более 10°, н менее 20° с умеренны нарушением их функций результате неправильн сросшихся переломов. Анкилоз одного сустава функционально невыгодно положении. Эндопротез дву тазобедренных или дву коленных суставо эндопротез тазобедренног сустава на одной конечност и эндопротез коленног сустава на другой конечност (при правильном и положении и стабильност всех компонентов). Последствия переломо костей таза с нарушение

						целостности тазового кольца повреждением крестцово-подвздошного сочленения неврологическими осложнениями (с умеренны парапарезом, монопарезом выраженным проксимальных, умеренным дистальных отделах нижне конечности); Любые иные последстви травм конечностей различном их сочетании умеренным нарушение статодинамических функци организма
16.5.3					Нарушение нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций; МКФ: B 710 - 799	Для детей в возрасте 0 - 1 лет: Отсутствие двух пальцев включая I палец, вместе пястными костями на обеи кистях. Отсутствие трех пальцев исключая I палец, вместе пястными костями на обеи кистях. Отсутствие четырех пальце на обеих кистях на уровн головок пястных костей пр наличии анатомически

						функционально полноценног I пальца; Короткая культя плеча экзартикуляция на уровн плечевого сустава пр сложности ил невозможности протезирования; на перио протезирования и адаптации протезу. Культя обеих голеней н границе верхней и средне трети на перио протезирования и адаптации протезам. Культя бедра одно конечности на перио протезирования и адаптации протезу. Культя одной верхней и одно нижней конечностей н период протезирования адаптации к протезу. Любые иные последстви травм конечностей различном их сочетании выраженным нарушение статодинамических функци организма
16.5.4					Нарушение нейромышечных, скелетных	Для детей в возрасте 0 - 1 лет:

					и связанных с движением (статодинамических) функций; МКФ: B 710 - 799	отсутствие трех пальцев пястными костями, включая палец, на обеих кистях. Отсутствие всех пальцев н обеих кистях. Отсутствие обеих верхни конечностей на любом уровн (обеих кистей, предплечий обоих плеч); Отсутствие обеих голеней пр двустороннем функциональн невыгодном положени культи на перио реконструктивного оперативного лечения протезирования. Культи обоих бедер на любо уровне на перио протезирования и адаптации протезам. Короткая культя обоих беде при наличии медицински противопоказаний протезированию. Отсутствие трех конечносте на любом уровне в различны сочетаниях. Любые иные последстви травм конечностей различном их сочетании с значительно выраженны нарушением

						статодинамических функци организма